

一取汗之法當取於自然不宜急暴但服以湯劑蓋令溫煖使
得津津微汗稍令久之則手足俱周徧身通達邪無不散矣
若一時逼之致使如淋如洗則急遽間衛氣已達而營氣未
周反有不到之處且恐大傷元氣非善法也余嘗見有子病
者其父母愛惜之甚欲其速愈且當溫煖之令覆以重被猶
恐不足而以身壓其上子因熱極呼叫其父母曰猶未也須
再出些方好及許久放起竟致亾陽而斃之是但知汗出何
妨而不知汗之殺人此強發之鑑也○又有邪本不甚或挾
虛年衰感邪等證醫不能察但知表證宜解而發散太過或

誤散無效而屢散不已因而卽被其害者有之或邪氣雖去
遂致胃氣大傷不能飲食而羸憊不振者有之此過汗之戒
也○凡發汗太過一時將至亡陽或身寒而慄或氣脫昏沉
等候速宜煎獨參湯一兩許飲之或甚者以四味回陽飲速
爲挽回庶可保全否則恐致不救

一脈有忌汗者如傷寒論曰太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微
弱者此無陽也不可發汗○弦爲陽運微爲陰寒上實下虛
意欲得溫微弦爲虛不可發汗發汗則寒慄不能自還○傷
寒四五日脈沉而喘滿沉爲在裏不可汗汗亡津液必大便

難而讞語○少陰病脉微不可發汗以亾陽故也○傷寒脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更吐下也○尺脉弱而無力者切不可汗下○尺中遲者不可發汗以榮氣不足血少故也

景岳子曰按以上忌汗諸脉可見仲景大意故凡治傷寒但見脉息微弱及沉細無力者皆不可任意發汗然欲去外邪非汗不可而仲景云脉微弱者不可發汗夫脉弱非陽既不可用寒涼而寒邪在表又不可用攻下然則舍汗之外又將何法以治此表邪乎不知溫中卽可以散寒而強主卽可以

逐寇此仲景之意豈不盡露於言表而明悟者當心會之矣
且凡病外感而脉見微弱者其汗最不易出其邪最不易解
何也正以元氣不能托送卽發亦無汗邪不能解則愈發愈
虛而危亾立至矣夫汗本乎血由乎營也營本乎氣由乎中
也未有中氣虛而營能盛者未有營氣虛而汗能達者脉卽
營之外候脉旣微弱元氣可知元氣愈虛邪愈不解所以陽
證最嫌陰脉正爲此也故治此者但遇脉息微弱正不勝邪
等證必須速固根本以杜深入專助中氣以托外邪必使真
元漸克則脉必漸盛自微細而至滑大白無力而至有神務

令陰脉轉爲陽脉陰證轉爲陽證斯時也元氣漸克方是正
復邪退將汗將解之佳兆故凡治表邪之法有宜發散者有
宜和解者有宜調補營衛者如果邪實而無汗則發散爲宜
有汗而熱不除則和解爲宜元氣虛而邪不能退則專救根
本以待其自解自汗爲宜此逐邪三昧萬全之法也今有庸
流但見其外不見其內每不論證之陰陽脉之虛實但知寒
涼可以退熱但知發散可以解表不知元陽一敗則土崩瓦
解立見潰矣反掌殺人而終身不悟是真下愚不移者也若
而人者亦可謂之醫乎

一證有忌汗者如傷寒論曰當汗者下之爲逆當下者汗之爲逆○下利清穀不可攻表汗出必脹滿以重亾津液也○汗家不可發汗○陽虛不得重發汗○衄家不可發汗○亾血家不可發汗○淋家不可發汗發汗必便血○咽喉乾燥者不可發汗○咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕○身重心悸者不可發汗○瘡家雖身痛不可發汗發汗則瘡○欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥逆冷○諸動氣不可發汗

動氣義詳後論下

仲景曰病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當吐之宜瓜蒂散○病人手足厥冷脉乍結以客氣在胸中心下滿而煩飲食不能入者病在胸中當吐之

曰病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也當吐之宜瓜蒂散○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯○按此二節前節言胸有寒者謂

寒邪也所以當吐後節言膈上有寒飲乾嘔者謂中寒也所以宜溫然則前節之言寒者言寒邪之實後節之言寒者言胃氣之虛均謂之寒而有虛實之異實者宜吐吐則散也虛而吐之則胃氣愈虛病必更甚矣此等要處最當詳察

曰病胸上諸實胸中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利日十餘行其脉反遲而寸脉微滑此可吐之吐之利則止

曰太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣者此爲吐之內煩也○按此以太陽證有不當吐而吐者必邪熱

乘虛入胃故致內煩也

一宿食在上脘者當吐之

一凡用吐藥中病卽止不必盡劑也

一寸脉弱而無力者切忌用吐

論下 十六

論曰三陰皆受病已入於府者可下而已○此詳義見前六經證

曰脉浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發汗○按此以心下鞭而熱在藏卽脉雖浮大者病亦屬裏故不宜發汗而

當攻內也

曰傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯○按此以陽明內熱而爲頭痛也故可攻之

曰陽明病外已解而潮熱者可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗雖多而微發熱惡寒者表未解也其熱不潮未可與承氣

曰陽明病胃中有燥屎者可攻之病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎也

曰汗出譫語者以有燥屎在胃中此爲風也須下之宜大承氣

湯

曰陽明病發熱汗多者熱在裏也急下之宜大承氣湯

曰陽明病發汗不解腹滿痛者邪在裏也急下之宜大承氣湯

曰病腹中滿痛者此爲實也當下之

曰腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

曰傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭者或心
下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

曰陽明少陽合病脉滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

○按此一條必須兼脉證而察之蓋傷寒之脉滑數者多若

無脹痛等證未必卽爲宿食故不可單據滑數之脉便認作可攻之證

曰若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除也○按此一條言若非大滿而猶生寒熱者是表病猶不除也尚不可下

曰若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可徐下之雖四五日不能爲禍也若不宜下而便攻之內虛熱人協熱遂利煩躁諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣○按此一條言外無表證內有堅滿然後可下正以見下不宜輕輕下者爲

禍不小也

曰太陽病熱結膀胱其人如狂血自下下者愈若表未解者不可攻當先解表表已解但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯

一凡傷寒當下者不宜用丸藥以丸藥不能滌蕩熱邪而但能損正氣也○又凡治傷寒熱邪傳裏者服下藥後仍用鹽炒麩皮一升許將絹包於病人腹上款款熨之使藥氣得熱則行大便必易通也

一脈有忌下者如傷寒論曰傷寒脈微而惡寒者此陰陽俱虛

不可更發汗更吐更下也○寸口脉浮大而醫反下之此爲
大逆○關脉弱胃氣虛有熱不可大攻之熱去則寒起○尺
脉牆弱無力者不可下○大便鞕者當下之設脉遲緩者不
可下裏氣不實也○脉虛細者不可下○脉浮者不可下○
脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦爲陽
運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛虛者不宜下也
○脉浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤陽獨下陰
部者醫以爲熱而復用毒藥攻其胃此爲重虛客陽去有期
必下如汚泥而死○脉濡而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽

微衛中風發熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫謂有大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵快不得眠不知胃氣冷緊寒在關元當溫反下之安可復追還○脉久數者非外邪也不可下之○脉細數者非實邪也不可下○結胸證其脉浮大者邪未入府也不可下下之則死○大抵傷寒最宜慎下若脉息無力及表證未罷者不可亂投湯劑下之爲逆

一證有忌下者如太陽病外證未解不可下下之爲逆○太陽與陽明合病喘而胸滿者邪在表也不可下○陽明病若微

發熱惡寒者表未解也不可下○陽明病潮熱大便初鞭後
澹者不可攻○陽明病腹微滿初頭鞭後必澹者非實熱也
不可攻之○陽明病其熱不潮者未可與承氣湯○陽明病
雖有潮熱而大便不鞭者不可與承氣湯○不轉失氣者其
內不堅慎不可攻也○陽明病心下鞭滿者不可攻攻之利
遂不止者死鞭在心下者其邪在胸膈猶未入府也故不可
攻○藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可
攻也○病欲吐者不可下嘔多雖有陽明證不可攻之此嘔
多者病在上焦病在上而攻其下取敗之道也○陽明病若

汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯○
濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止亦死○
陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其
人本虛故攻其熱必噦○陰強無陽者雖其大便堅鞭亦不
可下下之則清穀腹滿○陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷
不嗜食大便秘穀出○陽微者不可下下之則心下痞鞭○
惡寒者不可下○小便清利者火不盛也不可下○諸四逆
厥者不可下○咽中閉塞者不可下○發汗多亡陽譫語者
不可下○諸虛者不可下下之則陽虛而生寒仲景曰極寒