

產後乍見鬼神

心神驚悸

中風恍惚

虛極生風

虛汗不止

汗多變瘧

口噤腰背反張

產後中風

四肢筋攣

遍身疼痛

產後腰痛

產後腹痛兒枕痛

產後寒疝腹痛

產後兩脇脹痛

產後血瘕

虛煩發熱

產後血渴

產後乍寒乍熱

產後癰疾

嘔吐腹脹

氣急喘促

口鼻黑鼻衄

月水不通

四肢浮腫

腹痛泄瀉

赤白痢

大便秘澀

大小便不通

產後遺糞

產後諸淋

小便不禁

小便出血

玉門不開

乳少或止 婦人繭唇

赤水玄珠婦人門第二十四卷

耳

結核方論

赤白遊風

婦人疰疰

鶴膝風

足跟瘡腫

肺癰

腸癰

乳癰乳岩

新安生生子孫一奎著輯

產後乍見鬼神

產後如見鬼神或言語譫妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之

薛氏曰若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮姜若心血虛損用栝子仁散大抵此証皆由心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附卽灸鬼哭穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散益甚痰

涎上湧朝寒暮熱乃早用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

調經散 治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時見怪

沒藥

琥珀

桂心

各一錢

白芍

炒

當歸

各七分

細辛

五分

麝香

許少

右爲末每服半錢姜湯酒各少許調服

栢子仁散

治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

栢子仁

遠志

人參

桑寄生

防風

當歸

炒

生地

甘草

炙

各等分用白羊心壹個水三盞煮清

汁七分入藥五錢煎服

產後心神驚悸

薛氏曰人之所主者心心之所主者血心血一虛神氣不

一產婦患前症二度服琥珀地黃丸局方妙香散隨效再患服之其症益甚而脉浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛乃以十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黃丸 治產婦惡露未盡胸腹作痛或小便不利

琥珀

延胡索

糯米同炒去米

川歸

各一兩

蒲黃

四兩

生地

研取汁

留滓

生姜

各二斤研取汁留滓生薑汁石銀器內炒地黃滓以地黃汁炒生薑滓各乾為

度

右為末蜜丸如彈子大每服一九當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛 辰砂

琥珀

沒藥

當歸

等分

右為末每服二錢空心日

午臨卧白湯調下

治產後驚悸亂語精神不定用好硃砂爲細末每

以酒調下一錢

產後中風恍惚

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心神恍惚怔忡不寤

薛氏曰當大補氣血爲主而佐以後方爲善蓋風乃虛極之假象也固其本元諸病自退若專治其風則速其

危矣

一產後患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷

此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾

二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽動小

便自遺作肝火熾盛用十全大補加鉤藤山梔而安再

用辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸 產後中風驚狂起卧不安或痰涎上湧

石菖蒲

遠志

去心芦用
甘草湯煮

人參

茯神

辰砂

各三錢

川芎

山藥

鉄粉

麥冬

細辛

天麻

半夏

南星

白附子

各一兩

爲末姜汁糊爲丸菴荳大別以

硃砂爲衣每服三十丸姜湯送下

產後極虛生風

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出自
眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣

薛氏曰若心脾氣血虛用十全大補湯如不應加附子鈎
藤鈎若肝經血虛用逍遙散加鈎藤經云脾之榮在唇

心之液爲汗乃心脾二臟虛極急用參附湯救之

一婦患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹疼以爲陽氣虛寒用六君子姜附各加至五錢不應以參附加至一兩始應良久不服仍前腸鳴腹痛後灸開元穴百餘壯及服十全大補湯方效

濟危上丹 乳香 五靈脂 硫黃 玄精石 阿膠

卷栢 桑寄生

陳皮

各等分

將上四味入石器微火

炒再研入餘末用生地黃汁丸梧子大每服三十九食前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯

治產後腹痛拘急痛連腰背自汗少食

當歸

桂心

各三兩

白芍

六兩

炙甘草

二兩

每服五錢

獨參湯 一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰鳴自汗盜汗氣虛脉脫手足逆冷蓋血生於氣補氣者乃陽生而陰長也

產後虛汗不止

產後汗不止者皆陽氣頃虛腠理不密而津液妄洩也若遇風則變痙縱虛乏短氣則身體消瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰若血氣俱虛急用十全大補湯如不應參附蒼附湯恐汗多亡陽發痙尤當用之王好古曰頭汗出至頸而還額上偏多蓋額爲六陽之所會也由虛熱薰蒸而

出竊謂前症當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心治者審之

一產婦略聞音响其汗如水而昏瞶諸藥到口卽嘔作脾氣虛僣用參附末爲細丸時含三五粒液下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致癡寐神思疲甚口乾引飲乃血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩黃柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈

麻黃根湯 產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安 當歸

黃芪炒 麻黃根 牡礪煨 炙甘草 人參

各等分水煎服

產後氣脫汗不止小便便短少四肢難以屈伸 炙甘草 兩

附子 炮五錢 桂心 白芍 炒各一兩五錢 每服三五錢加姜

枣水煎服以效爲止

止汗散 牡礪 煨五錢 小麥麩 炒八兩 右爲細末每服三

五錢猪油汁調下

人參湯 產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等症

人參 當歸 等分爲末猪腰子一枚切片水二鍾糯

米半合葱白二根煮汁取八分入藥三錢煎服

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止如不應加人參白

朮心血不足加炒酸枣仁 當歸 熟地 黃芪 炒各二錢

生地 黃栢 炒黑 黃芩 炒黑 黃連 炒黑各一錢 水煎服

參附湯

治陽氣虛寒自汗惡寒手足逆冷大便自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發瘧等症

人參

一兩

大附子

五錢

作一服加姜枣

水煎徐飲下

當歸補血湯

治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛重按至全無者

當歸

三錢

炙黃芪

一兩

水煎服

芪附湯

治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰湧四肢逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等證

黃芪

一兩

大附子

五錢

作一服

加薑枣水煎如不應加附子乃得全劑

汗多變瘧

產後汗多變瘧因氣血虧損肉理不密風邪所乘口噤背

強如癰或搖頭馬嘶不時舉發氣息如絕宜速灌小續

命湯若汗出兩手拭不及者不治

薛氏曰此因去血過多元氣虧損或外邪相搏以致牙關

緊急四肢痙強或陰火內動或腰背反張肢體抽搐若有汗而不惡寒者曰柔痙若無汗而惡寒者曰剛痙由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多及潰瘍而膿血大泄者多患此乃敗症也急以十全大補湯治之如不應急加大附子多有復甦者

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮姜一劑而甦數劑而安

小續命湯 治剛痙或腳氣痺弱不能轉舒行步欹側或

口眼喎邪牙關緊急角弓反張 麻黃 桂心 甘草

各五錢 防風 白芍 白朮 炒 人參 川芎

大附子

炮

防己

酒洗

黃芩

炒各等分

每用五錢水煎入

姜汁少許溫服若自汗爲柔痙者去麻黃有熱去附子減桂一半盛冬初春去黃芩

產後口噤腰背反張

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手三陽經也蓋手三陽之筋循結于頷得風冷則筋急故致口噤腰背掣急角弓反張者是風邪入於諸陽之經也

薛氏曰若因血氣耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血爲主佐以本方丹溪謂產後當大補氣血爲先雖有它証以末治之如惡寒發熱等症乃氣血虛甚之極也宜大劑參芪歸朮肉桂以培養之如不

應急用炮附子再不應用人參一兩附子二三錢名參
附湯倘猶不應乃藥力未能及也宜多用之

婦人產後不省人事吐涎痺癱 當歸 荆芥穗 等分

三錢水一盞酒少許煎灌之下卽甦倘未應者當改用
大補氣血藥

張文仲治前症用白朮四兩以酒濃煎頃服

產後中風

產後中風或氣血未復風寒所感以致筋掣拘急口眼歪
斜或肢體緩弱入臟則恍惚驚悸郭稽中云產後強力
下床或悞入房或憂怒內傷臟腑陳無擇曰當以脉辯
而治之若努力下床月內入房憂怒者着艾非中風類

乃蓐勞火邪之症

薛氏曰若果外邪所屬形氣不足病氣有餘當補元氣爲主稍佐以治病之藥若強力下床月內入房屬形氣病氣俱不足當純補元氣多有復甦者若悞投風藥乃促其危也

治產後身背拘急妄言發熱四肢拘攣不時驚悸 川芎

羌活

羚羊角

酸枣仁

炒

芍藥

炒各四兩

桑白皮

一兩

五錢

防風

一兩二錢五分

每服六七錢水煎服

治產後中風唇青鼻黑用小續命湯連進三服卽愈

產後中風煩渴用紅蒼子

五合炒

水煎徐徐呷之

產後四肢筋攣