

醫學

廣筆記



先醒齋醫學廣筆記卷之三

明東吳繆希雍仲醇著

吳興丁元薦長孺甫輯

海虞李枝李虬甫參訂

後學鄞縣曹炳章赤電校刊

幼科附痘疹

小兒初生即以粉草

三錢切片

江西淡豆豉三錢入沸湯一碗隔水煮乾至一二小杯以綿為乳釀藥

汁入兒口吮之以盡為度腹內有聲去胎糞數次方飲乳月內水無驚風諸病

兒初生不可剪臍帶三朝用麪和水成薄餅置兒腹穿臍帶于麪上將斲艾火灸臍帶近臍處

或三炷或五七炷灸須下帳避風灸畢仍將臍帶紮好聽其自脫至七日方脫者元氣足也瑤

兒九日方脫其神甚王

凡兒生下每日夜時將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有白點即以指爪或細針挑破

取桑樹內汁濾清塗之永無驚風撮口之患予家用前三方兒月內並無瘍者

治撮口 其症必先大便熱

用生犀角及真羚羊角磨和蜜汁飲之有効急則用大黃二錢甘草二錢煎服

治月內啼

以真牛黃飛辰砂極細末各五厘塗兒舌上立止

治胎驚 仲淳定有驗

人參 白芍藥 酒炒各一兩 白茯苓 酸棗仁 各一兩 炙甘草 遠志肉 甘草汁浸蒸晒乾各一兩 真天竺黃 另

如飛 硃砂 另研如法 臍帶 新瓦土炙焦存性另研細三條 天麻 犀角 滑石末 各一兩 如有紫河車加煨乾

鐵 細忌 右天竺黃硃砂臍帶另研外餘篩極細末然後加入另研三味再研和令極勻用鈎藤

汁四兩和煉蜜半斤搗和前藥每丸重一錢二分飢時臨卧以燈心薄荷湯調化服日可與

三服或以鈎藤湯煎濃化藥更佳○如治急驚本方去臍帶河車人參加白殭蠶 蜜炙 金箔

牛黃 一錢 琥珀 一錢 胆星 八分 麝香 三分

治胎瘧 家弟患此服之神驗

人參 三錢虛甚瘧久者加至一兩止 白芍藥 三錢酒炒 廣陳皮 二錢 黨甲 二錢 麥門冬 三錢 厚朴 二錢 青皮 七分 山查肉 三錢

水二鍾煎八分溫服○脾胃不佳加川黃連 一錢五分 真藿香 五分 白豆蔻 二分 姜皮 五分 竹葉 十三片

白茯苓 二錢

治小兒癇症或驚風不止 黃孟芳幼患此症久服効

天竺黃 五錢 酸棗仁 二兩 麥門冬 二兩 人參 一兩 明天麻 五錢 天門冬 去心一兩 白茯苓 一兩 橘紅 七錢 遠志肉

甘草汁煮 去骨二兩 白芍藥 一兩 鈎藤 五錢 細末煉蜜和丸如彈子大水飛極細硃砂為衣每服一丸燈心

湯或龍眼湯化下又一方加紫河車一具酒洗淨煮爛或焙乾為末入前藥中

疳積散 宋二懷傳累試神効

治兒乳食不節過飽傷脾面黃腹大小便濁如米泔大便黃泄酸臭皮毛枯槁甚難醫
目羞明生翳形骸骨立夜熱晝涼等證並用此方主之

厚朴去皮切片姜汁炒熟淨末一兩廣陳皮去白淨末八錢粉甘草去皮炙七錢淨真蘆薈明如漆若如蘇美白衣者佳去白

衣穀淨末五錢青黛取顏料鋪中淨研二錢百草霜取山庄人家鍋底煤二錢五分旋覆花淨末一錢五分和成劑小兒每服一錢

用藥一分燈心湯空心調服服後病愈再用肥兒丸調理如脾氣未實用啟脾丸或大健脾丸

如疳氣未盡用陳皮兩白木香錢三白茯苓錢五加平胃散錢三為末陳皮湯調下

肥兒丸

人參錢三蘇美一兩史君子肉一兩白芍藥一兩橘紅八錢黃連一兩甘草五錢紅麴七錢麥芽七錢砂仁五錢白茯苓

兩山查肉錢七滑石一兩蓮肉二兩扁豆一兩青黛一兩煉蜜丸彈子大每服一丸空心白湯化下

治疳瀉痢見紅白積者

用前散子加黃連姜汁炒肉豆蔻二味燈心湯少入熟蜜調服

治食積成疳

用前散砂仁湯調服 四方俱宋二懷傳

治小兒疳症唇白或紫腹大面黃髮乾上指



施季泉有丸藥如龍眼大納猪肝内白酒煮之止食肝一劑而愈其丸取出尚可救人方不傳
免輩累試之奇驗價亦廉

治瘡眼

生雞肝一具不拘大小雌雄二三歲者只用半具外去衣内去筋膜研極細如麵入丹精數匙
干調極勻加熟白酒厚薄相和隔湯煇極熱空心服或用甜酒少加熟白酒調服至眼開翳散
乃止

又方

白芙蓉花陰乾三四錢聽用另以不油不蛀肉豆蔻一枚粉真胡黃連五錢共細末將赤雄雞軟肝去筋
膜入前藥末同研極細丸如龍眼核大白酒隔湯煮熟空心與兒吃其藥約分三分如兒小可
再分作四分免大者可一二次頓服立驗

治小兒走馬牙疳百驗方

冰片

三錢

黃連

不犯

括婁

為紅

子

煨存性

黃蠶

兩壳

煨存性

研

明礬

一錢五分

五穀

要

有尾

者

瓦上

煨過

研

煨過存性

研

各末

和勻

再碾

連吹

數次

立効

吹藥

時先

以米泔

漱淨

吹藥

後仍

以米泔

漱淨

又將夜壺底内積垢取出燒灰存性研極細數牙根腫爛處立愈前方中加入更効

又將蝸牛連殼煨灰存性研極細末吹患處立愈 右二方俱施季泉傳



治小兒心口疼 仲淳定 非虫積作痛者不宜用

牽牛 錢炒八 白木香 錢三 檳榔 錢二 紅麴 錢炒一 甘草 錢炙三 橘紅 錢八 綠礬 火煅紅以米醋淨入另研如麴四錢 細末粉糊

和凡如梧子大每四錢白湯吞終身不可食蕎麥

存之幼郎病內傷大小便俱血諸醫競用紅花桃仁病愈甚仲淳曰桃仁之類疏其瘀也血且

行奈何又重傷之傷則補之而已以生地黄 錢四 續斷及杜仲牛膝等飲之稍平而腹痛不已

仲淳曰是在內經強者氣盈則愈弱者着而成病加人參 錢二 一劑而愈

月準張氏免十歲自幼心痛得于母氣不時發者發時飲食不進呻吟反覆三四日仲淳疏方

藥入口即止

檳榔 錢一 黑丑 錢一 木香 錢五分 使君子 錢二 橘紅 錢二 白茯苓 錢三 白芍藥 錢二 旋覆花 錢二 豬苓 錢一 五分

義興楊純父幼免病寒熱勢甚棘諸醫以為傷寒也藥之不効仲淳曰此必內傷純父不信偏

詢乳媪及左右並不知所以傷故仲淳固問不已偶一負薪者自外至聞而訝曰曩見郎君攀

竹稍為戲稍折墜地傷或坐此乎仲淳曰信矣投以活血導滯之劑數服而起仲淳嘗言古人

先望聞問而後切良有深意世人以多問嘲醫醫者含糊診脉以致兩誤悲夫

猴疳方 此胎毒濕熱從肛門或陰囊邊紅暈爛起漸至皮膚不結廬不治必爛死

生薑 錢四 鰻魚 錢一 共煮爛取濃汁塗之次用貝母灰存性 錢五分 牛黃 錢一 水片 錢各一 共研細末敷之

如復發用綿花油斤一大楓子肉 蛇床子 乳香 沒藥共四兩 青黛兩一 五味研細浸油內青布

蓋口以青錢壓之數日後以鷺翎蘸油塗之再用鰻骨灰君 牛黃 水片各少許 共為末敷之愈

免服末藥

人中白煨 胡黃連 青黛各五分 辰砂三分 甘草二分 人參一分 共為末蜜調服之

乳母服藥

當歸 黃連 金銀花 桔梗 連翹 川芎 甘草 山梔 薄荷各等分 水煎服以上三方

張守為幼郎患瘡疳嗜食易飢腹如蜘蛛過數日一瀉瀉則無度面目鰲黑指節中亦幾無新

肉矣其母亦病診脉緊數骨蒸勞熱大渴引飲淋閉此勞熱發然馬銘鞠曰免病實母病也用

麥門冬批杞葉懷生地白芍藥青蒿鱉甲之屬以治母用乾蟾為君加犀角羚羊角白芙蓉花

牛黃每用分許日入雞肝內飯上蒸服以治免再用滑石白扁豆白茯苓車前子山查肉五穀

蟲等分為末拌人乳晒乾七次畧入砂仁末陳皮湯丸彈子大日進兩丸不二十日子母俱痊

二方絕無藥氣故免喜啖之

華叔蟾乃郎慢脾風五六日愈愈甫三四日即過多飲食連浴兩宵復痰壅沉迷面目俱浮胸

腹腫滿嘔吐乳食不進角弓反張二便交秘有欲進以牛黃丸者馬銘鞠曰下咽死矣此病後

虛症也然參且勿用用麥門冬三錢 批杞葉三片 貝母二錢 桑白皮一錢 杏仁一錢 藿香一錢 新鮮大糖



球一蒼朮

用人乳汁炒三次八分

橘紅

二錢

加燈心煎服入姜汁逾時小便隨利腹即寬而諸證悉退

盡劑竟愈以此知嬰兒病後不可不慎即此免半年後下午連食冷鴨子二枚午間又繼惡食食更餘病發上不吐下不瀉胸腹脹滿目閉氣喘身熱按其胸腹則雙手來護馬曰食也鴨子黃閉氣得水則化今尚在胃口急索大棗數枚煎湯入砂仁錢許以通其氣免渴頓飲碗許氣漸通目開手足亦漸流動再煎飲之夜半吐瀉交作次日勿藥而愈

萬中丞涵臺惠痰證合琥珀丸不用棄去馬銘鞠曰此幼科絕勝藥也開絨而琥珀清香之氣觸鼻入腦光瑩可愛取之凡遇慢驚所投神驗兼治小兒一切虛證如華虛舟五郎冠甚善哭週歲中每哭即氣絕絕而甦一飯時許矣至三歲外其病日深哭而絕絕而甦甚至經時初或一月一發後則頻發有日再發者投以此藥人參圓眼湯下數丸遂瘥

琥珀丸方

琥珀

三錢

天竺黃

二錢

人參

三錢

茯神

二錢

粉甘草

三錢

硃砂

一錢五分

山藥

一兩

膽星

二錢

蓮肉

三錢

煉蜜丸硃砂為

衣每服一錢

莊斂之艱嗣辛酉辛舉一子未及三月乳婦不善撫養盛暑中擁衾令卧忽患丹毒遍遊四肢漸延腹背斂之倉皇來告予曰免方數月奈何苦之以藥急以犀角絞鮮梨汁磨服斂之間故予曰犀角能解心熱而梨汁更能豁痰且味甘則免易服別疏一方用荊芥穗二錢鼠黏子二錢

懷生地錢四牡丹皮錢一玄參錢三括婁根錢三薄荷葉錢一竹葉錢百麥門冬錢四生甘草錢三連翹錢三貝母錢三生蒲黃錢二今煎與乳婦服之乳汁即湯液矣歟之依法治之一日夜赤者漸淡再越日丹盡退後卒以乳婦不戒患驚風而瘍

稀痘神方

金銀花為末糖調不住服有效顧驥宇傳

又方 江右朱以功傳神方也

赤豆小飯黑豆 菜豆 粉草各一兩為細末用竹筒削去皮兩頭留節一頭鑿一孔以藥末入

筒中用杉木砧塞緊黃蠟封固外以小繩繫之投入臘月廁中滿一月即取出洗淨風乾每藥一兩配臘月梅花片三錢和勻若得雪中梅花片落地者不着人手以針刺取者更妙如急用入紙封套內畧烘即乾兒大者用一錢小者用五分俱以霜後絲瓜藤上小藤絲煎湯調空腹服湯宜多服服後忌葷腥十二日解出黑糞為驗一次可稀三次不出每年服一次

又方 婁江王相公傳甚効

菟絲子半斤好酒浸二宿煮乾去皮黑玄參四兩為極細末煉蜜丸如彈子大每空心白湯調化一九日二次

又方加生地黃 麥門冬各四錢犀角末一兩

又方



兔腦不去骨兔肚不去糞瑣蘭菊

錢五白葡萄

錢五共炙蜜丸每一錢白湯下此侯少之方

又方 丁見源比部傳

用白牛虱數百枚焙燥和糖令免服之服數次有紅點發出此毒解之候也不初再服先頭面
次心坎次腰肚次四肢以漸見點痘必稀白牛惟江北多虱藏牛耳中不多得須多服方効
痘症有二一曰血熱毒盛一曰氣虛毒盛氣虛者可以徐補血熱毒盛者勢必亟一發熱便口
渴面赤氣喘狂噪謔語此其證也一見點即宜涼血解毒急磨犀角汁多飲之十可療四五稍
遲難救矣又有血熱兼氣虛者初發先服涼血解毒之劑五六朝後可以併力補氣助漿唯初
時不早涼血則毒不解毒不解延至六七朝勢必以參耆助漿漿必不來反滋毒火又有血熱
毒盛似氣虛者初熱放點神思昏亂足冷痘色白如水窠唯有唇腫口渴辨其火症醫者反以
氣虛治之十無一生孫生東療鄭黃門子血熱毒盛初起急以犀角地黄湯療之不効至用白
芍藥錢八一泄毒解徐補收功家第玄箸一發熱即謔語唇腫齒黑痘欲出不出醫者以為發斑
傷寒也延仲淳施季泉不至予曰事急矣以生地錢八白芍藥錢五黃芩黃連各二錢稍加發藥日三
劑勢稍定痘漸次出醫者曰爾時宜發痘奈何以涼劑遏之予曰解毒即所以發也未幾季泉
至以予言為然第減地黃芍藥之半復于助漿中兼清涼之劑九十朝漿足卒傷一目仲淳曰
使子之言盡行則目亦可不眇矣屬後方大使此真血熱症也

松江黃綺雲療徐氏兒痘免幼遇冬月痘不起熾炭圍爐抱兒火邊以酒漿挹火火氣薰兒痘立起

又有痘而腰痛者一醫以人參蘆_三煎湯飲之一吐痘起痛尋解叩其故曰毒在下部提之則上升而毒散矣大抵痘家利吐吐中便有散毒之義

施季泉曰凡成婚或破陽後出痘而腰痛者可療童子而腰痛是先天之水不足也不治驚痘易治者以毒由心經出故輕非因恐嚇成驚反易治也其言甚有味故存之

十五里

施君諱一中在良渚去杭州塘棲八

顧叔夏次郎八歲出痘而先腰痛予斷以不治果殤

附

一小兒初痘血熱甚黃綺雲用懷生地_三濃煎頓飲其痘紫色立轉紅

臧玉涵次郎年十六因新婚兼酒食忽感痘諸醫以為不可治施季泉至八日漿清寒戰咬牙

謗語神思恍惚諸醫皆欲以保元湯大劑補之季泉以為不然改用犀角地黃湯得脫痂後忽

嘔吐大便秘結淹延一年群醫束手告急仲淳仲淳視其舌多裂文曰必當時未曾解陽明之

熱故有是症命以石膏_一兩_一人參_一兩_一麥門冬_五錢_一枇杷葉橘紅竹瀝童便為佐一劑即安再進二劑

隔間如冷物隔定父母俱謂必斃仲淳曰不妨當以參湯投之服兩許即思粥食晚得大便風

疾頓瘳

治痘喘

取白花地丁以水煎服止喘甚神

治火痘毒盛遇火令 施季泉傳

白花地丁濾汁和淡白酒漿少服之立解

治痘泄

長兒痘初熱即泄日十數行見痘泄不止時醫以脾胃藥止之愈甚施季泉曰是在不治子強之曰止泄不難發藥中加黃連錢二黃芩錢一一劑泄止予喜甚施君曰非也毒火太熾故泄初泄時即以解利藥乘熱導之或可望生今遲矣過四日即欲解毒無及矣坐視七日死

臧玉涵幼兒甫半週身熱一日即見痘郡有專門知名者延治之云樹小花多頂平脚塌根窠薄百死一生之症也五朝固辭去藥以保元湯為主擬六朝多人參加附子疑慮問施季泉忽至曰此險症且誠云必發瘁異常須看守嚴密藥用涼劑與前治大別七朝大發瘁作瀉一日夜二十餘行或藥水或乳或湯飲俱傾注不變色舉家謂必無幸矣季泉怡然自若因強之用參必不許藥內加炒黑黃連瀉止十三朝復發瘁口渴唇燥舌生白胎又加炒黃連白胎去到底不用參十九朝季泉別又誠曰慎防痘疔口瘡疔之發也必在腦後枕骨間當以收口膏藥貼之禁用摻藥口瘡惟君家人中白散為妙不數日發疔口生瘡如其言治之輒効季泉口



授一家傳祕方治痘後餘毒如神

人參 白茯苓 金銀花 犀角各三錢 甘草一錢 珍珠八分 蜜丸每服一錢日二服

一小兒痘泄諸醫以升澁之劑投之不効黃綺雲至以白芍藥約三兩餘酒炒一劑即止此脾虛有熱故也

治痘虛寒將行漿時作泄若條火熱泄者不可用

蓮肉炒去心一味為末每末一兩加雲南啞片五分研勻兒大者用末五分兒小者三分白湯調下立止虛痒或虛煩躁不止亦如之

予中甫長郎痘患血熱兼氣虛先服解毒藥後毒盡作泄日數次不止痘平臨矣仲淳以真鴉片五厘加炒蓮肉末五分米飲調飲之泄立止王宇泰繼以人參二兩黃芪三兩鹿茸三錢煎服補其元氣漿頓足蓋以先服解毒藥已多無餘毒矣故可補而無餘證

存之孫女痘後泄以鴉片如法飲之不止仲淳更以糯米蓮肉作糜一甌立愈

一老醫有孫痘已脫加少腹脹小水不通眾醫以為痘後餘毒以利水解毒藥投之愈脹老醫忽悟曰痘後無實證土堅則水清脾虛下陷故也用後方一服立効

人參兩大棗五枚水姜五片

治痘後脾虛作泄老人脾虛作瀉亦甚効

黃耆

兩四人參

兩四肉豆蔻

兩二五味子

兩四山茱萸肉

兩四蓮肉

兩六白扁豆

兩四白朮

兩三為細末

棗肉搗膏

和丸如彈子大每用一丸姜湯磨化下

一小兒痘已脫痂初無他苦一醫視其目精無神帶白曰不可為已逾日亡

治痘痂艱脫

血熱又兼血虛故艱脫也尚宜保養俟脫盡乃可見風

人參

一錢五分白芍藥

酒炒三錢甘草

炙一錢麥門冬

去心五錢五味子

六錢懷生地

四錢金銀花

四錢水煎服

時服

痘毒非元氣壯寔者不可外治大忌圍敷藥戒之

痘疳神效方

雄黃半龔共燒灰存性為末每一錢加水片二分研細吹患處立愈

治痘後翻癰

不拘上下部腫爛淋漓者俱效

象牙末

三錢真珠末

三錢白殭蠶

二錢孩兒茶

一錢五分為極細末

以濟寧胭脂調敷毒水如注漸漸收

口

防痘傷目方 吳季泉傳自王府

雌雄栴榔二枚每枚用清水粗碗上磨一百轉隨將痘兒目閉者以口津潤開用雞毛蘸栴榔

水拖眼稍三四次其痘痂即落永不傷目

又方



用真濟靈油胭脂塗眼腔週遭三四次永不傷目試之累驗

治痘後病目兼治血熱病目而脾胃壯寔者

天門冬四兩麥門冬四兩枸杞子四兩甘草一兩生地黃八兩五味子二兩甘菊花三兩玄參三兩地骨皮二兩

茯苓五兩穀精草三兩木賊草三兩蜜蒙花二兩草決明二兩女貞實九兩槐角四兩羊角二兩

蜜丸

梁溪一女子痘後目痛上白靨不見物服二十劑全愈 仲淳立

穀精草二錢草決明五錢川黃連一錢懷生地二錢川芎一分甘草六分白茯苓一錢柴胡七錢

花錢二錢石菖蒲一錢木賊草五分玄參五分連翹一錢麥門冬二錢

痧癆論并治法

痧癆者手太陰肺足陽明胃二經之火熱發而為病者也小兒居多大人亦時有之殆時氣瘟疫之類與其證類多咳嗽多嚏眼中如淚多泄瀉多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏是其候也治法當以清涼發散為主藥用辛寒甘寒苦寒以升發之惟忌酸收最宜辛散誤施溫補禍不旋踵辛散如荊芥穗乾葛西河柳石膏麻黃鼠黏子清涼如玄參括婁根薄荷竹葉青黛甘寒如麥門冬生甘草蔗漿苦寒如黃芩黃連黃蘗貝母連翹皆應用之藥也量證輕重制劑大小中病則已毋太過焉

痧癰續論

痧癰乃肺胃熱邪所致初發時必咳嗽宜清熱透毒不得止嗽癰後咳嗽但用貝母括裏根甘草麥門冬苦梗玄參薄荷以清餘熱消痰壅則自愈慎勿用五味子等收斂之劑多喘喘者熱邪壅于肺故也慎勿用定喘藥惟應大劑竹葉石膏湯加西河柳兩許玄參薄荷各二錢如冬天寒甚痧毒為寒氣鬱于內不得透出者加蜜酒炒麻黃一劑立止凡熱勢甚者即用白虎湯加西河柳切忌過用升麻服之必喘多泄瀉慎勿止瀉惟用黃連升麻乾葛甘草則瀉自上癰家不忌瀉瀉則陽明之邪熱得解是亦表裏分消之義也痧後泄瀉及便膿血皆由熱邪內陷故也夫忌止瀉惟宜升散仍用升麻乾葛白芍藥甘草白扁豆黃連便膿血則加滑石末必自愈痧後牙疳最危外用雄黃牛糞尖煨存性研極細加真片腦一分研勻吹之內用連翹荆芥穗玄參乾葛升麻黃連甘草生地黃水煎加生犀角汁二三十匙調服緩則不可救藥痧後元氣不復脾胃虛弱宜用白芍藥炙甘草為君蓮肉白扁豆山藥青黛麥門冬龍眼肉為臣多服必漸強慎勿輕用參朮痧後生瘡不已餘熱未盡故也宜用金銀花連翹荆芥穗玄參甘草懷生地鱉虱胡麻黃連木通濃煎飲之良

痧癰不宜依證施治惟當治本本者手太陰足陽明二經之邪熱也解其邪熱則諸證自退矣

治痧癰發不出喘嗽煩悶躁亂

西河柳葉風乾為細末水調四錢頓服立定此神祕方也砂糖調服兼可治癰後癰去歲銘鞠救吳少海子及其姪湯水不入矣逐口強灌之而生今歲張守為長郎初婚亦危矣治之亦愈皆仲淳法也

又方 仲淳立

蟬退錢一鼠粘子錢五炒研錢五一分荊芥穗錢一玄參錢二甘草錢一麥門冬錢三去心錢一乾葛錢五薄荷葉錢一知母錢一

西河柳錢五竹葉錢三十甚者加石膏錢五炙米錢一撮又方加三黃

賀知恩少子病痧癰家人不知尚以肉飯與之仲淳適至驚曰此痧症之極重者何易視之遂

以西河柳兩許雜以玄參錢三知母錢五貝母錢三麥門冬錢二許石膏錢半竹葉錢七十二劑而痧盡現偏體

皆赤連進四劑薄暮矣知恩曰兒今無恙乎仲淳曰痧雖出盡煩躁不止尚不可保再以石膏

三知母兩麥門冬兩三加黃芩 黃連 黃柏錢各五西河柳兩竹葉錢二百濃煎飲之煩躁遂定而瘡

冬月痧癰因寒不得發透喘渴悶亂煩躁不定用麻黃去節湯泡過以蜜酒拌炒加一錢或七

八分于治痧藥中一服立透藥用乾葛麥門冬貝母前胡荊芥玄參西河柳甘草知母

治痧後下積滯 仲淳立

川黃連酒炒升麻錢八乾葛錢八甘草錢四黃芩錢八白芍藥酒炒滑石如法懷山藥粉和丸白湯吞三

五錢

