

已4
86431

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第一百一十七

口齒門

口齒統論

論曰足太陰脾之經其氣通於口足陽明胃之經手陽明大腸之經其脉並夾於口故其府藏風邪濕熱發於經脉則於是有口吻之疾牙齒者骨之所終髓之所養也又手陽明之支脉入於齒故骨髓之氣不足與夫陽明之脉虛不能有所滋養則於是有牙齒之疾牙齒之疾其候甚多治療之法固不得略也養生方云雞鳴時常叩齒三十六下食畢令啄齒皆宜長行之令齒不蠹蟲又云早朝未起漱口中玉泉令滿口嚥之啄齒二七過去蟲而牢齒千金又曰每旦以鹽一捻內口中以煖水揩漱及叩齒百遍為之不絕不過五日即牢密若此之類皆簡易可行行之有效不可忽也

口瘡

論曰口瘡者由心脾有熱氣衝上焦熏發口舌故作瘡也又有胃氣弱穀氣少虛陽上發而為口瘡者不可執一而論當求所受之本也
治熱毒發動口瘡心煩躁玄參煎方

生玄參汁 生葛汁各半 銀兩各一 寒水石搗末 石膏搗末

滑石搗末 磁石搗末 升麻 羚羊角鎔

犀角鎔 甘草剉各兩 芒消壹斤 牛黃研為細末

右一十三味除銚銀玄參生葛芒消牛黃外並麤搗篩以水三斗煎銀寒水石石膏滑石磁石以汁二斗去滓別以水五盞煎升麻羚羊犀角甘草至二盞去滓與玄參并生葛汁一處都和再煎如稀餲然後下芒消攪勻傾入瓷器中盛却入牛黃末再攪取勻停冷黃黑色每取兩大匙入蜜一合和勻分四服熱湯調下不拘時候

治口瘡槐枝煎方

槐枝二三月採好者剉 桑枝剉 柳枝剉各壹斗

得壹斗去滓再入銅鑊煎至伍升入後藥 槐蠹蟲壹兩 細辛去苗葉兩 藁本去苗土壹兩

胡桐淚 升麻 莽草各半 麝香研壹分

右一十味將後七味搗羅為末入前藥汁內更煎如餲臨卧淨漱口以藥半匙傅痛處有涎即吐之臨卧再用

治口爛生瘡水漿不下當歸膏方

當歸

壹兩

射干

升麻

附子

去皮臍切各半兩

白蜜

肆合

豬脂

伍兩

右六味除蜜脂外並剉先煎脂化去滓入諸剉藥慢火煎候附子色黃又去滓入蜜更煎如膏以瓷器盛每服如杏核大含之曰三五度嚥津不妨

治口瘡及喉閉吹喉朴消散方

朴消

消石

膽礬

白礬

芒消

伍味皆枯乾

寒水石

燒

白殭蠶

直者炒

甘草

青黛

研各等分

右九味搗研為細散和勻每用少許摻瘡上遇喉閉用筆管吹一字在喉中立破

立破

治口瘡并咽喉塞黃連膏方

黃連

去須剉參兩

豬脂

壹斤

白蜜

肆兩

羊髓

研各兩

右四味先以慢火煎豬脂取油去滓入黃連又煎令黑色下羊髓髓化以綿濾去滓入蜜更煎數沸成膏瓷合盛候冷每含如棗大日三五度嚥津不妨治口瘡多年不差風熱上攻普微膏方

普微根

郁李根

水楊皮

牛蒡根

並細切各壹斤

蒼耳升壹

露蜂房碎擘

生地黃切

升麻

當歸洗切各壹兩

地骨皮

白芷

石膽研各半兩

熟銅粉研

麝香研各壹分

右一十四味先以前六味細切水二斗煎至五升葛布絞去滓次入地黃升

麻當歸地骨皮白芷再煎至二升綿濾去滓慢火又煎成膏乘熱下後三味

研藥攪令勻瓷器盛每含如彈丸大吐津

治口瘡積年不差丹砂膏方

丹砂研壹分

豬脂

蜜各參兩

杏仁湯浸去皮去雙人研參柒粒

臍粉

白礬研

胡粉硃壹

麝香研壹

生地黄切兩

右九味搗研七味為末先煎脂蜜令化去滓次下諸藥更煎十餘沸以綿濾

去滓更煎待膏就瓷合盛每用如杏人大綿裹含吐津

治久患口瘡不任食物雞舌香方

雞舌香末

松脂研壹分

胡椒為末參柒粒 細辛為末參分

右四味用蘇木濃煎汁和藥丸如梧桐子大每以煖水研一丸塗瘡上

治口瘡久不差燒肝散方

茵陳蒿

犀角屑

石斛去根

白朮

茈胡去苗各半兩

芍藥

紫參

桔梗剉炒

防風義

桂去麋皮

吳茱萸

湯浸參
焙炒

人參

白蕪荑

各壹分

右一十三味搗羅為散每服五錢匕以白羊肝五兩細切去筋膜入葱白三

莖細擘相和濕紙三五重裹慢火煨熟空腹頓服米湯下

治口瘡經年歇發飲食艱難薔薇根散方

薔薇根

剉壹握

蜀椒

去目并閉口炒
出汗肆拾玖粒

右二味搗羅為散以漿水二盞煎五七沸去滓熱含冷吐

治牙疼口瘡積年不差蟾酥丸方

蟾酥

壹片水浸令軟

麝香

研少許

右二味細研丸如粟米大以綿裹一丸於病處咬之有涎即吐

治口瘡久不差方

薔薇根

壹握

右一味剉用水一升煎至半升候冷含稍稍嚥之冬用根夏用莖葉又宜同
角蒿灰塗有涎吐之

治元藏虛冷上攻口瘡巴戟散方

聖濟總錄

卷一百一十六

口齒門

三

巴戟天

去心壹兩 白芷

半兩

高良薑

為末壹錢匕

右三味搗為細散用豬腰子二隻去筋膜每一隻入藥散一錢匕用濕紙裹煨熟乘熱去紙以口吸熱氣有涎即吐候冷細嚼服之

治口瘡杏仁丸方

杏仁

湯浸去皮去雙人拾粒

蛇牀子

燒灰

白芷

燒灰

膩粉

各壹分

右四味研杏仁如膏和三味為丸如雞頭實大每細嚼五丸不得嚥津吐涎出立効

治口瘡甘草煎方

甘草

炙為末半兩

豬膏

肆兩

白蜜

貳兩

黃連

去須為末壹兩

右四味先煎脂令沸去滓下蜜并藥等慢火熬成煎每服一匙頭含嚥津以差為度

治口瘡白礬煎方

白礬

末

鉛丹

研各壹兩

附子

去皮臍生為末

屋下大煤

各半兩

右四味搗研為末入白蜜三兩煎為煎入竹筒盛飯上炊一次每用少許含吐涎出効

治口瘡黃蘗煎方

黃蘗末壹兩

硫黃研壹分

黃連末壹兩

麻油半斤

亂髮洗去脂參兩

右五味先將油煎髮銷然後下黃蘗等末重煎待凝成煎每含如杏人大吐津不得嚥

治口瘡疼痛石膽煎方

石膽半錢燒研末蜜壹合

蟾酥研半錢

黃蘗末壹錢匕

右四味先於鑪中慢火煎蜜次下藥末煎如飴每含如杏核大吐津不得嚥

治口瘡杏人煎方

杏人去皮共雙人研貳柒粒

胡粉研

鉛丹研各壹分

右三味用蜜五合調和用竹筒盛蒸一次久旋含之吐津不得嚥

治口瘡麝香散方

麝香研壹字

胡黃連錢壹

梔榔生剉壹枚

右三味搗研為細散旋傳之

治口瘡滑石散方

滑石

膽礬各壹兩

右二味搗研為散每用一錢匕以綿裹含吐津

治口瘡疼痛生薑煎方

生薑

取汁壹盞

白沙蜜

兩

右二味同煎十餘沸用瓷器盛時時以熟水調一匙頭含嚥之

治口瘡柳花散方

黃蘗

壹兩

澱花

兩

右二味為散臨卧乾摻誤嚥亦不妨

治口瘡麝香散方

麝香

許少

人中白

錢壹

右二味研細綿裹如菜豆大含之嚥津

治口瘡二物散方

白殭蠶

黃連

各等分

右二味為末臨卧摻口內

治口瘡諸藥不效碧玉散方

膽礬

半兩錫子內燒通赤地上出火毒

右一味細研每取少許傅瘡上有清涎吐之

治口瘡附子塗脚方

附子壹枚生為末

右一味以薑汁和勻攤脚心

治口瘡藁荷根湯方

藁荷根貳兩

右一味細剉分為三分每分以水二盞煎三五沸去滓熱含冷吐

治口瘡升麻含汁方

升麻不拘多少

右一味含一塊嚥津

治口瘡齊芎煎方

齊芎參拾枚

右一味以薄綿裹酒煮二十沸許取出每含一枚良久嚥嚥之日三五度

治口瘡豆豉散方

豆豉肆兩炒

右一味搗羅為散每用綿裹一錢匕含之日五七次

治口瘡乾蟾散方

乾蟾炙壹枚

右一味搗研為散綿裹半錢匕含吐津

治口瘡胡粉膏方

胡粉炒研壹兩

右一味以牛酥調如膏每含如杏人大嚥津

治口瘡馬牙消散方

馬牙消研末壹兩

右一味每含一錢匕嚥津日三五度

治口瘡檳榔散方

檳榔剉

右一味為散每取半錢匕塗舌及脣上

治口瘡桑汁塗方

桑條汁壹合

右一味早晨塗口舌上

治口瘡蒲黃散方

蒲黃

壹兩

右一味每用一錢匕傳口舌上嚥之

治口瘡無食子散方

無食子

燒灰細研壹兩

右一味每取一錢匕傳舌上日三五次

治口瘡楸木汁方

楸木白汁

伍合

右一味每取一匙頭含嚥

治口瘡蟾酥線方

蟾酥

貳片

右一味以半盞水浸化為水更入牛黃末一錢匕攪勻以絲線五十條就藥中浸一宿陰乾每取一條含吐津

治口肥瘡方

竈上飲食

右一味炒令焦研末傳之

治下冷口瘡神聖膏方

吳茱萸壹兩

右一味擣羅為末用酸醋一大盞調熬成膏後入地龍末半兩攪勻每臨卧時先用葱椒湯洗足拭乾用藥徧塗兩脚底心或以手帛子繫定次日必減未減再塗

治口内生瘡齒斷肉爛升麻飲方

升麻

黃連貳兩

羚羊角銖

玄參

黃芩去黑心

麥門冬焙去心 葛根剉

大黃剉

羌活去蘆頭

防風去叉

甘菊花各半兩 人參分

甘草剉

知母略壹兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服食後

治口瘡眾藥不差者蜜陀僧散方

蜜陀僧

黃蘗去麤皮

甘草各壹兩并蜜塗炙香

蒲黃

黃藥子各半兩

右五味搗研為散時時傅之

治久患口瘡黃連膏方

黃連銹法

升麻

槐白皮

大青

苦竹葉各壹兩

右五味細剉以水二升煎至半升去滓取汁入龍腦蜜攪令勻煎成膏塗瘡上日三度

治舌上生瘡鉛丹膏方

鉛丹壹兩半

蜜參合

生地黃汁

參杏人研如麪共雙人別

右四味合和一處調勻銀器內煮用槐枝攪不得住手看色紫即成取少許口內含化吐津

治口瘡久不差蟾酥線方

真蟾酥伍分大蓬砂

龍腦

麝香各壹分

右四味同研極細以溫湯半盞化令勻入緋線秤半錢蘸藥汁曬乾再蘸再曬候藥汁盡將線寸截每用一條貼於患瘡處有涎即吐一日三五次易之取差為度

治大人小兒卒患口瘡鉛霜散方

鉛白霜研細不拘多少

右取少許塗傳痛處一兩度差

治卒患口瘡升麻湯方

升麻剉

黃蘗去麤皮剉

大青各一兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎取一盞熱漱冷吐

治口舌生瘡久不差白芷散方

白芷末壹錢

銅綠壹錢

白殭蠶半斤

乾烟脂半錢

右四味搗研為末每用少許以雞翎子掃瘡有涎吐之不得嚥津

治虛勞口瘡久不差秦朮散方

秦朮去苗土

此胡去苗壹兩

右二味搗羅為散每服三錢匕割豬肝三兩片用酒煮之去肝取酒調藥溫

服十服當愈

治心肺壅熱口内生瘡胸膈痰逆玄參湯方

玄參

茅根剉

羌活去蘆頭

竹茹

木通剉

羚羊角銹

升麻各半兩

黃連去蘆

人參

苦竹葉

半夏

湯洗去滑各參分

甘草

剉壹分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去滓溫服

食後

治口瘡久患不差銅綠散方

銅綠

研壹錢

鉛丹

炒研半兩

白芷

焙壹分為末

右三味合研令勻取少許摻舌上即差

治口瘡痛茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

人參

各壹兩

右二味麤搗篩分作四服每服水二盞煎至一盞去滓溫服日三不過二劑

治口瘡玄參丸方

玄參

天門冬

去心

麥門冬

去心

各壹兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大每用一丸綿裹含化嚥津

治口常有瘡瘼藥子散方

瘼藥子

炒去

藊豆

炒各兩

右二味搗羅為散如茶點喫

口糜

論曰膀胱移熱於小腸，腸胃不便，上為口糜。夫小腸之脈絡心循咽下，膈抵胃陰陽和平水穀入胃，小腸受之，通調水道，下輸膀胱。今熱氣厥逆，膀胱移熱於小腸，胃之水穀不得傳輸於下，則令腸胃塞而不便，上則令口生瘡而糜爛也。大抵心胃壅熱，則必熏蒸於上，不可勝以傳藥，當求其本以治之。

治小腸熱，脹口糜生瘡，此胡澤瀉湯方。

芫胡祛

澤瀉

黃芩去黑心

枳實祛

陳橘皮浸去白焙

旋復花

升麻

芒消別研各參兩

生地黃升

右九味除芒消外，咬咀如麻豆大，每服五錢匕，水二盞煎取一盞，去滓下芒

消末半錢匕，攪勻食後溫服。

治口糜生瘡久不差，及心脾中熱，乍發乍退，大青丸方。

大青根

甘草炙

枳殼去穢炒

苦參剉各參分

生乾地黃焙

黃連剉

升麻各壹兩

右七味搗羅為末，鍊蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，食後熟水下，日二服。

治口糜主瘡久不差，大黃散方。