

跌撲傷損
膏藥方

薛氏外傷主治分證論
摻藥方

瘍科選粹卷八

瘍科選粹目錄

第八卷

跌撲傷損第一百八

接骨丹

乳沒散

當歸導滯湯

雞鳴散

失笑散

續骨丹

接丹九煉丹

人中白散

當歸鬚散

乳香定痛散

夜合散

破血消痛散

復元羌活湯

乳香神應散

巴戟湯

補骨散

丹溪接骨散

活血和氣飲

聯骨散

接骨神方

神仙接骨丹

接骨紫金丹

接骨如神丹

東垣地龍散

麻藥

整骨麻藥

草烏散

葱罨法

定痛膏

經驗方

消毒定痛散

散血膏

截血膏

活血散

一赤散

一黃散

洗藥荆藥散

接骨敷貼藥

接骨丹

消腫紫金皮散

地黃膏

消腫膏

芙蓉膏

紫金膏

退腫膏

一紫散

澤蘭散

內服藥方

疎風敗毒散

交加散

羗活乳香湯

清上

瘀血湯

消下破血湯

大紫金皮散

破血藥

花蕊石散

破血消痛湯

二十

五味藥

清心藥

下瘀血方

止痛

藥

急救方

散血定痛補損丹

定痛當歸飲

活血順氣何首烏散

活血丹

黃末子

紅末

子

黑末子

白末子

橘木

四物湯

黑神散

當歸補血湯

復元

通氣飲

定痛紫金丹

金瘡白藥

理傷膏

封口藥

末藥散

生肌止血立効方

丹皮散

定痛乳香神應散

單方十三條

跌面青傷

傷齒

傷腎囊

傷耳鼻

擔子傷肩

薛氏外傷分證主治論第一百九

脇肋脹痛

小柴胡湯

腹痛

加味承氣湯

小腹引陰莖作痛

肌肉作痛

創口痛

瘀血作痛

青腫不消

腐肉不潰

新肉不生

出血

瘀血流注

昏憤

眩暈

煩躁

發熱

胸腹痛悶

作嘔

嘔吐黑血

百合散

喘咳

二味參蘇飲

十味參蘇飲

作渴

膏藥方第一百十

神異膏

血竭膏

清涼膏

碧油膏

太乙膏

當歸膏

十香膏

白龍膏

東垣熱瘡膏

水澄膏

雲母膏

善應膏

長肌膏

金絲萬應膏

神聖膏

熱瘡寒膏

寒瘡熱膏

風溼氣膏

蜜膏

白玉膏

萬靈膏

遇仙膏

拔毒膏

火線膏

棒瘡膏

萬金水澄膏

萬靈膏

清涼膏

黃蠟膏

銅青膏

玄玄膏

呼膿長肉比天膏

神膏

淮安狗皮膏

拔毒膏

風氣痛膏

造化爭雄膏

附

消息向導丸

中和丸

用藥法

千金不易助陽膏

無價寶膏

紫金膏

阿魏膏

參藥丹丸錠子方第一百十一

鯽魚散

聖効散

檳榔散

蚣蝎散

乳香定痛散

桃花散

追毒散

翠霞散

搜膿散

引膿散

乳香散

釣苓散

白龍散

又桃花散

金黃散

消毒散

平肌散

烏金散

神僊萬應解毒丸

卽紫金錠
見用藥論

一粒金丹

萬應針頭丸

針頭散

奪命丹

見瘡瘍

勝金丹

寸金丹

時効針頭散

奪命丹

千金托裏散

奪命丹

去腐散

金形如聖散

金銀地丁散

桃花活血散

惡瘡錠子

解毒如聖丹

鹵水圍藥

金箍散

圍藥方

諸般敗毒散

瘍科選粹卷第八

木

繡水陳文治 輯

東吳繆希雍叅校

跌撲傷損第一百八

脉經曰從高顛仆內有瘀血腹脹滿其脉堅强者生
小弱者死 金瘡出血太多其脉虛細者生數實
而大者死

破傷有瘀血停積者其脉堅強實則生虛細澀則死
若亡血過多者其脉虛細澀則生堅強實則死皆
以脉病不相應故也

顛撲迷悶者酒調蘇合香丸灌之顛撲損傷宜逐其
惡血酒煎蘇木調蘇合香丸或雞鳴散或和氣飲
加大黃入醋少許煎或童便或蘇木煎酒調黑神
散烏藥順氣散亦可用傷損疼痛酒調琥珀散佳
大法固以血之或瘀或矢分虛實而爲補瀉亦當看
損傷之輕重輕者頓挫氣血凝滯作痛此當導氣
行血而已若重者傷筋折骨若欲續接非數月不
瘥若氣血內停沮塞真氣不得行者必死急瀉其
血通其氣庶可施治

損傷寒涼一毫俱不可用蓋血見寒則凝若飲冷致

血入心卽死唯看有外傷者當內外兼治若外無所傷內有死血唯用蘇木等治血之藥可下者下之雞鳴散是也

亦有血迷心竅而致昏沉不知人事者宜花蓋石散童便調服有神魄散失一時不省人事者唯在臨期斟酌大抵跌撲之病全在補氣行血若自然銅之類雖有接骨之功而燥散之害甚於刀劍丹溪備言之矣

跌撲脇痛血歸肝也破血消痛湯復元羌活湯乳香神應散皆可用

凡腦骨傷破輕手搏捺平正不破者用退腫膏敷貼
若皮破肉損者先用封口藥捺之外以散血膏貼
之血流不止用止血散捺之不可見風恐作破傷
風

凡腦骨傷損在硬處可治傷在太陽穴不可治須依
上用藥若欲洗宜以熱油和藥水洗或溫茶洗之
諸處法略同

面傷青黑用一紫散敷或紫金膏貼之傷重者補肉
膏敷貼腦兩角及眉稜耳鼻大約同以上數法施
治

凡牙齒跌磕傷損用補肌散摻及封口藥揆再服破
血藥用水煎勿用酒凡傷齒未動者用芙蓉膏末
摻已動者蒺藜根燒存性爲末揩搽卽固

凡手足骨折斷中間一縛可帶緊兩頭放寬庶乎氣
血流蔭若如截竹斷却要兩頭緊中間放寬使氣
血來聚斷處俱用定痛膏接骨膏敷貼夾縛

凡手指跌撲或刀斧打碎用雞子黃油潤之次揆封
口藥外以散血膏敷貼絹片縛定咬傷者用澤蘭
散敷之若有寒熱者用退熱散敷之寒熱已卽去
之

凡胸膈骨爲拳搥所傷外腫內痛外用定痛膏敷貼
內用破血藥利去瘀血或用消血草搗汁酒服或
爲刀劒所傷仍用封口藥揅口外用補肌散以雞
子清調敷內服補損藥活血丹

凡胸骨筋斷先用破血藥後用定痛膏接骨膏敷貼
皮破者用補肉膏貼

凡脇筋傷重血不通者用菉豆汁生姜和服以壯力
人在後擠住自吐血後用破血藥

傷肚腸出以麻油潤瘡口輕手納入以通關散少許
吹其鼻令噴嚏其腸自入用桑白皮線向皮內

合後以封口藥塗傷處外用補肌散用雞子清調
勻敷貼或用散血膏尤妙線上用花蕊石散敷之
凡肚肉被傷急利大小腸不可令秘恐致重患

腰腿脚骨等傷甚難整當臨時相度隨其傷處用法
整頓歸元先用麻藥與服令不知痛然後用手全
用酒佐氣血藥俱加杜仲

脚有六曰四折骨凡脚板上交胛處或挫出曰須用
一人拽正自摸其骨或突出在內或出在外須用
手力整歸窠若只拽不用手整便成痼疾正後用
定痛膏接骨丹敷貼四折骨用正副夾縛六出曰

只以布包不可夾手臂骨出臼與足骨同治法手足筋脉最多時時要曲直不可定放又時時看顧恐再致出窠

凡脚大腿根出臼此處身上骨是臼腿根是杵或前出或後出須用一人手把住患人身一人拽脚用手盡力掬令歸窠或是判開可用軟綿繩從脚縛倒吊起用手整骨節從上墜下自然歸窠却用接骨膏定痛膏敷貼夾縛凡出臼急與接入臼中若血漬白中卽難治

凡手脚骨被壓碎者以麻藥與服或用刀刮開尖骨