

萬病回春

	已 4
	71-2
	共 8 冊



新刊萬病回春原本卷之三

大醫院吏目金豁雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

瘧疾

脈瘧脈多弦弦而數者多熱宜汗之弦而遲者多寒宜溫之弦而緊實者宜下之弦而虛細者宜補之弦而實大者宜吐之弦短者多食弦滑者多痰瘧脈遲緩者病自愈久瘧不愈者脈必虛宜養正去邪
天瘧者因外感風寒暑濕內傷飲食勞倦或飢飽色慾過度以致脾胃不和痰留中脘然無痰不成瘧脾胃屬土有信來去不失其時若多時或早或晚者是邪無容地瘧將好也瘧疾來時呵欠怕寒手足冷發寒戰太熱口渴頭痛腰膝骨節酸疼或先寒後熱或先熱後寒或單熱單寒或寒多熱少或熱多寒少一日一發受病後也容易治聞日發者或二日連發住一日者皆難痊治宜在表無汗者散邪湯為主有汗者正氣湯為主在半表半裏者柴苓湯為主分利陰陽而未已者人參養胃湯加減後方可截之若用截藥吐出黃膠水者瘧自愈也不可一兩日早截早則邪氣閉塞而成壞症又不可遲截遲則元氣衰憊而成虛怯當在三四日就截為好須待熱退身涼方可飲食也切不可帶熱飲食恐不消而成痞一名瘧母瘧散成膿者有之矣
大凡瘧初起者散邪正氣為先也 無汗要有汗散邪為主

○散邪湯

治瘧疾初發實寒壯熱頭疼身痛無汗

川芎

白芷

麻黃

白芍

防風

去荊芥

紫蘇

羌活

各一

甘草

右剉一劑生薑三片葱白三根水煎去渣露一宿次早溫服○有痰加陳皮○有濕

加蒼朮

○交食加香附○有汗要無汗正氣為主

○正氣湯

治瘧疾初發實寒壯熱頭疼口乾有汗

柴胡

前胡

川芎

白芷

半夏

薑參

門冬

去檳榔

草果

去青皮

去茯苓

去皮各

桂枝

甘草

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎預先熱服

瘧發寒熱作渴者宜分利陰陽也

○柴苓湯 治瘧發寒熱病在半表半裏陰陽不分 柴胡 黃芩 人參 半夏 猪苓 澤瀉 白朮

茯苓 肉桂 甘草 右剉一劑生薑三片棗一枚水煎服○無汗加麻黃○有汗加桂枝○寒多加薑

桂○熱多加黃芩

虛人患瘧者養正邪自除也

○人參養胃湯 治暴瘧初起服二帖後用人參截瘧飲加減截之 人參 茯苓 去陳皮 半夏 薑汁厚朴

薑汁 烏梅 蒼朮 浸 藿香 當歸 川芎 草果 去壳各 甘草 右剉一劑生薑三片棗一枚水

煎溫服○寒多加官桂○熱多加柴胡○汗多去蒼朮藿香川芎加白朮黃芪○飽悶加青皮砂仁去

參○渴加麥門冬知母去半夏○瀉加炒白朮芍藥瀉不止加肉豆蔻去厚朴草果○嘔噦加白朮山藥

炒砂仁炒米去草果厚朴蒼朮○痰多加貝母竹瀝去半夏草果○內熱盛加炒黃芩去半夏○長夏暑

熱盛加香薷扁豆去半夏藿香

○人參竹瀝飲 治虛瘧昏倦汗多痰盛舌大語言混雜不清脈虛大無力 人參 去白朮 茯苓 去當歸

生地黃 烏梅 醋 酸棗仁 炒 麥門冬 去 知母 陳皮 芍藥 各一 甘草 右剉一劑生薑三片棗一枚

水煎入竹瀝半盞薑汁少許同服

風暑入陰在臟者瘧瘧也

○柴胡芍歸湯 治夜間陰瘧引出陽分則散後服人參截瘧飲止之 柴胡 桔梗 去當歸 川芎 芍藥

人參 厚朴 薑汁 白朮 去 乾葛 茯苓 去陳皮 各一 紅花 甘草 右剉一劑生薑一片棗二枚烏梅

一箇水煎食遠服

人虛者截補兼用也

○人參截瘧飲 治虛人截瘧一切瘧疾並可截之 人參 白朮 去 茯苓 去 當歸 青皮 去 厚朴 薑汁 柴

胡黃芩

知母去毛各八分

桂枝三分

常山酒浸

草果去壳各八分

龜甲醋炙八分

烏梅一箇

甘草三分

右剉一劑生薑一片

乘二枝桃核七箇水煎露一宿臨發日五更空心溫服渣待日午再煎服糖拌烏梅下藥切忌難魚豆腐麪食及房勞怒氣戒之即痊 此方俱照前人參養胃湯後開治加減法相同截瘧飲加酒少許尤妙

人壯盛者宜單截也

○不二飲 治一切新久寒熱瘧疾一劑截住神効

常山

檳榔要一雞一雞若重

二錢餘藥各二錢

知母

貝母各等

右

剉每八錢酒一鍾煎至八分不可過熟熟則不効露一宿臨發日五更溫服勿令婦人煎藥

○常山七寶飲 治壯健人瘧疾可截之

常山

草果去核

青皮

厚朴薑汁

知母

蒼朮米泔

各一錢

右

剉

一劑生薑一片

甲一錢烏梅一箇甘草三分

右剉一劑生薑一片

桃核七箇

水煎入酒少許

露一宿

臨發日五更溫服

半間

渣再煎服

○汗多加白朮去蒼朮

○熱多加黃芩柴胡

○寒多加桂枝

○口渴加麥門冬

○天花粉

○痰多加

貝母

○瘧久不止者先截而後補也

○如聖散

人參錢三

常山錢三

丁香二十箇

甘草二分

右為細末

用好酒一鍾

烏梅一箇煎熟露一宿

臨發日五更

溫服用糖拌烏梅下藥時時可食之

○雄黃截瘧丸

人言錢雄黃

錢辰砂

錢甘草

錢萊豆粉

一兩

右藥各為細末

用萊豆粉打糊為丸

如白豆

大外用朱砂為衣

臨發日五更白滾水吞服二丸

小兒一丸勿多服

瘧已後者須調養血氣也

○參歸養榮丸

治瘧疾截住後服此湯藥調養血氣

人參

當歸

茯苓

白朮

陳皮

熟地黃

砂

仁

厚朴

薑汁

山藥

炒蓮肉

炒芍藥

炒酒甘草

等分

右剉一劑大棗二枝

水煎溫服

○瘧熱虛汗加黃芪

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

去砂仁

腹中有塊者瘧母也 凡瘧發時切不可帶熱飲食恐不消而成痞塊痞散成鼓者有之矣

○參歸薑甲湯 治老瘧腹脇有塊成瘧母 人參^{五錢} 青皮^{三錢} 薑黃^{三錢} 歸身^{三錢} 白朮^{三錢} 厚朴^{三錢} 砂香附^{各八分} 砂仁^{八分} 山查^{三錢} 枳實^{三錢} 甘草^{三錢} 右剉一劑生薑一片棗二枚烏梅一箇水煎

食前溫服

如製丸藥加阿魏醋煮化和前藥末再用水醋少許打糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心

米湯吞下

○十將軍丸 治久瘧不瘥有瘧母者 三棱^{三錢} 莪朮^{三錢} 青皮^{三錢} 陳皮^{三錢} 白朮^{三錢} 砂仁^{三錢} 檳榔^{三錢} 烏梅^{三錢} 肉桂^{三錢} 至晚入瓦銚內炭火煮取出曬乾若無日色用火焙乾為末半酒半醋打糊為丸如梧桐子大每服三四

夏^{各一兩} 常山^{三錢}

右先將常山草果二味剉用酒醋各一碗入瓦器內先浸一宿後入八味藥同浸

十九白湯吞下日進三服忌生冷魚腥酸鹹油膩麪食炙燥諸死毒物服至四兩至八兩即除根凡有實

聚及煙瘴濕地方更宜服之一方加蒼朮香附醋炒各一兩平素虛弱兼以勞役內傷夾感寒暑以致瘧

疾寒熱交作肢體倦怠乏力少氣用補中益氣湯加黃芩芍藥半夏有汗及寒重加桂枝焙黃芪熱盛倍

柴胡黃芩渴加麥門冬天花粉

大凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不

食戰慄泄瀉手足厥冷皆脾胃虛弱但服補中益氣湯其諸症悉愈

大抵久瘧氣血俱虛而三日一發者用十全大補湯益邪氣在陽分者淺而易治邪氣在陰分者深而難治

婦人瘧後形體骨立發熱惡寒自汗盜汗胸膈痞滿日飲米湯少許服參朮藥益服臥床半年矣余以為陽

氣虛寒用大劑補中益氣加附子一錢二劑諸症漸退飲食漸進又二劑全愈

痢疾

脈前脈多滑按之虛絕尺微無陰濇則少血沈細者生洪弦者死

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

痢疾不分赤白俱作濕熱治之明矣赤屬血白屬氣赤白相兼膿血雜痢皆因脾胃失調飲食停滯積於腸胃之閒多其暑濕傷脾故作痢疾起於肚腹痠痛大便裏急後重小水短赤不長身涼脈緩者易治身熱脈弦急者難治痢疾初起一二日元氣壯實者先用玄白散虛弱者用芍藥湯疎通積滯三四日以後元氣漸弱調和飲食加減治之如不止服參歸芍藥湯調理脾胃補益元氣久不愈方可服真參養臟湯加減治之切不可驟用栗殼等藥止塞太早恐因積氣未盡成休息痢亦恐毒攻上胸腹飽悶作疼惡心嘔噦發脫難治因毒氣攻胃故也先水瀉後膿血者是腎傳脾難愈先膿血後水瀉者是脾傳腎易愈又有痢下鮮血者如塵腐色者如屋漏水者大孔如竹筒者嘔噦發呃煩燥身熱者俱難治也如魚腦髓者身熱脈數大半生半死也大抵治痢疾一二日元氣未虛治宜疎通積滯此通因通用之法三四日後不可疎通恐元氣盛也當清熱解毒調養脾胃為主經云行血則便膿自愈調氣則後重自除若大腸積滯雖實而後重法當疏導之若大腸氣為下陷而後重法當升補之

初下痢者不分赤白皆濕熱也壯盛人初痢宜利之

○玄白散 治痢疾初起裏急後重腹痛膿血窘迫壯盛人一劑即愈 牽牛赤痢用黑白痢用白赤白相生 地黃 赤芍 歸尾 檳榔 枳殼去穢 義木 環黃連各二錢 大黃錢二 暑月加香薷炒 右剉一劑水煎空

虛弱人初痢宜清之

○芍藥湯 芍藥錢一 木香錢一 當歸錢一 枳殼錢一 檳榔錢一 黃芩錢二 黃連錢二 甘草錢五 右剉一劑水煎溫服

下痢積久者宜調和也

○調和飲 白芍錢三 當歸錢一 川芎錢二 黃連錢二 黃芩錢一 桃仁錢一 升麻錢五 右剉一劑水煎空心服○如紅痢依本

方○如白痢用吳茱萸一錢苓連用酒炒○赤白痢加白朮茯苓陳皮香附各一

痢因熱積而氣滯者宜清熱順氣也

○立効散 治赤白痢疾膿血相兼裏急後重疼痛一服立止 淨黃連四兩酒洗吳茱萸三兩同炒去茱萸不用陳枳殼兩錢

右二味為細末每服三錢空心黃酒調下瀉瀉米湯下○口噤痢疾陳倉米湯送下

下痢發熱不退者腸胃中有風邪也

○倉廩散 治痢疾赤白發熱不退腸胃中有風邪熱毒及時行瘟疫滿門闔境皆下痢噤口者服之神効

即人參敗毒散加黃連陳倉米三百粒薑棗煎服○如痢後手足痛加檳榔木瓜○噤口痢加陳倉米

撮石蓮肉七枚

下痢發熱使閉者表裏有實熱也

○六一順氣湯方見傷寒 治痢不閉赤白相雜肚疼裏急後重渾身發熱口乾發渴用此通利即止

下痢噤口不食者脾虛胃熱甚也

○參連湯 人參五錢黃連一兩 右剉一劑水煎終日時呷之如吐再強飲但得一口呷下咽喉即好加石蓮肉

三錢无効外以田螺搗爛盒臍中引藥下行故也

○開噤湯 治噤口痢疾徐元濟傳 砂仁一錢砂糖七錢細茶五錢生薑五錢 右剉一劑水二鍾煎至八分露一

宿次早面北溫服外用木龍子二錢去殼麝香二分共搗置臍中即思食

一方 治噤口痢米穀不下者神効用石蓮肉為末每服二三錢用陳倉米湯調下即効嘔加生薑汁二三匙

下痢久不止者宜調養氣血兼升澀也

○參歸芍藥湯 治痢久一二十日痢多不止用此調養氣血自愈 人參一錢當歸二錢酒洗 白朮一錢砂仁七錢山藥五錢陳皮各一錢甘草五分 右剉一劑烏梅一箇燈草一團蓮肉七箇水煎溫服服後加減



噤口痢不食者胃口熱極故也○加炒黃連蓮肉人參炒米烏梅清熱開胃為主

下痢腹痛裏急後重者是熱積氣滯也○又云裏急者腹中不寬快也亦有虛坐而大便秘行者皆血虛也血虛則裏急後重如四物湯之類治之加木香檳榔和消積氣則後重自除

久痢後重不除者虛氣墜下也 治痢用下藥除積仍後重者乃陽不升也用升麻為君 加人參當歸芍藥

為君升麻少許提氣

大凡痢作痛者熱下流也 加炒黃芩芍藥清之

痢後發熱不止或積少但虛坐努力者俱是血虛故也○倍加當歸芍藥地黃滋養陰血其熱自安

積中有紫血者是瘀血也 加芍藥紅花生血和之則便血自愈

痢下如菜豆汁者是濕也 加蒼朮白朮滲濕利小便

○實腸散 治久痢去多不分赤白用此末藥兼出黃蘗末 乾山藥炒黃色 好蓮肉炒去心 炒黃米各一兩 右

共為細末用砂糖調熱湯和勻前藥末不乾不稀漸漸調服後用清米湯嗽口常服之最効

○湯泡飲 治久痢不愈無分赤白俱可服 粟殼蜜炙炒 烏梅去核 甘草分蜜炙 右剉碎用滾水一鍾泡

浸一時去渣三次服之

○真人養臟湯 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急後重臍腹疼痛或脫肛下墜酒毒便

血並皆治之 肉桂分人 人參去 當歸訶子 木香甘草 肉豆蔻各一錢 芍藥炒 白朮各一錢 枳殼

一錢 右剉一劑水煎食前溫服○臟寒者加附子一錢製

凡痢疾日久不愈不能起床不思飲食瘦弱之甚者用補中益氣湯去柴胡加炒芍澤瀉木香砂仁白朮地榆

要穀醋炒方見補益

大抵久痢不止多屬血氣虛弱宜用八珍湯若脾氣虛而血弱者用四君子湯若胃氣虛而血弱者用補中益

氣湯大凡此症久而不愈或變症百出但守前法久之自愈補說
血痢及下血久不止用六味丸加地榆阿膠黃連黃芩生地黃補說

補遺方

○狗皮膏 貼瀉痢如神 乳香五錢沒藥五錢木鼈子十兩柳枝四十斤杏仁四十斤桃枝四十斤右用香油

七兩將木鼈子以下四味入油礪浮撈起渣從下好黃丹飛過三兩熬將成膏用槐枝不住手攪滴水成珠
退火再入乳香沒藥加麝香一分攪勻退火毒以狗皮攤膏貼臍上

○瀉痢膏 赤石脂四兩訶子四兩栗殼四兩薑五兩右以上為細末用真麻油二斤四兩熬去四兩止用二斤

再熬滾入上好飛黃丹一斤熬黑色滴水成珠方入後四味藥龍骨二兩乳香五錢沒藥五錢麝香一錢
俱為細末入內攪勻退火出火毒攤貼臍上每一箇重三錢冬月可加肉蔻五錢

○秘方 治痢久不愈者用白蘿蔔取汁一鍾蜜一鍾共煎滾調勻溫服立止○又方用陰乾陳久蘿蔔英煎

湯服之止痢如神○又方用大團魚一箇水煮去腸甲加生薑七片砂糖一小塊不用鹽醬少入米粉作羹
吃一二碗其痢立止

大司寇春國劉公年近古稀患痢膿血腹痛諸醫弗効余診六脈微數此肥甘太過內有積熱當服酒蒸大黃
一兩清利之公曰吾衰老恐不能堪滋補平和之劑可也余再四寬釋公意始從遂服之逾日而愈

通府竹峰何公患痢赤白晝夜無度遍身瘙癢心中煩燥予診六脈大數人迎偏盛此風邪熱毒也以人參敗
毒散加防風荆芥黃連去人參二服即愈又診六脈仍前大數余曰數則心煩大則病進將來必有痰喘之

患不起逾月果如其言

某痢後兩足浮腫胸膈脹滿小便短少用分利之劑遍身腫兼氣喘余曰兩足浮腫脾氣下陷也胸膈脹滿
胃虛作痞也小便短少肺不能生腎也身腫氣喘脾不能生肺也用補中益氣加附子而愈半載後因酒食



勞倦兩目浮腫小便短少仍服前藥頓愈補益

泄瀉

脈瀉脈自沈沈遲寒侵沈數火熱沈虛滑脫暑濕緩弱多在夏月

泄瀉之症只因脾胃虛弱飢寒飲食過度或為風寒暑濕所傷皆令泄瀉治須分利小便健脾燥濕為主若瀉太多而不止者當用補佳為要若瀉不止手足寒脈虛弱煩燥發呃氣短目直視昏冒不識人者皆死症也若泄瀉初起不可就用補佳恐積滯未盡而胸腹疼飽悶惡心煩燥發呃而死直待瀉去四五次方可補佳此大法也

泄瀉清濁不分者濕多成五瀉也

○胃苓湯 治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分 蒼朮 厚朴 薑汁 陳皮 猪苓 澤瀉 白朮

法 茯苓 白芍 肉桂 甘草 二各 右剉一劑生薑棗子煎空心溫服○水瀉加滑石○暴痢赤白

相雜腹痛裏急後重去桂加木香檳榔黃連水煎服○久瀉加升麻○勝濕加防風升麻○食積加神麴

麥芽山查○氣虛加參朮

寒泄者悠悠腹痛瀉無休止色青脈沈遲是也

○理中湯 治寒瀉症 人參 白朮 乾薑 炒各 甘草 破各 陳皮 藿香 茯苓 良薑 各七烏


梅 右剉一劑生薑三片棗二枚燈草一團水煎溫服○寒極手足冷脈沈細加附子去良薑官桂○

腹痛加厚朴砂仁木香去人參○嘔噦惡心加丁香半夏去良薑官桂○瀉不止加蒼朮山藥○瀉多不

止加肉蔻訶子附子去良薑官桂○虛汗加黃芪去蒼朮官桂○飽悶加厚朴砂仁去人參良薑官桂

火瀉者腹中痛一陣瀉一陣後去如湯後重如滯瀉下赤色小便短赤煩渴脈數是也

○四苓散 治火瀉熱瀉 茯苓 白朮 猪苓 澤瀉 蒼朮 山藥 芍藥 山梔 陳皮 各一甘草 五



烏梅一箇 右剉一劑燈草一團水煎溫服○飽悶加厚朴砂仁去山藥○腹痛加厚朴砂仁木香箇香去白朮○嘔噦惡心加藿香烏梅蓮肉砂仁人參○小便短赤加木通車前去澤瀉○口燥煩渴加黃連麥冬蓮肉烏梅乾葛去澤瀉蒼朮○瀉多元氣虛脫昏倦加人參黃芪去澤瀉蒼朮○夏月暑瀉加香薷扁豆○瀉多煩燥加炒黃連人參辰砂烏梅去蒼朮澤瀉○瀉多不止加肉蔻烏梅人參去澤瀉山梔○發熱脈數加柴胡炒黃芩烏梅

暑瀉者夏月暴瀉如水面垢脈虛煩渴自汗是也

○香薷飲方見中暑依本方加人參白朮茯苓白芍陳皮甘草炒米一撮烏梅一箇燈心一團煎服

濕瀉者瀉水多而腹不痛腹響雷鳴脈細是也

○五苓散 治濕瀉症 茯苓去白朮去猪苓 澤瀉 山藥 官桂 甘草五分陳皮 蒼朮去砂仁炒

肉蔻去油訶子各八分 右剉一劑生薑一片烏梅一箇燈心一團水煎溫服照前理中湯加減同前

風瀉者瀉而便帶血脈浮弦是也

○胃風湯 治風冷乘虛客於腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸鳴濕毒下如豆汁或下痰

血並治有效 當歸 川芎 白芍炒人參 白朮去茯苓去肉桂各等 右剉一劑入粟米一撮水煎溫服

食積瀉者腹疼甚而瀉瀉後痛減脈弦是也

○香砂平胃散 依本方去枳殼加白朮茯苓

疫瀉者或多或少或瀉或不瀉脈沈滑是也

○二陳湯 治疫瀉症 陳皮 半夏炒茯苓去白朮去蒼朮去砂仁 山藥炒車前 木通 厚朴薑

炒甘草各等 右剉一劑生薑三片烏梅一箇燈草一團水煎溫服○瀉不止加肉蔻訶子去厚朴○照

半打粉用蜜三斤入藥末和勻如做糕法先就籠中割小塊蒸熟取出火烘乾瓦罐收貯封固取五片食之以白湯漱口

凡因內傷勞倦飲食化運作瀉及脾胃素虛濕熱但遇飲食勞倦即發而肢體酸軟沈困泄瀉者用補中益氣湯去當歸加芍藥茯苓蒼朮猪苓澤瀉薑麥煎服補益

凡泄瀉病誤服參芪等甘溫之藥能生濕熱故反助病邪久則濕熱甚而為疽矣惟用苦寒瀉濕熱苦溫瀉寒則愈泄止後脾胃虛弱方可用參芪等藥補之濕熱宜用茵陳五苓散方見中卷

一腎虛久瀉不止用六味丸加五味子破故紙肉豆蔻吳茱萸○若久瀉脾胃虛寒不禁者用六君子湯加炮乾薑肉桂補益○若命門火衰而脾土氣寒者用八味丸補益○若脾腎氣血俱虛者用十全大補湯送四

神丸○若大便秘利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰為脾胃虧損用金匱加減腎氣丸補益便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰為脾胃虧損用金匱加減腎氣丸補益

大抵久瀉多因逆用消食利水之劑損其真陰元氣不能自持遂成久泄若非補中益氣湯四神丸滋其本源後必胸痞腹脹小便淋瀝多致不起

○四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思或泄痢腹痛等症兼治腎泄清晨瀉泄一二次經年不止者破故紙四兩酒浸炒 吳茱萸九兩酒炒 肉豆蔻二兩酒炒 五味子二兩 右為細末用生薑八兩切片同煮一百枝煮

爛去薑取棗肉煮丸如梧桐子大每服一錢半淡鹽湯送下○一方去吳茱萸五味子加木香茴香炒各二兩

○治泄瀉三五年不愈者惟灸百會穴五七壯即愈

補遺方

○治水瀉痢疾神效 石蓮肉為末細茶錢生薑三錢 右茶薑二味煎湯調蓮肉末服

○又方 治瀉痢 蓮肉二兩 五更空心無根水調服忌半日勿飲食仍忌薑腥生冷一切

○除濕健脾湯 久瀉色蒼而齒疎倦怠食減下墜 白朮去蘆炒 蒼朮炒 白茯苓去皮 白芍炒 當歸酒洗

厚朴去皮 陳皮分 猪苓 澤瀉各七 柴胡 升麻各五 防風去蘆 甘草分 久瀉加南星七分

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎早晚服

○參朮健脾丸 滋養元氣補理脾胃益腎水溫下元進飲食調中下氣臍腹冷痛泄瀉年久不止此藥補

溫脾腎除寒濕大補諸虛 蒼朮八兩二兩鹽水浸二兩木油 人參 白朮去蘆 白茯苓 乾山藥炒 破故紙

酒炒杞子去心 蓮肉二兩 川棟子肉取 五味子 川牛膝去蘆 川椒炒 小茴香炒 陳皮

木香不見遠志 甘草各五錢 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服八十九丸空心鹽湯送下以乾物壓

霍亂

脈霍亂吐瀉滑而不勻或微而濇代伏驚人熱多洪滑弦滑食論

夫霍亂者有濕霍亂有乾霍亂皆是內傷飲食生冷外感風寒暑濕而成濕霍亂忽時心腹疼痛或上吐或下

瀉或吐瀉齊作攪亂不安四肢厥冷六脈沈細欲絕此名濕霍亂俗云虎狼病因風則怕風有汗因寒則怕

寒無汗因暑則熱煩燥悶因濕則身體重著因食則胸腹飽悶治用正氣散加減若吐瀉煩渴燥不止厥冷

痛甚轉筋入腹者死夏月因伏暑熱伏暑霍亂吐瀉者甚多手足雖厥冷脈雖虛小切不可用薑附熱藥治

在暑症膏當飲內治之

有乾霍亂者最難治死在頃臾俗云攪腸痧忽然心腹絞痛手足厥冷脈沉細或沈伏欲吐不得吐欲瀉不得

瀉陰陽乖隔升降不通急用鹽湯探吐及刺委中穴出血治用理中湯加減慎勿用米湯補住邪氣難治直

待吐瀉後方可用清米湯補接元氣若吐瀉不出胸腹脹硬面唇青手足冷過肘膝六脈伏絕氣喘急舌短

囊縮者死症也

濕霍亂者吐瀉腹痛脈沈伏欲絕也

○霍香正氣散

治四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐利中暑胃風吐瀉中濕身

重泄瀉或不服水土脾胃不和飲食停滯復感外寒頭痛憎寒或嘔逆惡心胸膈痞悶或發熱無汗者並

皆治之

霍香

錢紫蘇

陳皮

厚朴

薑汁

半夏

白木

桂枝

大腹皮

白芷

甘草

乾薑

錢一

右剉一劑生薑煎溫服○霍亂轉筋加木瓜○腹痛加炒芍藥寒痛加官桂冷甚加乾薑○飲食

不化心下痞悶加香附砂仁米穀不化加神麴麥芽○肉食不化加山楂○心下痞加枳實青皮○中暑

冒風加香薷萊豆○時氣憎寒壯熱加柴胡乾葛○發熱加麥門冬淡竹葉○口渴作泄小便不利治五

苓散○濕熱相搏霍亂轉筋煩渴亂合黃連香薷散心腹絞痛加木香○若頻欲登廁不通利者加枳

殼

夏月暑熱霍亂者吐瀉煩渴自汗脈浮也

○香薷飲

夏月暑熱明知多食生冷瓜果麴食却於風涼處坐臥以致飲食停滯胸腹飽脹作痛或吐

或瀉手足冷脈沈細或伏暑是濕霍亂用前正氣散內加減治之不可作夏月伏暑霍亂吐瀉腹痛口渴

煩燥自汗面垢脈虛煩燥不寧者此是伏暑霍亂也香薷飲加減治之

乾霍亂者心腹飽脹絞痛不吐不瀉脈沈欲絕也

先用鹽湯探吐急用此方

○理中湯

治乾霍亂心腹飽脹絞痛不吐不瀉脈沈欲絕 霍香 蒼朮 厚朴 砂仁 香附 木

香

枳殼

陳皮

甘草

乾薑

官桂

各五

右剉一劑生薑三片水煎磨木香調服○夏月乾霍

亂不吐不瀉胸腹絞痛煩渴自汗不可用薑桂○心腹絞痛面脣青手足冷脈伏欲絕加附子茴香香薷

木○心腹飽悶硬痛結實者加檳榔枳實山查瓜薑蘿蔔子去甘草枳殼蒼朮○胃寒嘔噦發呃加丁香

茴香附良薑去官桂甘草蒼朮○虛汗加附子去蒼朮○外用炒生薑渣搽法急用鹽湯探吐得物出為好及刺委中穴血出甚妙

霍亂吐瀉止後發熱頭疼身痛口乾脈數者

○參胡三白湯 人參各五柴胡 白朮各五茯苓各五甘草各五當歸 陳皮 麥門冬各五五味子各五山梔子各五甘

草各五烏梅各五 右剉一剉棗一枚燈草一團水煎溫服

有異鄉人初到地方不服水土或吐或瀉胸腹飽悶或腫脹不吐瀉者宜服

○加減正氣散 香附 半夏各五甘草 藿香 蒼朮各五厚朴各五陳皮 砂仁各五 右剉一剉薑三

片棗一枚燈心一團水煎溫服○瀉加白朮炒山藥烏梅炒米○嘔吐同上○月痛加木香茴香○飽悶

加益智仁大腹皮○發腫氣喘加蘇子桑白皮木通猪苓大腹皮木香去甘草○小便短赤加木通猪苓

山梔車前去半夏甘草○胸腹飽脹或四肢浮腫如不吐瀉者加蘿蔔子枳殼大腹皮木通去半夏甘草

○內熱煩渴加葛根黃連山梔烏梅去半夏甘草○內寒手足冷脈沈細加乾薑白桂

補遺方

○治霍亂吐瀉 用菜豆粉和白砂糖少許服之即愈

○乾霍亂不得吐者 用滾湯一碗入皂角末三分鹽一撮調服探吐之慎勿與米湯吃反助邪氣則難治矣

○治霍亂吐瀉 乾薑 胡椒 胡黃連各二菜豆粉各五 右為末每服三分沸湯點服

○陰陽湯 用井水和百沸湯各半碗同服神效

○洗法 治霍亂轉筋一蓼把去兩頭水煎薰洗

○灸法 治霍亂已死腹中有暖氣者用鹽臍中灸七壯

嘔吐

脈嘔吐無他寸緊滑數微數血虛單浮胃薄乳則有痰最忌瀉弱嘔吐者有聲有物胃氣有所傷也

○保中湯 治嘔吐不止飲食不下 藿香梗 白朮去各一錢 陳皮 半夏麩 白茯苓去皮各八分 黃連炒 黃芩炒

炒山梔子薑汁炒一錢 砂仁分三 甘草分 右剉一劑生薑三片長流水和膠泥澄清二鍾煎至一鍾稍冷服

嘔噦清水冷涎脈沈遲者是寒吐也 人參 茯苓去 白朮去 乾薑炒 陳皮 藿香 丁香 半夏麩 砂仁

○理中湯 治胃寒嘔吐清水冷涎 右剉一劑生薑三片烏梅一箇水煎徐徐溫服○寒極手足冷脈微吐不出者加附子去

炒官桂各二 官桂○煩燥加辰砂炒米

煩渴脈數嘔噦者是熱吐也 黃連薑汁 山梔炒 竹茹各一 人參分五 白朮去 茯苓去 陳皮 白芍炒 麥

○黃連竹茹湯 治胃熱煩渴嘔吐 黃連薑汁 山梔炒 竹茹各一 人參分五 白朮去 茯苓去 陳皮 白芍炒 麥

門冬去 甘草分三 炒米根發熱加 柴胡 右剉一劑烏梅一箇棗一枝水煎徐徐溫服

嘔噦痰涎者是痰火也 陳皮 半夏麩 茯苓去 甘草 人參 白朮 竹茹 砂仁 山梔炒 麥門冬

○二陳湯 治痰火嘔吐也 陳皮 半夏麩 茯苓去 甘草 人參 白朮 竹茹 砂仁 山梔炒 麥門冬

等分去心 烏梅各一 右剉一劑薑三片棗一枚水煎不拘時徐徐溫服

水寒停胃嘔吐者宜燥濕也 茯苓 半夏 治水寒停胃嘔吐 茯苓去 半夏麩 陳皮 蒼朮剉厚 朴薑汁 砂仁分五 藿香分八 乾薑

○茯苓半夏湯 治水寒停胃嘔吐 茯苓去 半夏麩 陳皮 蒼朮剉厚 朴薑汁 砂仁分五 藿香分八 乾薑

分三 烏梅各一 甘草分三 右剉一劑水一鍾生薑三片煎至六分不拘時徐徐溫服

飽悶作酸嘔吐者是停食吐也 香砂平胃散 治停食嘔吐傷寒

○香砂平胃散 治停食嘔吐傷寒

