

東醫寶鑑

卷十五

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也飲水不能多汗

乾舌燥脉洪大人參白虎湯主之吐汗下後口
五六日而渴欲飲水不能多者不當與之何者以
也至熱尚少不能消故也至七八日大渴欲飲水
勿極少與之常令不足勿極意也言能飲一斗只
利若升若腹滿小便不利若喘若嘔者不可與之
潤之渴咽乾者少少嚥潤之令胃氣和則愈仲景
名曰欲飲水水入即吐名曰水逆五苓散主之仲
者少厥陰病渴欲飲水者少少與之愈活人○熱
在表則不渴熱入裏則渴耗奪津液而然也然有
渴必有煩者腎主水熱瀦則水竭而渴肝木挾心

火以生煩故厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渴渴飲水為欲愈者傳經已盡也脉浮而渴屬太陽宜白虎湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬少陰宜猪苓湯入門。凡渴欲飲水常令不足為善經云若還不飲非其治強飲須教別病生醫鑒。渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒也仲景。陰盛隔陽之證口燥渴而漱水不嚥蓄血之證亦漱水不欲嚥入門。木

五苓散

治太陽證入裏煩渴而小便不利澤瀉二錢半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分

為末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服。傷寒汗後亡津但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛躁或飲水不散而反吐出為水逆證或飲水雖多而小便不利者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散的藥也入門

竹葉石膏湯

治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渴並差後虛煩等證石膏四錢人參二錢

傷寒潮熱

麥門冬一錢半半夏一錢甘艸七分右剉作一貼入竹葉七片粳米百粒水煎入薑汁二匙服入門

潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一

即發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者

乃為潮熱也陽明之為病胃家實也胃實則譫語

明。潮熱者似潮水之有信一日一發謂之潮

必日晡而作陽明旺於未申故耳諸承氣湯選用

下之或潮於寅卯者屬少陽或潮於巳午者屬太

陽為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之入門。吐

下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸

床微喘直視脉弦者生脉瀉者死神景

傷寒發狂發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言

動急速矣語妄笑甚則登高而歌棄衣而走

踰垣上屋不食不卧非大吐下不止表裏俱熱宜

三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂言譫

語宜辰砂五苓散入門。如狂者但睡中忽欲起

行錯言妄語非若發狂莫能制也入門。陽毒發

狂宜陽毒升麻湯陽毒梔子湯方見上。發在宜
用妙香丸方見火熱三白飲活龍散破棺湯水漬
法火劫法。○喜忘如狂蓄血證也。○凡發狂
見陽證陽脉者順見陰證陰脉舌卷囊繡者死。入
門

三白飲

治傷寒熱病熱極狂走雞子清一箇白蜜一
大匙芒硝三錢右合作一處凉水調下。醫鑒

活龍散

治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗研取
汁入薑汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和

徐徐灌盡漸次凉快若熱熾則耳前氣滿則用
加片腦尤妙名曰地龍水。人謂一日一服

破棺湯

治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事
人尿乾者燒存性水漬飲汁一二盞即醒或

細研如麪新汲水調下三錢。用法日三服。黃
亦可俗名野人乾水。本州其來不夫。初一日一

水漬法

見上陽毒下。此法其來不夫。初一日一

火劫法

治發狂炭火一盃置病人之前將醋一椀急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

水噴面亦可入門

傷寒譫語鄭聲

實則譫語虛則鄭聲譫語者謂亂語無次第數數更端也鄭聲者謂鄭重頻煩

也只將一句舊言重疊頻言之也明理陽明病

胃實則譫語仲景。大小便利手足冷脉微細者

必鄭聲宜用白通湯大便秘小便赤手足溫脉洪

數者必譫語安用調胃承氣湯活人。譫語有實

有虛實則可下虛不可為實者胃實有燥屎可下

之虛者腸胃自利也難治人門。傷寒大熱呻吟

錯語不得眠黃連解毒湯主之活人。晝日明了

夜則譫語如見鬼乃婦人熱入血室證也活人。

傷寒發熱譫語宜柴胡連翹湯醫鑑

治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒

黃連解毒湯

復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔

子各一錢二分半右剉
作一貼水煎服活人

柴胡連翹湯

治傷寒發熱譫語呻吟睡卧不得柴胡黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蒌仁梔子仁

連翹黃連黃柏甘草各八分右剉
作一貼入薑三片水煎服醫鑒

傷寒結胃

傷寒若脉浮緊下之必結胃海藏○病發於陽而反下之熱入因作結胃仲景○傷寒表

未解醫反下之膈內拒痛手不可近一云心下滿而硬痛此為結胃宜大陷胃湯仲景○若按心下硬痛手不可近燥渴譫語大便秘實脉沈實有力為大結胃急以大陷胃湯加枳殼桔梗下之反加煩躁者成醫鑒○小結胃者正在心下按之則痛脉浮滑宜小陷胃湯醫鑒○寒實結胃無熱證者宜三物白散小陷胃湯醫鑒○熱實結胃及寒實結胃活人書不拘寒熱但用陷胃湯不差用枳實理中丸應手而愈綱目○但結胃無大熱者此為水結在胃脇但頭汗出名曰水結胃小半夏湯加茯苓

本草主之方見胸部。熱實結胃宜用大陷胃丸。綱目。結胃宜用灸法。熨法未經下而胃滿非結胃也。只以小柴胡合小陷胃加枳殼桔梗一服如神。醫鑑。

大陷胃湯

治大結胃大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分。右剉分二貼。每取一貼先煎大黃至六分。納硝再煎一二沸去滓。納甘遂末攪服。得快利止後服。仲景

小陷胃湯

治小結胃半夏製五錢黃連二錢半瓜蒌大者四分之。一右剉作一貼水二盞先煎瓜蒌至一盞乃入半夏黃連煎至半去滓溫服未利再服利下黃涎便安。仲景。一方加枳實黃芩桔梗尤效。入門。瓜蒌惟剉其殼勿剉其子剉其子者非也。心丹

三物白散

治寒實結胃桔梗貝母各三錢巴豆去皮心熬研如脂一錢右為末和勻白湯和服。半錢弱人減半或吐或利不利進熱粥一椀利不止進冷粥一椀。入門。

大陷胸丸

治熱實結胃大黃五錢葶藶子炒杏仁炒各三錢芒硝二錢半甘遂二字右爲末蜜

丸彈子大每一丸水一盞煎

半分溫服未利再服

灸法

詳見胸部

熨法

詳見胸部

傷寒藏結

病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沈名曰結胃也何謂藏結答曰如

結胃狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉細小沈

緊名曰藏結舌上白胎滑者難治仲景。病人胃

中素有痞連在臍傍引入小腹入陰筋者此名藏

結死仲景。歌曰飲食如常時下利更加舌上白

胎時連臍痛引陰筋者藏結元來不醫。狀如

結胃飲食如故時時下利而舌上白胎滑人。病

人素有痞氣再加傷寒與宿積相合使眞藏之氣

閉結不通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡加生

傷寒痞氣

薑以和表灸關元以回陽解陰結危哉入門。藏結與結胃相似皆下後邪氣入裏與陽相結結在胸者為結胃與陰相結結在藏者為藏結惟其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或但寒不熱其人反靜飲食如常時時下利舌上白胎肺肋臍腹引入陰筋俱痛者丹田有熱胃中有寒所以難治。入病發於陰而反下之因作痞。仲景。傷寒嘔而發熱者若心下滿而不痛此為痞半夏瀉心湯主之胃虛氣逆者亦主之。仲景。心下痞硬按之濡其脈關上浮者三黃瀉心湯主之凡結胃與痞關脈須沈若關脈浮者宜此湯。仲景。心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之。仲景。下後下利日數十行穀不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃結熱乃胃中虛客氣上逆故也甘艸瀉心湯主之。仲景。汗解後胃不和心下痞硬脇下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之。仲景。太陽病外證未除而數下之遂下利不止心下痞硬表裏不解桂枝人參湯主之。仲景。痞氣通

月桔梗

枳殼湯

半夏瀉心湯

半夏製二錢黃芩人參甘艸各一錢半乾薑一錢黃連五分右剉作一貼入薑

三片棗二枚

水煎服仲景

三黃瀉心湯

大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分

溫再服

附子瀉心湯

大黃黃連黃芩各二錢剉附子炮二錢別煮作汁右取百沸湯一盞入三味漬

之良久去滓

汁分溫再服仲景

甘艸瀉心湯

甘艸三錢黃芩乾薑各一錢半半夏製人參各一錢黃連五分右剉作一貼入

大棗三枚水

煎服仲景

生薑瀉心湯

生薑半夏各二錢人參乾薑各一錢半黃連甘艸各一錢黃芩五分右剉作一

貼入棗三枚水煎服仲景

桂枝人參湯

桂枝別剉甘艸炙各一錢八分白朮人參乾薑各一錢半右剉作一貼水二盞

煎至一盞入桂枝煮取七分去滓溫服日二仲景

傷寒筋惕肉瞤

動氣在左而發汗則筋惕肉瞤明理。傷寒筋惕身瞤發汗太過所致也古人

以真武湯主之然真武湯能止其汗而不能定其瞤瞤者動也蓋汗多則傷血血虛無以榮筋筋愈急而四體百骸俱爲之瞤動宜以四物湯去地黃加人參半夏茯苓甘艸作劑以五靈脂爲佐入生薑烏梅煎服自有神效此專主

傷寒除中證

厥而下利反能食者曰除中不治得效。厥而利反能食曰除中其或也可立待也

一

傷寒血證

自利者下血乃愈抵當湯主之。仲景。太陽證身

也當下之宜抵當丸仲景○太陽病不解熱結胸

脫其人似狂若血自下者自愈但小腹急結者宜

及之。玄桃仁承氣湯。仲景。○衄忌發汗者。爲無脉。

或脉微故也若脉浮緊身疼惡寒發熱則汗之可

也宜麻黃湯桂枝湯方並見上若脉微不可汗則

犀角地黃湯主之。方見血門。海藏。少陰病強

發汗血出九竅是名下厥上竭不治 仲景 太陽

病脉浮緊發熱無汗而衄者自愈仲景。傷寒頭痛發熱口乾口鼻血出午後昏沈耳聾脇痛俗名血汗病也犀角地黃湯合小柴胡湯主之醫鑒

抵當湯

治一切瘀血結胃譫語漱水等證水蛭炒虵虫炒去足翅桃仁雷尖各十枚大黃蒸三錢右剉作一貼水煎服入門

抵當丸

治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證但小腹滿而尿利者宜用此緩以下之水蛭虵虫各七箇桃仁六箇大黃三錢右為末蜜和分作二丸水一盞煎一丸至七分頓服未效再服

桃仁承氣湯

治血結膀胱小腹結急便黑譫語漱水宜此攻之大黃三錢桂心二錢芍藥二錢甘草一錢桃仁雷尖十枚右剉作一貼水煎入芒硝溫服以瘀血盡下為度

傷寒自利

傷寒陰證身痛脉沉太便自利或嘔或咳宜玄武湯防兇吐。傷寒陽證身熱脉數煩渴

引飲大便自利宜柴苓湯丹心。益元散亦佳方見暑門。太陰證自利宜理中湯丹心。

柴苓湯

治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉一錢三分白朮猪苓各七分半半夏

七分黃芩人參甘艸各六分桂心三分右剉作一貼入薑三片水煎溫服丹心

傷寒胸腹痛

傷寒腹痛中脘痛太陰也臍腹痛少陰也小腹痛厥陰也仲景。心胃硬痛手不可

近為結胸若未經下者非結胃也乃邪氣填塞胃中只以小柴胡加枳桔治之如未效小柴胡合小陷胸加枳桔一服如神醫鑒。若心下脹滿而痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔醫鑒。若小腹硬痛小便利則為蓄血之證桃仁承氣湯下之若小便不利則為尿澀之證五苓散利之若小腹遶臍硬痛小便澀大便實者有燥屎也大承氣湯下之醫鑒

傷寒吐衄

傷寒有吐衄者雖有大熱忌下涼藥犯之必成蓋胃中有寒則衄不安其所而上膈大凶

之兆也急用理中湯方見上
粒煎服待啗定卻以小柴胡湯退熱醫鑒○傷寒
吐衄者手足冷
胃虛空也同春

陰陽交證

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脉躁疾

不為汗衰狂言不能食病者為何岐伯曰病
名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所
以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨
肉而得汗者是邪卻而精勝也精勝則當能食而
不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒
復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而重者
其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脉尚躁盛
者死狂言者是失志失志者死內經○發汗後脉
躁疾狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣
不可分別此
死證也入門

壞證

傷寒病未退重感寒變為溫瘧重感風變為風溫
再感溼熱變為溫毒重感疫氣變為溫疫又太陽

病經汗吐下溫鍼不解及過經不解皆名壞證或
醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久
而不差視其犯何逆以治之表證多者知母麻黃
湯半表者小柴胡湯餘熱不解者參胡芍藥湯危
急者奪命散諸藥不效者鼈甲散入門

知母麻黃湯

治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守
言語錯謬或潮熱煩亦寒熱如瘧皆由

汗下不盡毒留心胞間所致也知母三錢麻黃赤
芍藥黃芩桂心甘州炙各一錢石蠶作一貼水煎
服微汗即愈入門
本去桂心代桂枝入門

參胡芍藥湯

治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩
不能安卧不思飲食大便不快小便黃

赤此為壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩
知母麥門冬各一錢枳殼八分甘州三分右剉作
一貼入薑三片
水煎服入門