




雜方

一百十三道○論中引用
正方已具續論此不復錄

陽旦湯

治冬溫發熱咽痛或自利而欬

桂枝

三錢

芍藥

酒焙

甘草

炙各二錢

黃芩

酒炒三錢

生薑

三片

大棗

擘三枚

右水煎去滓溫服無時日二三服

方木加乾薑名陰旦湯治內挾寒食者

黃耆建中湯

治衛虛不能作汗虛勞裏急諸不足

黃耆

酒炒一錢

桂枝

二錢

芍藥

酒洗三錢

甘草

炙二錢

生薑

三片

大棗

擘二枚

膠飴

半兩

右水煎去滓內膠飴更上火消解日三服

再造散 治陽虛不能作汗名無陽證

黃蓍 酒洗

人參

桂枝

甘草 炙各一錢

熟附子

細辛 各五分

羌活

防風

川芎 各八分

煨薑 五片

右水煎將成加酒芍藥一撮更煮三沸去滓溫服

節庵以此湯治尺中遲弱陽虛不能作汗之證名曰再造固為高出前輩但稍嫌風藥冗雜然無害

於溫補助衛之大旨也

香蘇散 治感冒非時邪氣難分六經證者

香附 薑汁浸勿炒

紫蘇 各二兩

陳皮 去白一兩

甘草 半兩

右為散每服半兩水煎去滓日三服以汗出熱除

為度

芎蘇散 治非時感冒

蘇葉

柴胡 各二錢

川芎

葛根

枳殼

桔梗

陳皮

半夏

茯苓 各一錢

甘草 七分

生薑 二片

大棗 一枚

右水煎去滓熱服溫覆取微汗

本方去川芎柴胡加人參前胡木香名參蘇飲

按此為治非時感冒之首劑非正傷寒藥也方中

芎蘇柴葛四味爲通治三陽經外感藥而獨推芎
蘇二味名方者其重在於邪傷血分也更合之以
二陳治內傷飲食加枳桔寬膈利痰誠爲總司外
內之良方而無引賊破家之虞宜乎世所共推也
其參蘇飲方卽此湯去川芎柴胡而易人參前胡
木香之製其主在於氣分也昔人有用芎蘇散不
解用參蘇飲卽解之說意在人參有兼補之功殊
不知其爲氣血兩途也

神朮湯 治內傷冷食外感寒邪

羌活

蒼朮

各三錢
酒浸炒

藁本

川芎

白芷

各一錢
五分

細辛

五分

甘草 炙一錢

葱白 二莖連鬚

生薑 三片

右水煎熱服覆取微汗

十神湯 治時疫感冒頭痛如破

紫蘇

葛根 各一錢五分

麻黃 去根節八分

升麻

川芎

白芷 各八分

陳皮

甘草

白芍 赤芍誤

香附

薑汁拌碎各六分

生薑

五片

葱白

三莖連鬚

右水煎熱服無時溫覆取微汗

此方出香蘇散專主解利陽明非時不正之氣其

太陽經傷寒發熱禁用以中有升麻葛根恐引邪

入犯陽明也今世用治寒疫但六經證不顯者總

以此疎表利氣而元氣虛入蒙害亦不解矣

升麻湯即升府葛根湯

解利陽明經發熱斑痧

升麻

葛根生

白芍

酒洗

甘草

炙各一錢五分

右水煎溫服無時

發班加犀角熱甚更加黃連黑參虛加人參

葛根葱白湯 治溫熱頭痛如破

川芎

二錢

葛根

芍藥

知母

各一錢五分

葱白

四根連鬚

生薑

二片

右水煎溫服痛未止再服。

本去知母加甘草大棗名增損葛根葱白湯治感



南京中医药大学图书馆藏

冒頭痛

連鬚葱白香豉湯

治感冒頭痛如破

連鬚葱白

七莖

香豉

一合

生薑

一兩

右水煎溫日三服覆取微似汗不汗加蘇葉

選奇湯

治風火相煽眉稜骨痛

羌活

一錢五分

防風

一錢

甘草

一錢五分

黃芩

酒炒一錢五分

右水煎食後稍熱服

藿香正氣散

治四時不正之氣挾食及瘴濕霍亂

廣藿香葉

一錢五分

白朮

霍亂轉筋

厚朴

薑製

白芷

痰合

陳皮

各八分

半夏

一錢五分

茯苓

桔梗各一錢

大腹皮薑湯泡腹
脹用之

蘇葉

各一錢自汗去之

甘草

炙五分嘔吐去之

右用生料作一劑加生薑三片大棗二枚水煎去

滓熱服無時

熱多加黃連寒多加乾薑寒甚少加附子

此本不換金正氣散而立方中腹皮乃傳寫之誤

當遵古方用蒼朮爲是專治一切不正之氣非正

傷寒藥也太陽病惡寒發熱頭疼骨節痛用之先

虛正氣雖汗出亦不解故元氣虛入并夾陰傷寒

發熱脉沉足冷者禁服

人參敗毒散

治時疫初起壯熱寒疫汗後熱不止

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

枳殼

桔梗

茯苓

甘草

半錢〇人
中黃更

各一錢

右用生料作一劑加生薑二片水煎去滓日二服

本加陳倉米名倉廩湯治疫痢

此治時疫初起發熱痞悶之證然服之多有毒邪

驟發其勢轉甚者蓋驟發則毒易傳化但不知者

以爲反增其困耳又寒疫屢發不解亦咸用之類

正虛不補則邪終不化所以昔人有云敗毒散主

治在時疫之先又可用於寒疫之後誠格言也

荆防敗毒散

治捻頸病咽喉腫痛腹脹暴證

羌活

獨活

前胡

柴胡

人參

甘草

人中黃
更佳

枳殼生

桔梗

茯苓

川芎

牛蒡子

炒研

薄荷

荆介各一錢

防風一錢五分

右水煎去滓緩服臨服加真金汁一盃尤効

本方去人參茯苓枳殼桔梗薄荷獨活加連翹紅花

升麻歸尾穿山甲名連翹敗毒散治發願

普濟消毒飲 治天行大頭濕蒸多汗

柴胡一錢二分

黃連

黃芩



南京中医药大学图书馆版权所有

黑參

連翹

鼠粘子炒研

升麻

白芷

甘草生

桔梗

馬勃各一錢

殭蠶炒七分

板藍根

如無青黛代之

右爲末半用水煎去滓食後徐服半用蜜丸噙化就臥以令藥性上行也

氣虛脉弱加人參大便秘少加酒大黃

六神通解散 治時疫初起熱甚躁不得汗

麻黃

去節酒洗

石膏

滑石

黃芩

各二兩

蒼朮

去皮酒炒四兩

甘草

炙一兩五錢

右爲散每服半兩加薑三片水煎去滓熱服取汗

節庵加羌活川芎葱白香豉

獨活散 治瘟疫瘧氣脚膝疼輒發熱頭疼體痛

獨活

羌活

細辛

麻黃

去節泡

防風

枳殼

生

蔓荊子

甘菊花

黃芩

酒洗

人參

茯苓

甘草

炙各一兩

石膏

二兩

右爲散每服半兩加薄荷五葉生薑三片水煎去

滓熱服無時

達原飲

治時疫邪氣初犯募原者

黃芩

酒洗

白芍

酒洗

知母

酒洗

生地

人參各三錢

石膏大子

羌活

知母各二錢

甘草一錢五分

升麻

葛根各一錢

生薑二兩

右水一斗煮取五升每服一升日三夜二服

人中黃丸 治瘟疫諸熱毒

大黃三兩

人中黃如無坑代之 蒼朮去皮麻油炒

桔梗

滑石各二兩

人參

黃連酒洗

黃芩酒洗生

防風五錢

香附薑汁拌勿抄

右為末神麴糊丸清熱解毒湯送下二三錢

人中黃散 治大頭疫癘及疔瘡瘟

辰砂

雄黃各一錢五分

人中黃一作人中

黃法以竹筒留節去皮傍開一孔入滿甘草末杉木塞孔臘月浸大糞池底月餘眼乾候用

右為末每服二錢薄荷桔梗煎湯下日三夜三服

涼膈散 治膈熱便秘胃實發斑表裏俱熱

連翹

梔子仁

黃芩

薄荷

大黃酒洗

芒硝各二錢

甘草五分

大棗一枚

葱白一莖

右水煎去滓溫服無時

雙解散 治溫熱病表裏大熱

防風

麻黃

薄荷

川芎

連翹

當歸

芍藥生

大黃 酒洗

芒硝 各半

石膏

黃芩 酒洗

桔梗 各一

甘草 二兩

白朮 薑汁拌

荊芥

山梔 各二兩

滑石 三兩

右爲散。每服三錢。加生薑三片。水煎。去滓。溫服。

此本涼膈。合通散而易。白朮加芎歸。芍藥荊防。橘

梗。卽通聖。合益元之製也。按通聖爲中風門中專

方。而中風多是邪乘虛入。萬無表裏俱實之證。卽

大便燥結。亦屬血枯。風秘。用此甚難。惟溫病熱病

內。外。邪。甚。者。乃爲合宜。蓋防風麻黃解表藥也。風

熱之在皮膚者。得之由汗而泄。荊芥薄荷清土藥。

也風熱之在巔頂者得之由鼻而泄大黃芒硝通
利藥也溫熱之在腸胃者得之由後而泄滑石梔
子水道藥也濕熱之在決瀆者得之由溺而泄熱
淫於膈肺胃受邪石膏桔梗清肺胃也而連翹黃
芩又所以祛諸經之遊火風熱爲息肝木主之川
芎歸芍和肝血以息風熱而甘草白朮又所以和
胃氣以健運脾土能勝濕熱禦風火故也方中倍
用益元者以伏氣所蒸之濕熱使半從肌表而泄
半從滲道而利也故大便通者硝黃自可勿用有
微汗者麻黃亦可勿施而濕熱鬱發未有小便不
黃赤者雙解之義實在發汗利小便耳昔人但知