

醫家回要
二



醫家四要卷之二目錄

病機約論

百病皆生於六氣

諸證莫離乎四因 二

內傷脾胃須辨有餘不足 三

外感發熱當分夏熱春溫 四

傷寒傳徧六經必須熟認 五

時疫觸冒四氣務要先明 六



卒中風因有兩端治分四中七

破傷風原有二種辨別三經八

中暑有陰陽之判九

受濕有內外之分十

火有七說十一

痰有五因十二

氣有九論十三

鬱有六名十四



瘧犯暑風更兼痰食

五十

痢因溼氣及受積停

六十

嘔吐噦胃氣逆而不降

七十

泄瀉症脾氣傷而不升

八十

霍亂陰陽須曉

九十

痞滿痰食當明

十二

飢逆由胃氣之不順

一廿

咳嗽因肺氣之不清

二廿



膈有噎塞反胃之異

三廿

鼓有氣水蟲血之分

四廿

瘕瘕有剛柔之說

五廿

喘急有虛實之評

六廿

五積六聚與癥瘕治療莫溷

七廿

五勞七傷同六極審辨當精

八廿

吐血出於胃絡

九廿

衄血本乎肺經

十三



目衄屬肝耳衄屬腎

一三

齒衄屬胃舌衄屬心

二二

咳血嘔血肺肝氣熱

三三

咯血唾血心腎火騰

四二

驚悸之疴恐懼痰迷所致

五三

健忘之病血衰憂鬱而成

六三

顛狂者審陰陽之邪併

七三

癰症者究痰火之與驚

八三



九種心疼實在胃脘三九

七般疝氣總屬厥陰十四

分內外之頭痛四一

辨左右之脇癰四二

腰痛者腎虛而或閃挫四三

腹痛者寒氣而或木乘四四

痿屬燥金與溼熱四五

痺由寒溼及風并四六

便濁有赤白之論

四七

汗出有自盜之稱

四八

七種遺精分虛分實

四九

五般黃疸辨陽辨陰

十五

眩暈無痰不作

五一

消渴無火不生

五二

耳聾腎經之病

五三

目疾肝熱之因

五四



口內生瘡是脾經之熱熾

五五

鼻竅流涕因肺氣之不清

六五

治牙疼審風火蟲虛爲要

七五

醫喉症別單雙纏痺能靈

八五

大便乾燥緣於血液不足

九五

小便秘滯由於氣化弗行

十六

風襲胃腸成便血

六一

溼注膀胱致熱淋

二六



女科天癸不調當分趨遠

六三

婦人月經不轉宜辨癥娠

六四

崩漏帶下責在奇經虛損

六五

癥瘕痞病由氣血交凝

六六

惡阻胞阻與轉胞方書可考

六七

滑胎墮胎同小產古法當遵

六八

論子病嗽煩腫滿氣懸淋癰眩瘡啼十一症

六九

辨母產正倒橫偏傷凍熱盤腸催碍十般生

七十七



產後頭昏其病須分三種

一七

通身發熱其因當別六層

二七

此類頭昏

今古論之

此類頭昏

今古論之

此類頭昏

今古論之

此類頭昏

今古論之

此類頭昏

今古論之

此類頭昏

今古論之



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫家四要卷之二

三衢江 誠抱一甫

新安程 曦錦雯甫全纂

三衢雷大震福亭甫

病機約論

百病皆生於六氣

六氣者、風寒暑溼燥火是也、夫風有冒風傷風之不

同、冒風者、風邪冒於軀殼、卽有鼻塞咳嗽之病、宜香

蘇飲

香附紫蘇
甘草陳皮

傷風者、風邪傷於衛分、卽患寒熱汗



出之症宜桂枝湯

桂枝白芍甘草棗薑

寒有傷寒中寒之別傷

寒則寒熱無汗宜麻黃湯

麻黃桂枝甘草杏仁

中寒則腹痛泄

瀉宜吳茱萸湯

吳萸人參棗薑

又有暑分陰陽溼分內外陰

暑得之納涼飲冷症見壯熱無汗宜香薷飲

厚朴扁豆香薷

陽暑得之赤日長途症見熱渴自汗宜白虎湯

石膏甘草

知母粳米

內溼者由於脾胃受虧土不勝水則溼從內而

生宜五苓散

澤瀉茯苓白朮豬苓

外溼者由於早晨冒霧居

溼涉水則溼從外而受宜滲溼湯

羌活獨活川芎藁本甘草蔓荊防風

更有燥分勝復火分虛實燥之勝氣者即秋涼之氣

也宜杏蘇散

杏仁紫蘇枳壳吉更茯苓甘草半夏前胡陳皮棗薑

復氣者燥勝

則乾也宜桑杏湯

桑葉杏仁沙參貝母淡豉梔皮梨皮

虛火宜補六味

八味之屬

六味丸即熟地山藥山萸丹皮澤瀉茯苓加肉桂附子名八味丸

實火宜

瀉大小承氣之屬

大承氣湯即厚朴芒硝只實大黃小承氣湯即厚朴大黃枳實

六氣之見證當詳辨而治之

諸證莫離乎四因

二

四因者氣血痰食是也當考丹溪治病凡遇氣虧者

以四君子湯

人參白朮
茯苓炙草

血虧者以四物湯

熟地白芍
當歸川芎

痰飲者以二陳湯

甘草茯苓
陳皮半夏

食積者以平胃散

蒼朮
厚朴

陳皮

都以此四方為主更參解鬱治之藥品不繁每

多中病

內傷脾胃須辨有餘不足

三

內傷者謂勞役過度飲食失節致傷脾胃之氣氣虛

而發熱也東垣製補中益氣湯治之

黃耆白朮陳皮
升麻柴胡人參

甘草

然有內傷而夾食者此不足中之有餘也治以

消導爲主補脾爲佐又有內傷而夾寒者此亦不足中之有餘也治以溫散爲主補氣爲佐又有內傷而犯慾者此不足中之不足也治以十全大補湯爲主

人參白朮茯苓甘草熟地
白芍當歸川芎黃耆肉桂

外感發熱當分夏熱春溫

四

發熱之病今人謂之四時傷寒不知冬時傷寒乃寒邪自外而入故仲景治以麻桂之屬倘寒邪不即發者藏於肌膚或藏於骨髓至春感受新邪觸動伏氣

而發者名曰春溫至夏而觸發者名曰熱病其症發

熱口渴或作咳嗽宜以九味羌活湯加減治之

羌活防風

蒼朮川芎白芷黃芩細辛生地甘草但溫熱之病最易傷津辛溫之劑

又不宜過用若育夏秋三時感受非時之暴寒名曰

寒疫宜以辛溫疏表用十神湯加減治之

葛根升麻白芷赤芍

川芎香附陳皮

紫蘇甘草麻黃

傷寒傳徧六經必須熟認五

傷寒傳六經者一太陽二陽明三少陽四太陰五少

