

傷寒用藥賦

太陽無汗寒傷榮臘月麻黃湯為最。太陽有汗風傷衛。

月桂枝湯可先。易老冲和。羌活湯。治風寒而發於三季。

陶氏冲和湯。分陰陽以救乎雙傳。此方以兩感必死。但陽

之中病即愈。如不愈者。看表裏陰陽多少。用藥。是以用九

味羌活湯。去蒼木加柴胡。乾葛。石羔。黑豆。皆三陽經藥也。

陽明之本宜鮮肌。審葛根白虎於寒熱。傷風有汗表虛者。

汗表實者葛根湯。不惡寒。陽明之標。須承氣。詳痞滿燥

實於便堅。痞滿燥實俱全者。大承氣湯。有痞滿而無燥。

氣大柴胡湯。行陽明帶表之秘。小柴胡湯。擅少陽和鮮之

權有痰妨胸滿。瓜蒂散。施豉湯。緩緩飲。無頭疼身熱。附子

乾姜熟煎。

古姜附湯。乾姜一兩。生附一枚。水三盞。煎至一盞。去渣頓服。治直中陰經真寒症。如厥逆

脉不至。加甘草一倍。理中湯。建中湯。

治太陰直。臟寒之不足。桂黃桂

苓。祛太陰經腑熱之不平。

桂枝加大黃湯。桂枝三錢。芍藥四錢。甘草二錢。半大黃一兩。姜

五片。棗二枚。水煎溫服。治太陰傳經熱症。腹滿而痛。嘔乾而渴。手足溫。脉沉有力。本方陶氏加枳殼柴胡。臨服入棗。

御水三匙。如腹滿不惡寒而喘。去甘草。加大腹皮。○桂枝加芍藥湯。桂枝三錢。芍藥四錢。甘草一錢。姜四片。棗一枚。

水煎溫服。治太陰腹滿痛甚。或太陽病下之轉屬太陰。自利者亦宜。○陶氏桂苓飲。五苓散。少陰熱症。

小承氣湯。

反之四逆。倍甘草。拒陽可愈。

四逆湯。

厥陰熱症大

承氣湯。

反之四逆。用當歸。似瘡自痊。

當歸四逆湯。

此雖六經之

正治實具百病之真筌表裏陰陽通治

凡言表症分有汗無汗俱於前正

內隨經選用凡言裏症分傳經直中俱於前正方內選用凡言陰症俱於前溫中熱藥內選用凡言陽症俱於前通

裏寒藥內選用是數方可以代百方雖曰仲景方法猶有遺失之恨據愚見於此推類而通於雜病則方法亦無以

加汗吐下溫兼全凡言宜汗即前正方中或發表或解肌之劑選用凡言宜吐即前正方中或探

吐或湧宣之劑選用凡言宜下即前正方中潤下湧泄之劑選用凡言宜溫即前正方中臟寒亡陽之劑選用是數

法者可以兼百法貴乎用之當耳誤用麻黃令人亡陽汗出不止將病人頭髮水浸外用糯米粉并龍骨牡蠣末撲

之誤用硝黃令人不禁用理中湯加炒糯米烏梅壁土止之誤用姜附令人失血發冷用蘿蔔汁或子搗汁或泥漿

汁再入黃連并草犀角可解其毒不然身有紅處乃血欲從各竅出也抑又聞風寒總曰汗

病麻桂不可亂嘗不論傷風傷寒皆以得汗則散無汗服

桂枝而嘔吐。失血下利者變用傷寒無汗或酒客誤服桂枝湯而嘔吐者必吐衄血

為肺痿症。又有其病當汗而適值失血及下利者不可與麻黃湯。宜小劑桂枝湯頻頻飲之。體潤自和。**有**

汗服麻黃而煩躁寒熱似瘡者相當。傷風服桂枝湯不愈寒熱似瘡。日晡發者

乃邪客榮衛。宜桂枝二麻黃一湯。若非此症。誤服麻黃者必煩躁衄血。衄血與上肺痿二症。照依雜症以清血涼血

之劑。畧加和表之藥。如犀角傷寒輕者麻黃杏仁飲。麻黃地黃湯黃芩湯加柴胡是也。

前胡黃芩陳皮半夏各一錢。杏仁細辛各八分。防風七分。甘草四分。姜三片。水煎溫服。治太陽發熱惡寒頭痛魚汗

脉浮緊而咳嗽。如夏月去麻黃加蘊葉。自汗去麻黃加桂枝為藥。表熱換柴胡口渴加天花粉。胸滿加枳殼。喘急加

瓜蒌傷風輕者柴胡半夏湯。柴胡半夏各一錢半黃芩白朮陳皮麥門冬各一錢半甘草

五分。姜三片。棗二枚。水煎溫服。治傷風發熱惡寒頭痛魚汗面該嗽。或協熱白利。指一切痙症。狀似傷寒。如小便

加半夏湯葛根三錢麻黃二錢桂枝一錢半夏芍藥各一錢甘草八分姜三片棗二枚水煎服治太陽陽明合病裏

氣逆上但嘔而不下利者與葛根合病利而不嘔黃芩加湯以散其邪加半夏以下逆氣

以半姜夏一錢甘草五分姜黃芩三錢芍藥生姜各二錢半

陽火陽合病自利而嘔或腸垢協熱自利太陽併病陽明非汗下所宜故用此和解以下胃之逆氣

芍麻葛硝黃看罷未去太陽症未罷無汗者葛根湯有汗者去麻黃太陽症已罷陽明症見者調

胃承氣湯太陽併病少陽者麻桂柴胡要酌量無汗者小柴胡合麻黃湯有汗

者柴胡桂枝湯三時與輕者小柴胡湯為主仍以羌活防風代麻桂可也

人黃如意升麻葛根湯方意以四氣不和鬱毒為疫故用人黃如意升麻葛根甘草以解百毒芍藥以和中用消疫

毒更妙於敗毒散○人中黃九大黃黃連黃芩人參桔梗蒼朮防風滑石香附人中黃各等分為末神麴糊丸梧子

大每七十九氣虛四君子湯下血虛四物湯下痰多二陳
湯下熱者加童便如無人中黃用糞缸岸代之或硃砂雄
黃為衣亦好。如意丹川烏八錢攪入參柴胡吳茱萸
川椒白姜白茯苓黃連紫苑厚朴肉桂當歸桔梗皂角石
菖蒲各五錢巴豆二錢半擇吉日於不聞雞犬處靜室誠
心修合各取淨末煉蜜為丸梧子大硃砂為衣每三九或
五九七九專治溫疫及一切鬼祟伏尸傳癘顛狂失心山
嵐瘴氣棗湯或白湯下風疫及宿患大風身體頑麻不知
痛痒眼淚不下睡臥不安面如虫行日久鬚眉痒脫唇爛
齒焦偏頭痛紫癰瘡癰左癱右瘓鶴膝風疼一切風疾荆
芥煎湯下寒疫及小腸氣痛小茴煎湯或吳萸煎湯下暑
疫及五淋燈心煎湯下熱甚大黃煎湯下燥疫生地或麻
子仁煎湯下或冷水下溫疫及水腫車前子或木通煎湯
下十種水氣甘遂大一煎湯下瘕蠱甘遂煎湯下膀胱疝
氣腫疼蘿蔔煎湯下五般痔白礬湯下五癰乳香湯下腎
臟積咬齒唾涎腰疼鹽湯下五瘡莢枝煎湯下失心中邪
柳枝莢枝湯下陰陽二毒傷風咳嗽姜湯下小兒十二驚
痢腸風臟毒陳米煎湯下諸般咳嗽姜湯下小兒十二驚

風薄荷煎湯下丹癰癰疽瘦瘰癧瘡癩涎喘消渴大小
或泄或利酒毒便紅喉痺重腮誤吞銅鐵金石藥毒不
水土溫湯下痢疾紅甚黃連煎湯下婦人血海久冷帶下
亦白難爲生瘡及諸般血氣艾湯下此方通治山細素不
服藥之人存
平善用耳
風寒暑濕邪愆藿香正氣預防
藿香半夏蒼木各一錢甘草五分姜三片棗二枚水煎溫
服治四時感冒傷寒時氣溫疫山嵐瘴氣但覺四肢拘急
心腹滿悶飲食不化或有吐利惡寒等症却未發熱者宜
此先正胃氣以預防之兼治霍亂吐瀉下痢赤白不服水
土等症如感冒更加頭疼發熱胸滿者藿香正氣散如前
症更加身痛者人參敗毒散九味羌活湯○藿香正氣散
霍香紫蘇白芷大腹皮茯苓各六分厚朴白朮陳皮桔梗
半夏麴各四分甘草二分姜棗煎服治內傷脾胃外感寒
邪寒熱拘急頭痛嘔逆胸中滿悶與夫傷食傷冷傷溫中
暑霍亂山嵐瘴氣不服水土寒熱如瘧並宜增損用之非
正傷寒之藥苦病在太陽頭疼發熱骨節痛者此方絕無
相干誤服反虛正氣逆其經絡凡氣虛及夾陰傷寒俱不

用可溫通聖雙解。防風通聖散。防風川芎當歸赤芍大

芩桔梗各五分。滑石一錢半。甘草一錢。荆芥白朮山梔各

一分半。姜三片。水煎溫服。治春夏溫熱。狀如傷寒。表裏俱

見者。兼治內科一切風寒燥熱。及飲酒中風。或便閉。或癰

泄。或風熱上壅。不言等症。雜科耳目口鼻唇舌咽喉風熱

風痰等症。外科癰疽瘡癤發斑打撲跌傷等症。小兒驚癇

積熱諸風潮搐。痘出不快等症。婦人諸疾。合四物湯一料

九屬風熱之疾。無所不治。如自利去硝黃。自汗去麻黃。名

通聖散。雙解散。即防風通聖散。合益元散等分。姜葱豆

豉煎服。發吐則探吐。欲下則下。欲汗則汗。故名雙解散。治

風寒暑濕。飲食飽勞。役內外諸邪所傷。以致氣血怫鬱。變成

積熱。發為汗病。往來寒熱。癰瘡。驚悸等症。小

兒瘡疹尤妙。如自利去硝黃。自汗去麻黃。夏熱益元單

方。益元散。又名六一散。取天一生水。地六成之。義也。滑石

六兩。甘草一兩。為末。每三錢入蜜少許。沸湯調服。熱者

冷水調服。孕婦慣半產者忌服。如傷寒身熱不鮮。加蒼朮

末三錢。葱豉湯調連進。致服汗出為度。又汗吐下後餘熱

以此解之甚妙。虛煩不眠。加辰砂少許。身熱霍亂。恒吐轉筋者。先按地坑。傾新水一桶。在內攪勻。澄清。謂之助水。其藥自沉碗底。去清水。用前地漿水調服。名油蔎散。一切風熱上壅。咽喉不利。加青黛薄荷少許。蜜丸。化。一切寒症。瀉痢嘔吐。夜胃。加乾姜五錢。名溫六九。中寒甚者。再加疏黃少許。用生姜汁浸炒餅丸。又能伐肝和。一切暑症。作渴。新汲水下。感田禾燒氣作渴。用帶泥稻稈煎湯下。一切濕熱。腸癖泄瀉。其滑石用牡母皮煮過。加紅麴五錢。名清六九。用陳米飯丸。每五七十丸。白湯下。如產後腰痛。自利。用補脾補血藥下。或加五靈脂一兩。能行血止痢。瀉甚。加肉豆蔻少許。一切痰熱。止逆反胃。驚癇。頭狂熱。毒瘡。痢腹。痛。加黃丹少許。姜汁蒸餅為丸。服。如溫暑。梔子升麻湯。輕者。通用九味羌活湯加減。入裏加大黃。梔子升麻湯。合

秋令之晚發

生地甘寒三錢。山梔苦寒升麻甘苦寒柴胡。服治晚發傷寒。太陽症。具下可大汗。宜此清肌解熱。兼治溫熱及虛煩不止。自汗加桂枝。無汗加蘼葉乾葛。虛煩加

知毋麥門冬。渴加天花粉。咳嗽加杏仁。此方潤燥深合愚
意。以秋為晚發。經曰。燥淫於內。治以苦溫。佐以辛正。此
方之謂也。他如張子和六神通解散。用蒼朮石羔滑石黃
芩麻黃甘草姜葱煎服。雖以三月為晚發。亦不甚宜。或疑
冬傷於寒。春必病溫。晚發乃溫病之遲者。夏傷於暑。秋必
病瘧。豈可以秋病為晚發耶。殊不知瘧有一日一發。或熱
多寒少者。其邪淺。夏傷於暑而然也。有三日一發。或寒多
熱少者。其邪深。結成瘧。非隔冬寒邪鬱伏。後再感暑而
後發動。若本夏所感之邪。安能遂成瘧耶。白芍生地。飲
所以秋病多於四時者。此也。推之痢症亦然。白芍生地。飲
冬月之愆陽。加減調中湯。白芍一錢半。茯苓白朮各八分。
甘草各二分。水煎溫服。治冬溫及春月暴暖。煩躁眠食不
安。或掀脫欲作傷風狀者。如體盛加黃芩。有痰加貝母。
中暑中喝。白虎或加參朮。白虎加參湯。石膏五錢。知母人
參各二錢。甘草五分。粳米一大撮。水煎溫服。虛煩不止。加麥門冬。尤錢。治動中喝傷氣。身
熱脉洪。或遲煩渴口燥。小便便已。洒然毛聳。口開前版齒燥。

黑。煎治發熱。故又名化熱湯。白虎加蒼湯。石羔四錢。知

母三錢。蒼木二錢。甘草五分。粳米一大撮。水煎溫服。自汗

不止。加桂枝尤妙。治靜中暑傷濕。惡寒。脉沉。暴寒。暴溫。調

汗出身熱。妄言。名濕溫。煎治疫癘。及秋感熱。暴寒。暴溫。調

中湯。或去大黃。葛根黃芩芍藥。蘘本白朮。枯梗。茯苓。甘草

盛熱。熱結於四肢。則壯熱。頭疼。及肚腹不和等症。如暴溫

肌熱。煩渴。加麥門冬。如是寒傷胃表。裏邪盛。或便閉。或協

熱下利。血水。脉數。及年久。臍下血不止者。俱風溫。汗渴

加大黃七錢。下之。移時再服。得利。吐熱自止。風溫。汗渴

姜桂兼以瓜麥

姜桂湯。姜桂二錢半。石羔三錢。葛根二錢。羌活白薇杏仁青木香川芎甘草各一錢

麻黃一錢二分。水煎溫服。治風溫喘急。頭痛牙熱。多睡。語

言蹇澀。自汗四肢不收。甚者如癰。內煩躁擾。冬溫春溫。亦

宜如汗後身猶熱。加黃芩。知母。亦芍。汗多去麻黃。加桂枝。枝

粉。肝火熱。加龍膽草。瓜麥根湯。石羔三錢。瓜麥根。葛根

各二錢。人參防風各一錢。甘草五分。水煎溫服。治風溫渴

甚身熱汗出

濕溫汗多茯苓和以桂木

各一錢白朮湯茯苓乾姜

枝七分甘草五分水煎溫服方意以濕溫寒熱頭目疼痛胸滿妄言多汗兩脛逆冷者皆因暑浴冷坐石眠地為濕氣所傷復感暑搏而為病是以藥品盡皆治濕而非治暑也。所以名家亦有未詳此意而不敢用故以白虎湯加蒼朮官桂其意更明。然二方亦皆難用。輕者但以二香等湯去暑除濕等湯去濕風濕腫痛勝濕表以麻杏四般

羌活勝濕湯羌活獨活各一錢藁木防風各五分蔓荊子川芎各二分水煎溫服治

脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經氣不通行有背痛不可回顧此手太陽經氣鬱不行如身重腰沉沉然者乃

經中有濕熱也加附子黃柏蒼朮○麻杏薏苡湯麻黃薏苡仁各二錢杏仁甘草各一錢水煎服取微汗治肢體酸

疼不能轉側額上微汗不欲去衣或身微腫大便難小便利熱至日晡加劇脉浮虛而瀉甚者加川烏為引有汗加

白朮輕者只用九味羌活湯諸濕有表者俱宜○杏仁湯桂枝二錢天門冬麻黃芍藥杏仁各一錢姜五片水煎溫

服治風濕身痛惡風微腫寒濕腫痛滲濕湯表以交加五積散五積交加

散合人參敗毒散治寒濕身體重痛腰脚酸疼如寒勝者只用生料五積散甚者加附子夏月去乾姜肉桂加黃連

如天時暄熱或春分後雖無汗亦去麻黃換紫蘇葉如肚腹脹滿不快或便閉去參加山查神麴枳實如潮熱或肌

熱加柴胡乾葛中濕木附其附諸濕便溺皆調濕湯重者木附湯

白朮三錢附子二錢其草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治中濕一身盡痛發熱身黃多煩脉浮而緩○小便不利

大便反快輕者五苓散重者其草附子湯其草附子白朮各二錢桂枝四錢水煎溫服得微汗即解方意以風濕相

搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇或風勝則衛虛汗出短氣惡風不欲去衣濕勝則小便不利或身微腫是

以用桂枝其草之辛其而散風邪以固衛附子白朮之辛其而解濕氣以利經如汗出身腫加防風動氣溺不利加

茯苓濕痺防已漢已諸濕汗孔皆塞防已黃芪湯防已黃芪各二錢白朮一錢半其

草七分。姜棗煎服治諸風諸濕脉浮身重自汗及誤汗汗出不止。如胸膈不和加芍藥氣上衝加桂枝。有寒加細辛風多走注加麻黃薏苡烏頭熱多赤腫加黃芩。寒多掣痛如官桂姜附濕多重着加茯苓蒼朮乾姜中氣堅滿癰閉加陳皮紫蘓枳壳。甚者加葶藶。○漢防已湯防已二錢半黃芪一錢半白朮二錢甘草一錢。姜煎服即防已黃芪湯但汗多者附防附朮。瘕柔而厥者宜。○附子防風湯白朮茯苓乾姜附子防風川芎桂心柴胡甘草各七分。五味子九粒。姜三片煎服治傷寒柔瘕閉目合兩手足厥逆筋脉拘急汗出不止如汗不出者去防風姜桂止用三分加麻黃五分。○附朮散附子白朮各一錢獨活五分。川芎三分。桂心二分。棗二枚。水煎溫服。治傷寒柔瘕手足逆冷筋脉拘急汗出不止時發時止。不食下利者難治。如輕者剛柔通用九味羌活湯加減。

桂石桂苓瘧熱而重者速
桂枝石羔湯桂枝一錢。石羔知母各三錢黃芩二錢。水煎溫服。

治太陽陽明合病間自作瘧熱多寒少。○桂枝黃芩湯知母人參黃芩半夏各八分柴胡一錢。石羔二錢。桂枝五分。

甘草四分。姜煎溫服。治太陽陽明少陽合病。瘧疾寒熱極甚。二方以桂枝湯料。治太陽陽白虎。治陽明柴胡。治少陽意甚明顯。挾痰合二陳湯。食積合平胃散。溺澀合五苓散。便閉合大柴胡。無汗加乾葛蒼朮。有汗加黃芪白朮。夜發加

水乘表而發咳。青龍小劑。小青龍湯。

桂枝麻黃芍藥乾姜各二錢。細辛一錢。半夏一錢。半。五味子。甘草各五分。水煎溫服。治傷寒表不解。因心下有水。飲與寒相搏。氣逆乾嘔發熱而咳。或喘或噎。或湯或大便利。或小便不利。脇痛腹滿等症。蓋寒邪在表。宜桂枝甘草辛耳。以散之水。停心下而不行。則腎燥。宜姜半細辛之辛。行水氣而潤腎。咳逆而喘。肺氣逆也。宜芍藥五味之酸。以收肺氣。經曰腎苦燥。急食辛以潤之。肺欲辛。急食酸以收之。此方發汗所以散邪水。收斂所以固真水。水氣內漬。傳變不一。故有或為之症。宜隨症加減以解化之。如微利去麻黃。加羌花以下水。渴者去半夏加瓜蒌仁以生津。噎者去麻黃加附子以溫散。水寒小便不利。小腹滿去麻黃加茯苓以行下焦蓄水。喘者去麻黃加杏仁以下氣。凡服此

渴者裏氣濕水欲散也。宜再服之。或疑小青龙與小柴
症皆嘔而發熱。表裏之病。大槩彷彿。何二方寒熱不同。等
傷寒熱未盛而飲水停蓄。非青龍姜桂不能解散。傷寒
熱傳半表裏非小柴柴芩無以清解。此二方症治同。而用
藥殊也。**水入陰而下利。玄武神方。**玄武湯。白朮一錢。白茯苓
煎溫服。治傷寒四五日腹痛小便不利。大便自利。四肢重
痛。或發熱。或渴利。或嘔或咳。兼治汗後仍熱。心悸頭眩。及
陰症身痛。脉沉。汗過筋惕肉瞤。此由渴後飲水。停留中脘
所致。方意以腎主水。腎病則不能制水。是以用姜附芎朮
之辛。以溫腎散濕。茯苓白朮之甘平。以益脾逐水。經曰
寒淫所勝。治以辛熱。濕淫所勝。佐以酸平。是也。如小便利
則龜板去。茯苓大便利。去芍藥。加乾姜以散寒。咳加五
味子以散逆氣。水寒相搏而咳。加細辛乾姜以散之。嘔者
去附子。恐補氣也。**茵陳大黃調五苓。頭汗出而欲疸。**茵陳
倍生薑以散逆氣。**陳大黃調五苓。頭汗出而欲疸。**茵陳
陳大黃一兩。大黃五錢。山梔十枚。水二盞。慢火熬至一盞。溫
服。以利為度。甚者再服。當下如爛魚膿血惡物。小便下利。