

陽明經上篇總論

論

陽明經自太陽初傳而入。則有身汗自出。不惡寒反惡熱之證。仲師設爲問答。而以始惡寒。將自罷卽汗出而惡熱。以明之。又總揭陽明居中。萬物所歸。卽所復傳之理。以明陽明病之所閼滋大。而其所以傳入陽明之由。則不外病在太陽。失於治表。解肌發汗而已。悞下。悞利小便。亡其津液。更易致胃乾內實。大便漸難。而陽明病成矣。然將成未成之間。其因風傷太陽衛。而傳陽明者。則脈陽微。而汗出多之故也。其因寒傷太陽營。而傳陽明者。則陽脈實。而發汗出。太過之故也。又有本太陽表病。而解肌發汗。不如法汗出太少。而邪不徹。爲太過。爲不及。俱轉屬陽明。之所以然也。但將成未成。仍帶太陽居多。故有太陽陽明之編。風因者。表未解。仍以解肌爲發汗。桂枝湯爲宜。寒因者。無汗而喘。仍以發汗爲發汗。麻黃湯爲宜。一定不易之法也。雖已傳陽明。而未全罷太陽。仍分用爲風因。不能食爲寒因。昭昭也。殆旣傳陽明矣。又何

以辨其表裡各別。則潮熱一證。發作有時。又昭昭也。更爲叙已傳陽明之證。不惡寒能食而欬者。風因也。因病自不能食。寒因也。反無汗而小便利。嘔而欬手足厥而頭痛者。太陽未罷也。不欬不嘔。手足不厥。則必熱矣。頭不痛者。陽明已傳也。其有口燥欲漱水。不嘔寒。因爲陰邪。故衄。再者脈浮發熱。口乾鼻燥。能食。一證。風因爲陽邪。亦必衄。蓋於初犯陽明。熱邪入裡。而未甘伏服。尚欲升越。爲動血妄行之衄。俱陽氣盛。而足以達邪。賴衄可以減邪之勢者也。故陽明胃氣平素旺勝。則雖邪入。必不能留。必穀氣與汗相逆。還之太陽。奄然發狂。濶然汗出而解矣。所以口欲食。而二便調。正見胃氣之有餘也。如或胃氣平素衰弱。陽明傳入。法多汗而反無汗。其身如蟲行皮中狀。則久虛之故。正欲祛邪。令其外達於表。而不能耳。仲師必就日晡潮熱一證。辨其表裡。而行治法。辨必辨之。於脈。脈虛浮與脈實。表邪之入裡。在表判然。故發汗。用桂枝湯。下之用大承氣湯。爲胃內以與陽外透者。分治也。不然。則非風因。終不用桂枝。胃未實。終不用大

承氣也。風因寒。因成陽明病爲然矣。又有風寒兩感而成陽明病者。於是。有陽明中風。而腹滿微喘脈浮而緊之證。惟審真邪仍在表。則大青龍。仍如風因之桂枝。寒因之麻黃。必當用也。若下之。則腹滿小便難。成悞下之壞證矣。蓋下原下其胃實。胃未成實而悞下。則熱在外。而表邪未全除。徒使寒藥格熱邪於腸上。梔子豉湯。以上越爲發散。又治悞下而不離解表之法也。再或本爲太陽病。而悞吐。悞下。渴。發汗。漸致津液亡。而成陽明病者。急須調胃。以去邪而存津。此小承氣湯。和之爲悞治亡津成陽明病而設也。按傷寒雖有陽明病。而嘔多。則太陽必不全罷。氣欲上越。必不可與攻裡。再者。傷寒。悞吐。腹滿。則陽明已見津亡。必當急與之調胃。是皆爲悞吐。悞下。貽害於胃者。補偏救弊也。然其中有嘔同而屬胃。屬膈不同。又不可不辨。食穀而嘔。爲胃素虛寒之治。則吳茱萸湯證也。若傷寒傳裡之嘔。則得湯反劇。以傷寒傳裡之嘔。是熱邪在膈上。爲上焦。而胃寒在中焦。故吳茱萸湯。又當另商治法也。倘或脈見遲。證見食難。用餽。飽。則

微煩頭眩此欲作穀痺斯乃胃家虛熱之正病當不治胸膈仍當調助其胃氣矣有虛熱必有虛寒如陽明病中寒中字作平聲讀不能食小便不利欲作固瘕大便初鞭後溏是其證也如此而不治其寒乃攻其熱皆悞認陽明病爲胃實而不知有胃本虛冷之故者也胃虛冷脈雖浮必遲證必下利清穀四逆湯治虛者少治寒者多豈惟不能食水亦不能飲飲水尚噦顧可攻其熱哉所以陽明病有心下鞭滿者爲寒因不治表邪自入而成痞之證乃瀉心諸方中病也誤過寒者且有附子瀉心之治矣悞攻之利不止而死豈非醫之罪乎胃中虛寒悞認爲因實攻之害如此又有胃中燥熱津亡而復利其小便者其不識治陽明存津調胃之理耗津與悞下其去幾何耶是故太陽陽明爲病凡帶太陽風因寒因繼不同俱不自下既入陽明則汗下燒針俱不宜用其人發熱汗出惡寒表證未罷而心下痞則悞下所成既然矣如不惡寒而渴乃未經悞下而失於治表由太陽而轉屬陽明又曉然矣小便數大便鞭不更衣一日至無

所苦渴欲飲水而陽明病方漸成未成用調胃承氣既成用大承氣俱以法救悞之道也或渴不止者水氣之邪仍屬太陽犯本而非陽明胃實五苓散之用表裡兼治又非承氣諸方爲治裡之耑司矣不此之圖病已入陽明悞發汗則內燥心憤而譖語也加燒鍼則怵惕煩燥不得眠也下之則胃空虛客氣動膈心中懊憹舌上生胎也是太陽陽明原汗下燒鍼俱在忌禁而梔子豉湯梔子以洩香豉以散兩解表裡爲太陽欲罷未罷陽明已成未成之聖治也此傳裡之熱從下洩上發而不耑爲湧越之治也過此不治而熱入漸深矣熱多則卽成胃實濕多則必成發黃之證何非瘀熱入裡爲患也然携濕者必兼熱面合赤色其色也無汗小便不利心中懊憹其證也皆濕熱之邪爲病而胃中素有水飲兼以傳入熱邪相溷而黃病成矣所以胃不實而成黃病則胃濕而不燥之故燥則成實而小便數大便鞭濕則不能成實而小便反不利矣此黃病與胃實不兩立之勢也或有因被火劫而發黃者又陽明病濕邪携火邪之熱所

因不同而濕熱內瘀發黃之理。則維的矣。更有太陽之邪變熱入裡。不屬胃而屬脾。則脾家素濕。繫在太陰。太陰亦陽明之表裡也。不屬胃濕。必屬脾濕。小便不利。則瘀熱發黃。小便利。則積熱成實。脾胃一臟。一腑。分合之故。又如此。及其熱入裡更深。終不成胃實。又有熱入血室之證。在太陽有之。在陽明亦有者。蓋太陽陽明總可作太陽一經論也。故未成蓄血者。祇以刺法洩熱。既成蓄血。則以抵當下血。又從血室中辨虛實。用下法。與胃家無涉也。如俟病人表證之太陽既全無。而裡證之胃實亦未成於此。而斟酌下法。是在胃之下。下固下其熱。而非下其實也。在血室之下。下固下其實。更非下其胃也。推之挾熱之利。亦必用下。通因通用。通以爲塞。熱去利止。雖下法種種。究何嘗有一爲下胃實者乎。甚至病在陽明而太陽尚留少陽已犯。三陽彌漫。俱爲邪。故三陽見證。俱爲症矣。可不慎歟。續浮之小柴胡。但浮之麻黃湯。無非使尤恃少陽一路。爲邪出透表之門。脈浮則生。不浮不尿。而加嚦津亡氣竭。則將抵於無所復傳之陽明證矣。

陽明彌漫三陽之邪。非少陽而升。卽太陽而透。從表入者還表而愈。其於太陽。陽明始終以升解爲如法。以攻下爲忌禁。仲師諄切言之。不啻至再至三也。是太陽陽明胃終未成實總無下法。縱有下法亦非下胃實此太陽陽明至要之訛也。凡胃不成實誤下之弊。至於莫救。可不取仲師是篇。而反覆詳慎以讀之乎。

故人深恨我

我亦深恨故人

傷寒論本義卷之四

陽明經上篇

問曰

陽明病外證云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。

(二)

問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。答曰。雖得之一日惡寒。將自罷。卽自汗出而惡熱也。

(按)此二條乃申明陽明之外證。示人知所審辨也。病有太陽中風不解。傳入陽明者。何以辨之。仲師設爲問答曰。陽明未知其裡。之何時。傳必先驗其外。之何所證。答曰。太陽病有身發熱。汗自出。而惡風者。此非陽明病也。蓋身發熱。汗自出。原爲太陽中風之本證也。乃太陽病。身發熱。汗自出。竟不惡風寒。而反惡熱矣。

則病已去太陽而入陽明矣。此陽明病由太陽中風而傳入者也。再太陽傷寒亦有傳入陽明者，又何辨之？仲師更設爲問答曰：病有得之一日、起初之時，不見發熱而但見惡寒者何病也？答曰：雖得之一日之時，惡寒爲太陽傷寒之證，乃惡寒亦將自罷矣。夫將自罷非愈也，乃不惡寒反自汗出而惡熱也。此陽明病之由太陽傷寒而傳入者也。可知傷寒之惡寒爲無汗而中風之惡寒爲汗自出也。可知陽明之由傷寒傳入初得尚惡寒，陽明之由中風傳入初得尚惡風。迨至汗自出而惡熱，則無論風寒皆爲傳入陽明已無疑也。太陽中風則發熱惡風，汗自出爲正證，太陽傷寒則惡寒無汗爲正證。太陽上中篇言之詳矣。今傳入陽明，則但以汗出惡熱爲正證也。學者詳焉。

(三)問曰：惡寒何故自罷？答曰：陽明居中土也，萬物所歸，無所復傳，始雖惡寒，一日自止，此爲陽明病也。

按此條乃申解上條惡寒自罷之故，舉要旨以示治也。太陽病有惡風、惡寒、傳陽明則變爲惡熱。此乃太陽陽明之大關鍵。仲師旣示其辨，復明其旨，亦設爲問答以言之。問曰：惡寒至陽明，何以自罷？答曰：陽明居中屬胃土也，統五行而奠四方。萬物生於斯，卽歸於斯。病由太陽入，亦遂歸著於斯矣。然胃爲倉廩之官，大腸爲傳送之官。病入倉廩而閉秘，大腸無可傳送矣。善治者，倘有所匡救，使敷倉之粟不爲紅朽，而後蕭何轉運之功可成也。觀其一日惡寒，二日自止，止而惡熱，難於日計。胃津日益虛，病邪日益實，外不能透表，內不能渡裡。結窒中土，五行盡厲。此陽明病之所以無所復傳，而爲害甚大也。苟明其要，而治法可急圖矣。再繹萬物歸土之義，祇因表邪變熱，由太陽之經絡近陽明，在表初變熱必已。犯陽明之經，及熱火裡，有不犯陽明之府乎？再胃主容納，物入其中，必稍停蓄。方下大腸邪熱，人亦如是無二理也。此所以原文曰：萬物所歸。又曰：無所復傳也。無所復傳，正言胃成實結耳。若其邪入，苟氣足升散，自有少陽。

門戶。何謂無所復傳乎。且大腸傳送之官亦未嘗不可傳。惟其結實已成。則非推蕩不行故。無所復傳。正欲言傳。以求得傳示人而已。

(四)

問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實。大便難者。此名陽明也。

按此條乃申解上條爲陽明病之因。歷舉之以分治也。陽明爲土。萬物所歸。無所復傳之義。已明其旨矣。然病何以由太陽得入陽明乎。仲師復設爲問。答曰。何緣太陽病得爲陽明病。答曰。太陽病治之未善。所以得陽明病也。若發汗過多。若下。若利小便。皆致得陽明病之因也。汗出利小便。皆能使其人津液亡耗。亦津液亦以胃爲歸。亡耗則胃中乾燥。而裏熱生。裡熱生。則在表之風寒亦隨變熱。裡熱外蒸。故自汗出。風

寒變熱。故表惡熱。內外熱合爲一。此所以太陽之病轉屬於陽明也。雖然。陽明固病矣。而其病亦有淺深異同。故其證亦不一。如陽明病不更衣證。乃胃中津液。而津枯乾燥也。如陽明病內實證。乃胃中邪熱大盛。而結秘成實也。如陽明病大便難。證。乃胃中燥熱半盛。尚有大便而艱難也。爲證不同。則治之之法亦不同。一見此證者。當與太陽下篇別條所云。傷寒不大便。六七日頭痛有熱者。與承氣湯參看也。承氣四方。仲師並未明言。斟酌之間。神明之妙。存乎人矣。

方喻二註。謂此條係由中風而成。不知上條乃根第一二條。中風傷寒。總言其要。此條又根上條。而別其證。原文未嘗有中風由來之言。何所據。而爲單言中風。方有此三證也。

脈陽微。而汗出少者。爲自和也。汗出多者。爲太過。陽脈實。因發其汗出多者。亦爲太過。太過爲陽絕於裡。

(六)

(五)

心津液大便因鞭也。

○此二條乃申解上條發汗過多致陽明受病之因。分舉之以示禁也。上條言陽明三證成於若發汗。若下若利小便。心其津液矣。若下若利小便本無二法。易知禁也。獨傷寒中風原爲二證。卽發汗亦有宜不宜。何可槩言之。仲師故於此二條申明焉。其人脈陽微而汗出。中風之證也。中風證本有汗。然汗少出則肌自解。而營衛和。若發汗而汗出多者。則爲太過矣。再其人陽脈實而無汗。傷寒之證也。傷寒證本無汗。然發其汗。汗旣出。則表已透。而營衛亦和也。若發汗而汗出多。雖宜發汗者。亦爲太過矣。斯二者。宜汗不宜汗。不同。而發汗過多。致陽明病。則同。津液耗於內。而陽氣浮於外。陽浮於外。則將絕於裡。津耗於內。則其勢馴至於亡。倉廩之官失所守。傳送之官無可輸。大便因鞭。乃正陰日燥。邪陽日實。必至於無所復傳。穀氣垂盡而不救也。過多之汗。可輕發哉。○表邪內入傳經。自太陽而必歸於陽明者。原文自言萬物所歸。

經文陽絕之義以足阻絕  
著陽盛阻  
之絕內經言  
灑多如此

矣。然成胃實者十無一二。卽傳少陽者十有八九。何也。蓋必其人胃虛熱甚。津液亡而燥乾。故外感之邪變熱入裡。先與胃熱合。成一熱。又因虛而不能氣達乎上。開少陽之生路。所以有無所復傳之義也。不能上達。焉得不下之以下達耶。但熱邪在胃不成實者。調胃承氣之證之治也。成實必有物在胃。如飲食痰涎。皆是熱邪得此。煉成鞭物。爲有形之邪。則大承氣之證也。然旣有痰涎。亦津液也。又不能遽成實矣。必大積飲食。方易成胃實。而能飲食之人。胃氣自足。邪入易於升達。少陽不致遽成無所復傳。此所以自陽明一過。卽傳少陽者十有八九。而入胃不成實者。十有七八也。成實者十之一二也。

本太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明也。  
按此條乃就上條發汗過多致成陽明病更言發汗過少亦成陽明病歷舉之以示禁也無論中風傷寒汗出過多津液內亡陰燥陽實轉屬陽明上條言之詳矣亦有知發汗過多爲禁者然中風則解肌未通傷

寒則散邪未盡。自太陽初受風寒之時。發其汗而汗終出不徹者。則在表之邪亦可以日久變熱於外。內鬱之熱日久耗津於內。汗雖出未太過。而津已坐耗爲多。其陽盛津必大便因鞭轉屬陽明無二也。蓋天地之間惟有中庸之道。過與不及皆爲病也。豈止陽明汗多汗少之故乎。學者詳焉。

八

陽明病脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。

九

陽明病脈浮。無汗。而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。

按

此二條乃申解上條太陽初得病發汗之出不徹轉屬陽明。而仍帶太陽者。分舉之立法以示禁也。太陽中風傷寒。解肌肌不盡解。發汗汗不盡出。外邪氣變熱。內正氣生熱。陰燥陽絕。太陽病已轉屬於陽明矣。然病有已入陽明。而尚未離太陽者。則中風傷寒二邪。尚在表而未盡除也。豈可遽舍太陽之表治。而從

陽明之裡治乎。仲師分舉之以立法，仍是風寒判然不相紊。其陽明病已成脈應洪大矣，而兼似緩之遲，汗出多，應惡熱矣。而尚微惡寒，知此乃證未全歸陽明也。蓋風邪在表未解，可解肌以發其汗。桂枝湯仍從中風之法治之，無二義也。再陽明病脈應洪大，又別見浮緊矣。應汗出乃無汗，而喘矣。亦知此病未全歸陽明也。蓋寒邪仍在表未散也。寒邪在表，可正發汗。麻黃湯仍從傷寒之法治之，亦無二義也。此乃太陽、陽明之證入陽明未深，故令其邪仍自表出，不致於歸於胃，而無所復傳。是解肌發汗二法始終井井，又自太陽三篇至此歷歷明之不爽者耳。

(十) 陽明病若能食者名中風不能食者名中寒。

按此條乃申解上條陽明病本中風傷寒由來之辨。分言之以示人也。上條表邪未盡，分治風寒必詳其脈證，不令悞矣。然既成陽明證，恐汗出惡熱是其證之常。洪大是其脈之常。縱有兼脈，兼證不易詳辨，恐致