

增注類證活人書卷第十三

大柴胡湯

三

太陽病過十餘日發汗吐下之後

五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止

云嘔心下不安

下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈

○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與服○傷寒

發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者此主之

上已

陽太

○陽明病汗多者急下之宜服○少陰病下利

清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣湯○

病腹中滿痛此爲實當下之宜大承氣大柴胡湯○

腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯○

傷寒後脉沉者內實也下之解宜服○傷寒六七日
目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實
也急下之宜大承氣大柴胡湯○太陽病未解脉陰
陽俱停必先振慄汗出而解但陰脉微者下之而解
宜服○病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可
下之大柴胡湯主之○病人煩熱汗出則解又如瘧
狀日晡所發熱者屬陽明脉實者可下之大柴胡大
承氣湯主之

屬可下
病脉證

柴胡

肆兩

黃芩

芍藥

各壹兩半

半夏

壹兩壹分洗

枳實

貳枚去穢炒千金云枳實去穢壹分準貳枚

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服以利為度未利再服

本方無大黃欲下者加大黃一兩

柴胡桂枝湯第十一傷寒六七日發熱微惡寒支節煩

頭疼微嘔心下支結外證未去者此主之屬太陽發

汗多亡陽譫語者不可下與此藥和其榮衛以通津

液後自愈屬發汗後病脉證

柴胡壹兩參錢桂枝去皮黃芩

人參各半芍藥各半半夏肆錢壹字洗

甘草參錢壹字炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

柴胡桂枝乾薑湯

三十二

傷寒五六日已發汗而復下

之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也宜服之

屬太陽

柴胡

肆兩

桂枝

去皮

黃芩

各壹兩半

牡蠣

熬

甘草

炙

乾薑

各壹兩

栝樓根

貳兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服食頃再服

柴胡加龍骨牡蠣湯 傷寒八九日下之胃滿煩

驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者此主之 陽屬太

柴胡

黃芩

龍骨

各壹兩

鈎丹

人參

桂枝

汗多恐亡陽故也若汗多不止用溫粉撲之

溫粉方

白朮

藁本

川芎

白芷

各等分

右搗羅為細末每末壹兩入米粉叁兩和之粉撲
周身止汗無藁本亦得若汗已出後盡劑服汗

亡陽暈逆身風煩躁不得眠也

小青龍湯

三十八

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不

渴服湯已渴者此寒去欲解也此主之。傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便利小腹滿或喘者此主之

芍藥

桂枝

去皮

乾薑

炮

甘草

炙

細辛

各壹兩半

五味子

壹兩別本或加壹分

半夏

壹兩半湯洗若渴者去半夏加枯樓根壹兩半

麻黃

壹兩半微利者去麻黃加羌活如畫彈子然令赤色若噎者去麻黃加附子半箇炮若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓兩若喘者去麻黃加杏仁壹兩半去皮尖

麻黃
湯泡

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服 杏仁半夏二味或各作壹兩壹分

小建中湯

三十七

傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛

先與小建中湯不差者小柴胡湯主之○傷寒二三

日心中悸而煩者宜服

芍藥

參兩

甘草

壹兩炙

桂枝

壹兩半去皮

膠飴

半升舊有微澹或嘔者去膠飴局方加黃蓍壹兩半為黃蓍建中湯

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑四

片大棗子一枚煮至八分去滓下膠飴兩匙許再

煎化溫服日三服夜二服尺脉尚遲再作一劑加黃耆末一錢

煎造膠飴法

糯米

壹升揀
淘淨

大麥蘖末

陸兩

右米一如炊飯甑上至氣溜取下傾入一盆子入藥末一合并湯一盞來許拌和再上甑至飯熟却入盆子內都以藥末拌和入一甕罐子可容五升許冬月罐子熱春秋夏溫冬月用湯二升許入罐子內約內面飯上湯三指許即得布并紙三五重蓋定更以綿或絮抱定近火春秋夏即溫和至一

宿見米浮在水面上卽以布絞裂取清汁銀石罷
內煎至面上有膜卽以木篦不住手攪至稀糊以
龍腦收夏月置井中庶不酸

大陷胃湯

三十八

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則

爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反
惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中
空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懷陽氣內陷心下
因軟則爲結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出
餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃○傷寒六
七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭者宜服

○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲小結在胸脇也但頭微汗出者此主之○太陽病重發汗而下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹鞭滿而痛不可近者此主之○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲結胸也此主之

屬太
陽

大黃

一兩半去皮
錫文者爲末

甘遂

一字赤連珠
者紐羅爲末

芒硝 五分

右以水二盞先煮大黃至三盞去滓下消一沸下甘遂末溫服得快利止後服

又大陷胃湯方

桂枝 一兩

甘遂 一兩或作半兩 大棗 一兩或作參枚

人參 一兩

栝樓實 一枚去皮只用四分之一

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞或作二盞煮至八分去滓溫服胃中無堅物勿服之

大陷胸圓 三十九又見辭誤

病發於陽而反下之熱入因作結

胃病發於陰而反下之 一作汗出 因作痞也所以成結胸

者以下之太早故也結胸者項亦強如柔痙狀下之

則和宜此藥主之屬太陽

大黃貳兩或作四兩芒硝三分

杏仁三分去皮尖熬黑

苦葶藶子三錢熬

右搗羅二味內杏仁芒硝合研如脂丸如彈子大

每服一九抄甘遂末半錢匕白蜜一合水二盞煮

取一盞頓服一宿乃下如不下再服甘遂性猛宜斟酌量虛實服之

小陷胃湯四十又見辭誤小結胃病正在心按之則痛脉浮

滑者此主之屬太陽

半夏湯洗秤二兩半黃連一兩

桔樓一枚去皮或作半枚

右剉如麻豆大水二盞先煮栝樓至一盞半下諸

藥煎至八分去滓溫服未知再服微利黃連便安

大承氣湯

四十一

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身

必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也

手足濇然汗出者此大便已鞭也此藥主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也

一法與桂枝湯

其熱不潮未可與

承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣

勿令大泄下○陽明病潮熱大便微鞭者可與此藥

不鞭者不可與之○傷寒若吐若下後不解不大便

五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如

見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生瀉者死微者但發熱譫語者此主之若一服利則止後服○陽明病譫語有潮熱反不食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭耳宜服○陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之澱然汗出則愈汗出譫語者以爲有燥屎在胃中此爲風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜服○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳熱汗出大便難而譫語者下之則愈宜服○陽明病下

之心下懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭
鞭後必澹不可攻之若有燥屎者宜服○病人煩熱
汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實
者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣發汗宜
桂枝湯○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者
此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜服○傷寒
六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微
熱者此爲實也急下之宜服○陽明病發熱汗多者
急下之宜服○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩
燥心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微

和之令小安至六日與承氣一升若不大便更六七
日小便少者雖不大便但初頭鞭後必溏未定成鞭
攻之必溏須小便利屎定鞭此主之○發汗不解腹
滿痛者急下之宜服○腹滿不減減不足言當下之
宜服○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘
冒不能卧者有燥屎也宜服○陽明少陽合病必下
利其脉不負者爲順也負者失也互相尅賊名爲負
也脉滑而數者有宿食也當下之宜服已上屬陽明○少
陰病二三日口燥咽乾者急下之宜服○少陰病身
利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之宜服○

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜服

已上屬少陰

○下利三部脉皆平按之心下鞭者急下之宜服○

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜服○

寸口脉浮而大按之反濡尺中微而濡故知有宿食

當下之宜服○下利不欲食者以有宿食故也當下

之宜服○下利差至其年月日時復發者以病不盡

故也當下之此主之○下利脉反滑當下所去下乃

愈此主之○脉雙弦而遲者必心下鞭脉大而緊者

陽中有陰也可下之宜服○病腹中滿痛者此爲實

也當下之宜服此主之

已上屬可下病脉證

三