

耿氏濟生方

再授

二

古抄本
卷上
生下有論字
增修二字又

嚴氏濟生方卷之三

心痛論治 蟲痛附

論曰夫心痛之病醫經所載凡有九種一曰蟲心痛二曰疰心痛三曰風心痛四曰悸心痛五曰食心痛六曰飲心痛七曰寒心痛八曰熱心痛九曰去來心痛其名雖不同而其所致皆因外感六淫內沮七情或飲啖庄冷菓食之類使邪氣搏於正氣邪正交擊氣道閉塞鬱于中焦遂成心痛夫心廻諸藏之主正經不可傷傷之則痛若痛甚手足青遇節者則名曰真心痛真心痛者旦發夕死夕發旦死若乍間乍甚

成疼而不死者名曰厥心痛不過邪氣乘於心支別
絳也寸口脉緊心脉甚急皆主心痛又有痛甚而心
脉沉伏者有之矣王叔和云心腹痛脉沉細差浮大
弦長命必殂治法當推其所自而調之痛無不止矣
加味七氣湯治喜怒憂思悲恐驚七氣爲病發則心
腹刺痛不可忍時發時止發則欲死及外感風寒濕
氣作痛亦宜服之

半夏

湯泡柒次三兩

桂心 不見火

玄胡索

炒去皮各一兩

人參

甘草

炙各半兩

乳香

三錢

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七斤棗一枚煎

至七分去滓食前溫服。婦人血痛加當歸煎。

大痛圓治九種心痛腹脇氣脹不欲飲食

附子

炮去皮臍二兩

乾薑

炮

吳茱萸

炒

狼毒

剉醋拌炒黃

人參各一兩

巴豆

半兩去殼油

右細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三圓熱湯送下。不拘時候。

愈痛散治急心痛胃痛

五靈脂

去砂石

玄胡索

炒去皮

蓬莪朮

煨剉

良姜

剉炒

當歸

去芦洗

右等分爲細末每服二錢熱醋湯調服不拘時候。

蕪荑散治大人小兒蛻咬心痛經云蟲貫心則殺人
欲驗之大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出
發有休止此是蛻心痛也宜速療之

乾擦搗碎炒火煙盡一兩雷丸

蕪荑各半兩

右爲細末每服三錢溫水七分盞調和服不拘時
候甚者不過三服小兒每服半錢重

燒脾散治飲啖生冷菓菜寒留中焦心脾令痛不可
忍及老幼霍亂吐瀉

乾姜

炮

厚朴

姜製剉炒

草果仁

縮砂仁

神曲

剉炒

麥蘖

炒

橘紅

良姜剉炒

甘艸

炙各等分

右爲細末每服三錢用熱鹽湯點服不拘時候

怔忡論治

論曰夫怔忡者此心血不足也蓋心主於血血乃心之主心乃形之君血富則心君自安矣多因汲汲富貴戚戚貧賤又思所愛觸事不意真血虛耗心帝失輔漸成怔忡怔忡不止變生諸證舌強恍惚善憂恚少顏色皆心病之候難經曰損其心者益其榮法當專輔真血真血若富心帝有輔無不愈者矣又有胃風寒暑濕閉塞諸經令人怔忡五飲停蓄煙塞中脘

亦令入怔忡當隨其證施以治法

益榮湯治思慮過制耗傷心血心帝無輔怔忡恍惚
善悲憂少顏色夜多不寐小便成濁

當歸去芦酒浸黃芪去芦

小草

酸棗仁炒去殼柏子仁炒

麥門冬去心

茯神去木

白芍藥

紫石英

細研各一兩

木香不見火

人參

甘草

炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

龍齒丹治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒

附子

炮去皮
姜汁浸一宿
切片

遠志

去心甘草煮

當歸

去芦酒浸

官桂

去皮不
見火

南星

剉姜汁浸一宿各一兩

琥珀

別研
炒去殼

紫石英

煨醋淬七遍
沉香

別研

熟地黃

酒蒸焙各半兩

木香

不見火

右爲細末，煉蜜爲圓如梧桐子，大朱砂爲衣。每服五十圓，用棗湯送下，不拘時候。

心丹治憂愁思慮謀用過度或因驚恐傷神失意耗傷心血，怔忡恍惚夢寐不安。

朱砂 五十兩

新羅人參

遠志

去心甘草煮

熟地黃

洗淨酒
蒸焙

白朮

石菖蒲

當歸

去芦酒
浸焙

麥門冬

去心

黃芪

去芦

茯苓

去皮

茯神

去木

柏子仁

揀淨

古抄本不鑿蜜仁作酸東仁

已上各
五兩

石蓮肉

去心炒

益智仁

五兩

古抄本不鑿蜜仁作酸東仁

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將此藥滾和以夾生綿袋盛貯用麻線繫袋口於突上安大銀鍋一口著長流水令及七分重安銀罐入白砂蜜二十斤將藥袋懸之中心勿令著底使蜜浸袋令復以柴燒鍋滾沸勿令火歇煮三日蜜焦黑換蜜再煮候七日足住火取出淘去衆

薰洗淨砂令乾入牛心內薰各七次薰煮砂時別安
銀鍋一口，煖水候大鍋水耗從鍋弦添溫水候牛
心薰爛熟取砂再換牛心如前法薰凡換七次其
砂已熟卽用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研直候
十分細末棕爲圓如豌豆大陰乾每服十粒至二
十粒食後參湯棗湯麥門冬湯任下

茯苓飲子治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓去皮半夏湯泡七次茯神去木

橘皮去白麥門冬去心各一兩沉香不見火

甘艸炙檳榔各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分

去滓溫服不拘時候

排風湯治風虛冷濕閉塞諸經令中人怔忡

方載中風門中宜加炒酸棗仁煎

壽星圓治驚憂思慮氣結成痰畱蓄心胞怔忡驚惕
痰逆惡心睡卧不安方載中風門中

驚悸論治

論曰夫驚悸者心虛膽怯之所致也且心者君主之官神明出焉膽者中正之官決斷出焉心氣安逸膽氣不怯決斷思慮得其所矣或因事有所大驚或聞

虛響或見異相登高陟險驚忤心神氣與涎鬱遂使驚悸驚悸不已變生諸證或短氣悸乏體倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安皆心虛膽怯之候也治之法寧其心以壯膽氣無不瘥者矣溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象感惑遂致心驚膽憚氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐

卧不安

半夏

湯泡七次

竹茹

枳實

去穰各二兩

陳皮

去白三兩

白茯苓

去皮一兩半

甘草

一兩炙

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片棗子一枚
煎至七分去滓溫服不拘時候

遠志圓治因事有所大驚夢寐不祥登高陟險神魂
不安驚悸恐怯

遠志

去心姜
汁淹

石菖蒲

各二兩

茯神

去皮木

白茯苓

去皮

人參

龍齒

各一兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大辰砂爲衣每服
七十圓用熟水送下食後臨卧

健忘

論曰夫健忘者常常喜忘是也蓋脾主意與思心亦

主思慮過度意舍不清神宮不職使人健忘治之
之法當理心脾使神意寧靜思則得之矣

歸脾湯治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯神去木

黃芪去芦

龍眼肉

酸棗仁炒去殼

各一兩人參

木香

不見火各半兩

甘草炙

二錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片棗子一枚
煎至七分去滓溫服不拘時候

虛煩論治

論曰夫虛煩者心虛煩悶是也且人之有血氣分爲

榮衛別乎陰陽。榮衛通適，然後陰平陽秘。精神廼治。
攝養乖方，榮衛不調，使陰陽二氣有偏勝之患，或陰虛而陽盛，或陰盛而陽虛。素問云：陽虛則外寒，陰虛則內熱。陽盛則外熱，陰盛則內寒。今虛煩之病，陰虛生熱，所致也。但虛煩有數證，不可不辨。傷寒大病，不復霍亂吐瀉之後，及婦人產後，皆使人內心虛煩悶。又有虛勞之人心火內蒸，亦致心煩。治療之際，不可不詳審也。

竹葉湯治傷寒太病後及霍亂吐瀉後心虛煩悶，內熱不解。

竹葉

麥門冬

去心

人參

茯苓

去皮

小麥

炒

半夏

湯泡七次各一兩

甘草

炙半兩

右咬阻每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候

小草湯治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草

黃芪

去芦

當歸

去芦酒浸

麥門冬

去心

石斛

去根

酸棗仁

炒去殼各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右咬阻每服四錢水一盞半姜五片煎至八分去

淳溫服不拘時候

地仙散治傷寒後伏暑後煩熱不安及虛勞煩熱
地骨皮去木二兩 防風去芦一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓溫服不拘時候產後虛煩載產後雜治門中

癲癇論治

論曰夫癲癇病者考之諸方所說名證不同難於備載觀別錄有五癇之證一曰馬癇作馬嘶鳴應乎心二曰羊癇作羊呌也應乎脾三曰雞癇作雞呌也應乎腎四曰猪癇作猪呌也應乎腎五曰牛癇作牛吼也應乎腎