


卷十の上



張氏醫通卷十四

長州石頑張

璐路王父纂述

男

登誕先
倬飛疇
叅訂

噎膈門

開關利膈丸

寶鑑名人
參利膈丸

治腸胃壅滯噎膈不通大

便燥結。

木香

檳榔

各七錢

人參

當歸

酒洗

藿香

甘草

炙

枳實

炒各一兩

大黃

酒蒸

厚朴

薑製各二兩

滴水為丸。梧子大每服三五十九。食後米飲下。

按此木入承氣加人參歸等味意在養正祛邪而實攻多於補惟熱壅膈塞用之庶為得宜然噎膈之燥結皆由五志抑鬱傷耗精氣而成非有熱邪留結可攻下而除也用方者審諸

五噎九千金

治胸中久寒嘔逆妨食結氣不消

乾薑

蜀椒

吳茱萸

桂心

細辛各一兩

人參

白朮

各二兩

橘皮

茯苓各一兩半

附子

一枚

右為細末煉白蜜丸梧子大酒服十五丸日三服漸加至三十丸

五膈丸 千金

治飲食不得下手足冷上氣喘息

麥門冬

三兩去心

甘草

二兩

蜀椒

炒去汗

遠志肉

桂心

細辛

乾薑

炮各一兩

附子

炮一枚

人參

二兩

右爲細末煉白蜜丸彈子大先食含一九細細嚥之喉中胸中當熱藥丸稍盡再含一九日三夜二服七日愈

五噎五膈二丸同用參附椒辛薑桂之屬一以肝

氣上逆胃氣不下而嘔噎故用萸橘以疎肝降逆

苓朮以健胃通津一以腎氣不蒸肺胃枯槁而不

納故用冬草以滋肺和胃遠志補火以生土又嘔

噎而藥食可進者。頻與小丸調之。膈塞而飲食不納者。時用大丸噙之。其立法之詳。若此。可不辨而忽諸。

旋復代赭石湯 玉兩

治胃虛噫氣不除

旋復花 二錢

代赭石 煨一錢

人參 二錢

甘草 炙二錢

半夏 二錢

生薑 半兩

大棗 擘四枚

右七味水煎去滓分溫日三服

六君子湯 四君子湯下

異功散 四君子湯下

四君子湯 方祖

指迷七氣湯 局方七氣湯下

局方七氣湯 方祖

四物湯 方祖



代抵當丸抵當湯下

理中湯方祖

越鞠丸鬱門

八味丸方祖

二陳湯方祖

反胃門

藿香安胃散 治脾胃虛弱飲食不進嘔吐不腐

藿香

橘紅各半兩

丁香三錢

人參一兩

為散每服二錢生薑三片水煎溫食前和滓服

四逆湯方祖

小半夏湯二陳湯下

大半夏湯二陳湯下

理中湯方祖

茯苓澤瀉湯五苓散下

六君子湯四君子湯下

噎膈

反胃

三



異功散四君子湯下

平胃散方祖

四君子湯方祖

桂苓丸五苓散下

七味白朮散四君子湯下

二陳湯方祖

開關利膈丸噎膈門

固本丸二冬膏下

逍遙散虛損門

歸脾湯保元湯下

八味丸方祖

黑錫丹金匱丹下

六味丸八味丸下

代抵當丸抵當湯下

嘔吐噦門

甘草粉蜜湯金匱

治吐涎心痛發作有時毒藥不

止吐蚘者

甘草半兩

粉三錢即鉛粉

蜜二錢



右三味以水三升煮甘草取二升去滓內紛蜜攪
合和煎如薄粥溫服一升瘥即止

吳茱萸湯

玉函

治胃氣虛寒乾嘔吐涎沫頭痛

吳茱萸

取開口者湯泡七次以去濁氣淫一錢

人參

半錢

大棗

四枚

生薑

半兩

右四味水煎去滓溫分日服三

通草橘皮湯

千金

治傷寒胃熱嘔逆

通草

二錢

橘皮

錢半

粳米

一合

生蘆根汁

半合

右四味水煎熱服不瘥更作

本方去通草橘皮加竹茹生薑汁千金名蘆根飲

子治傷寒後嘔噦反胃乾嘔

麥門冬理中湯千金

治漏氣上焦熱腹滿不欲飲

食食則先嘔後瀉身熱痞悶

麥門冬去心

白朮各五錢

甘草炙

茯苓各二錢

人參

橘皮

蓮心

萎蕤各三錢

蘆根生一握

竹茹一團雞子大

生薑四錢

陳米一合

右十二味水煎溫分旦三服

澤瀉湯千金

治上焦飲食下胃胃氣未定而皆身

中皆熱名曰漏氣

澤瀉

半夏

柴胡



生薑各三錢

桂心

甘草各一錢

茯苓

人參各二錢

地骨皮五錢

石膏八錢

竹葉一把

尊心五錢

右十二味水煎溫服日三

人參湯千金

治下焦熱氣逆不續嘔逆不禁二便

不通名曰走哺

人參

黃芩

知母

萎蕤

茯苓各三錢

白朮

梔子各三錢

陳皮

蘆根各四錢

石膏八錢

右十味水煎溫服日三准繩多

走哺漏氣皆屬火滯於內火性急速故得食則嘔吐且利是名漏氣若得食即嘔而便溺不通者則為走哺總是胃虛火逆所致觀麥門冬理中湯入參湯二方可知不可誤認虛寒輕用溫補之劑也

安虵散

治吐虵色赤成團而活屬熱者

烏梅肉

三錢

黃連

蜀椒

藿香

檳榔

各一錢

胡粉

白礬

各半錢

為散每服三四錢水煎如糊空腹服之差即止

半夏瀉心湯

方祖

茱萸散

五苓散下

小柴胡湯

方祖

大黃甘草湯

承氣湯下



文蛤湯湯下

橘皮湯湯下

橘皮竹茹湯湯下

半夏乾薑湯湯下

二陳湯方祖

理中湯方祖

小半夏湯湯下

大半夏湯湯下

薑附湯乾薑附子湯

黑錫丹丹下

遙遙散虛損

六君子湯湯下

橘皮半夏湯湯下

小青龍湯湯下

小承氣湯方祖

豬苓湯散下

橘皮乾薑湯湯下

黃苓湯湯下

黃芩加半夏生薑湯湯下

佐金丸方祖

連理湯湯下

補中益氣湯湯下

嘔吐



附子理中湯理中湯下

平胃散方祖

五苓散方祖

烏梅丸理中湯下

四君子湯方祖

異功散四君子湯下

歸脾湯保元湯下

霍亂門

理中湯方祖

四逆湯方祖

胃苓湯平胃散下

霍香正氣散平胃散下

平胃散方祖

六和湯暑門

香薷飲方祖

竹葉石膏湯白虎湯下

五苓散方祖

漿水散四逆湯下

二陳湯方祖

黃芩加半夏生薑湯桂枝湯下

連理湯理中湯下

天水散方祖即益元散

導痰湯二陳湯下

補中益氣湯保元湯下

六君子湯四君子湯下

關格門

人參湯 治胃寒津枯關格吐逆

人參 五錢至一兩

麝 半分至一分

冰腦 三分至半兩

為散水煎和滓分二三次溫服

此雲岐子治噎膈胃反關格不通九方之一用獨

參湯峻補其胃稍加腦麝以發越其氣得補中寓

瀉之至訣乃肥盛氣虛痰窒中皖及酒客淫熱鬱

痰固結之專劑以中有腦麝善能開結利竅散鬱



也若瘦人津枯不能出納而大便秘結者即以此方去腦麝加蘆根汁竹茹末嘗不為合轍也

栝子仁湯 治胃虛關格脈虛微無力

人參 錢半 白朮 茯苓

陳皮 各一錢 甘草 炙三分 栝子仁 錢研三

麝香 分 生薑 五片

水煎去滓入麝調服

此雲岐第二方取用異功加栝仁麝香其法稍平而胃中津枯大便艱澀者最宜亦可加蘆根汁竹茹或竹瀝俱妙

既濟丸 治關格脈沉細手足厥冷



熟附子 一兩

人參 三兩

麝香 少許
爲衣

爲細末陳米飲糊丸梧子大每服十丸至三十丸

米飲下

此雲岐第三方用參附加麝單刀直入以破中下
二焦之結藥雖峻而用法最緩不可不詳此義而
擅改作湯也

二陳湯方祖

四君子湯方祖

補中益氣湯保元湯下

黃連湯瀉心湯下

八味丸方祖

呃逆門

丁香煮散與局方不同

治胃反嘔逆呃噦泄瀉

丁香三七粒

建蓮肉去心二七粒上

生薑七片

黃秫米半合

水一碗半煮熟去薑啜粥

此倣附子粳米湯之制彼用硬米此用糯米皆取其直達胃府雖其勢稍平亦是突圍之將局方無蓮肉秫米而多川烏紅豆青皮陳皮甘草乾薑良薑益智胡椒等味為散煮湯入鹽一字調服

異功散

六味丸八味丸下

理中湯方祖

橘皮竹茹湯二陳湯下

越鞠丸鬱門

附子粳米湯腹滿門

四逆加人參湯四逆湯下

羌活附子散四逆湯下