

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩 大枣十二枚

服一升。服已須臾，歠熱稀粥一升餘，以助藥力。

右五味，以水七升，微火煮去三升，去滓，適寒溫。此不可不令如水流瀉，病不必除。此解肌之法也。若如水流瀉，則

動榮氣衛。邪仍在。若一服汗出，病瘥，停後服，不必盡劑。若不汗，更服依前法。又不汗，後服小促其間半日，許令

三服盡。若病重者，一日一夜服，周時觀之。服一劑盡，病證猶在者，更作服。若汗不出，乃服至二三劑。桂

湯全科謂之一劑三分之一，謂之一服。古一兩今二錢，零則一劑之藥除薑棗僅一兩六錢，零一服不見

過五錢，零矣。治傷寒大症，分兩不過如此。一服即汗不再服，無汗服至二三劑，總以中病為主。後世見

服藥得效者，反令多服，無效者，即禁生。冷粘滑肉，麵五辛酒酪及臭惡等物。

太陽中風，陽浮而陰弱。邪在表，故陽脈浮，陰脈弱。陽浮者，熱自發。桂枝之辛，以散之。陰弱者，汗自出。芍藥

以收之。甘草之甘，以緩之。查查惡寒，漸折惡風。輕非若中寒及陰經之甚也。翕翕發熱，陽明之甚。鼻鳴乾嘔者，鼻

似屬陽明，乾嘔似屬少陽，蓋三桂枝湯主之。太陽病，頭痛發熱，汗出惡風者，桂枝湯主之。此桂枝

陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝

枝發表，若不衝，則其邪已下陷，變病不一。太陽病，初服桂枝湯，反煩不解者，先刺風池、風府，却與桂枝

湯，則愈。此非誤治，因風邪凝結於太陽之要路，則藥力不能流通，故刺以解其結。蓋邪風太甚，不僅在衛

傷寒論類方

桂枝湯

桂枝湯



北京大學圖書館藏

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩 大枣十二枚

服一升。服已須臾，歠熱稀粥一升餘，以助藥力。

右五味，以水七升，微火煮去三升，去滓，適寒溫。桂枝本不能發汗，故須助以熱粥。內經云：穀入於胃，以傳於肺，肺主皮毛。汗所從出，散精充胃氣以達於肺也。此解肌之法也。若如水瀉，病不必除。此解肌之法也。若如水瀉，病不必除。此解肌之法也。

三服盡。若病重者，一日一夜服，周時觀之。服一劑盡，病證猶在者，更作服。若汗不出，乃服至二三劑。桂枝湯類一

湯全科謂之一劑，三分之一謂之一服。古一兩今二錢，零則一劑之藥除薑棗僅一兩六錢，零一服不見。過五錢，零矣。治傷寒大症，分兩不過如此。一服即汗不再服，無汗服至二三劑，總以中病為主。後世見疑藥誤，又復易方，無往不誤矣。即禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪及臭惡等物。

太陽中風，陽浮而陰弱。風在表，故陽脈浮，陰脈弱。陽浮者，熱自發。桂枝為陽邪，故發散。陰弱者，汗自出。芍藥以收之，甘草以緩之。查查惡寒，浙浙惡風，輕非若中寒及陰經之甚也。翕翕發熱，陽明之甚。鼻鳴乾嘔者，鼻

陽相近，故暑有兼病，但不甚耳。桂枝湯主之。太陽病，頭痛發熱，汗出惡風者，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。

陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。

陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。

陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。

陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。

陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。

陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。

陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。陽病下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。誤若不上衝者，不可與之。此誤下之症，誤下而仍上衝，桂枝湯主之。此桂枝湯之總症也。



陽仍不離桂枝法
而後下也
太陽病外症未解者不可下也此禁下下之為逆欲解外者宜服言雖有當下之症而外症未除亦不可下仍宜解外

須解外則愈宜服脈浮而下此為誤下後仍浮則邪不因誤下而陷入仍在太陽不得因已汗下而不復用桂枝也病嘗自汗出者此謂榮氣和榮氣

和者外不諱以衛氣不共榮氣和諧故爾榮氣和者言榮氣不病非以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮

衛和則愈宜桂枝湯自汗與發汗迥別自汗乃榮衛相離發汗使榮衛相合自汗傷正病人藏無他病

時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時未熱之時發汗則愈宜桂枝湯主之無他病太陽諸症不必

用桂枝湯傷寒不大便六七日宜下頭痛有熱者未可與承氣湯太陽症仍在不得以日久之不便而下也

其小便清者知不在裡仍在表也便赤為當須發汗若頭痛者必衄衄在經而血動矣宜桂枝湯傷

寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗發汗未透故煩乃宜桂枝湯傷寒醫下之續得下痢清穀

不止裏身疼痛者表急當救裡此誤下之症邪在表而引之入陰故便清穀陽氣下脫可免雖表症未除

後身疼痛清便自調者急當救表清穀已止疼痛未除仍從表治蓋凡病皆當先表後裏惟下痢清穀則

症必致救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯太陽病發熱汗出者此謂榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜

桂枝湯桂枝為聖藥陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜此方陽明本自多汗但

多汗而猶惡寒則仍在太陽陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯太陽本無汗法因其脈獨浮則邪仍

人煩熱汗出則解又如瘧狀有時日晡所發熱者屬陽明也日晡發熱則為陽明脈實者宜下之脉

虛浮者宜發汗一症而治法迥別全以脉為下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯下痢腹脹滿裏身疼痛

者表先溫其裏乃攻其表溫裡宜四逆湯攻表宜桂枝湯此節屬厥陰症未必由誤治吐痢止而身痛

不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之裏症除而表症猶在仍宜用桂枝法輕其劑而加減之可也傷寒大下後復發汗再心

小和之裏症除而表症猶在仍宜用桂枝法輕其劑而加減之可也傷寒大下後復發汗再心

下痞。邪入中焦惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心

湯。苦寒開降之法詳見後

桂枝加附子湯二

桂枝湯原方加附子一枚。泡去右六味。以水七升。煮取三升。去渣。溫服一升。

太陽病發汗。遂漏不止。此發汗太過。如水流。其人惡風。仍惡風。則表邪未盡也。小便難。津液四體微急。

難以屈伸。四肢為諸陽之本。急難屈伸。乃津脫陽虛之象。但不至亡。桂枝加附子湯主之。桂枝同附子服。則能止汗。回陽。

桂枝加桂湯三。治症迎別古聖立方之嚴如此。

桂枝原方加桂二兩。右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。

燒針令其汗。針處被寒。復感核起而赤者。必發奔豚。氣從小腹上衝心者。灸其核上。各一壯。云各一針。故

與桂枝加桂湯。重加桂。不特禦寒。且制腎氣。又藥味重。則能達下。凡奔豚症。此方可增減用之。

桂枝去芍藥湯四。

桂枝湯原方去芍藥。右四味。以水七升。煮取三升。溫服一升。

桂枝去芍藥加附子湯五。

即前方加附子一枚。泡去右六味。以水七升。煮取三升。溫服一升。

太陽病下之後。脉促。胸滿者。中虛而表微惡寒者。仍在陽亦桂枝去芍藥湯主之。太陽之邪未盡。故用桂枝。下後傷陰。不宜更用涼藥。若微惡寒者。去芍

藥方中。加附子湯主之。虛矣。故加附子。

桂枝加厚朴杏仁湯六。

桂枝湯原方加厚朴二兩。炙杏仁五十枚。右七味。以水七升。微火煮。取三升。溫服一升。覆取微似汗。



喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳
別錄厚朴主消痰下氣
乃本然之喘此乃誤
下之喘因殊而法一

太陽病下之危喘者表未解故也此湯主之

小建中湯

桂枝湯原方加膠飴一升

右六味以水七升煮去三升去滓納飴更上微火消解溫服二升日三服

嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脉濇陰脉弦
中宮之陽氣虛則木來
乘土故陽濇而陰弦也

法當腹中急痛先與小建中湯以助中宮不差者與小柴胡

湯主之
治太陰不愈變而治少陽所以陳
土中治本也

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之
悸而煩其為虛
煩可知故用建

中湯以補心脾之氣蓋梔子湯治
有熱之虛煩此治無熱之虛煩也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩
右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升此

多煎為妙取其
味厚入陰也

發汗後身疼痛
表未盡

脉沉遲
氣虛已甚此湯主之
和未盡宜表而氣虛不能勝散藥故
用人參凡素體虛而過汗者方可用

桂枝甘草湯

桂枝四兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升頓服
此以一劑
發汗為一服者

發汗過多其人叉手自冒心
心下悸欲得按者此湯主之
發汗不誤誤在過多汗為心之液多則心氣虛
二味扶陽補中此乃陽虛之輕者甚而振振欲

擗地則用真武湯矣一症而輕
重不同用方迥異其義精矣

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓半斤桂枝四兩甘草二兩大棗十二枚

右四味以甘爛水一斗
以水二斗揚之萬遍取用
燖水大約取其動極思靜之意
按甘先



煮茯苓凡方中專重之減二升。納諸藥。煮取三升。去渣。溫服一升。日三服。

發汗後。其人臍下悸者。欲作奔豚。此湯主之。心下悸是擾胸中之陽。臍下悸則因發汗太過。上焦乾。過腎水上。救故重用茯苓以制腎水。桂枝以制奔豚。

桂枝麻黃各半湯十一

桂枝一兩十六銖芍藥一兩十六銖生薑一兩十六銖甘草二兩麻黃去節各一兩大棗四枚杏仁二十四枚右七味以水

五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。欲去沫故先煮。納諸藥。煮取一升八合。減去三之一。去滓。溫服六合。云桂枝湯云。

合麻黃湯三合。頓服。將患如上法。

太陽病。得之八九日。過如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。邪已其人。不嘔。陽非少。清便欲自可。無裏一曰二三度

發非瘧脈微緩者。不浮不大為欲愈也。餘邪欲退之。微脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。此中

明上文欲愈之故。蓋由病氣雖除。而正氣亦衰。當靜以養之。使胃氣漸充。則面色反有熱色者。未欲解也。

榮衛和若更用汗吐下之法。益虛其氣。則病從藥增。醫者不審。誤人多矣。面色反有熱色者。未欲解也。

餘邪尚鬱。以其不得小汗出。身必痒。宜服矣。陽明篇云身痒如虫行。皮中狀者。此以久虛故也。按此

方分兩甚輕。計共約六兩。合今之秤。僅一兩三四錢分。

桂枝二麻黃一湯十二

桂枝一兩十七銖芍藥一兩十六銖杏仁十六枚麻黃去節一兩甘草二兩生薑一兩大棗五枚右七味。以水五升。

先煮麻黃一二沸。去上沫。納諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。日再服。一本云桂枝湯二升。麻黃湯一升。

合為三升。分再服。

服桂枝湯。大汗出。脈洪大者。汗雖出而邪未盡。與桂枝湯如前法。此所謂邪不盡。若形如瘧。日再發者。汗出必解。

桂枝二麻黃一湯主之。此與麻黃桂枝各半湯意略同。但此因

桂枝二越婢一湯十三
桂枝湯加麻黃石羔二味

易寒命頭方

桂枝湯

三



約大學圖書館藏

桂枝 去皮

芍藥

甘草

麻黃 去節各

十八枚

大棗 四枚

生薑 二兩

石炭 二十四兩

碎綿裏

麻黃 六兩

甘草 二兩

右七味以水五升

煮麻黃一二沸去上沫

納諸藥

煮取二升

去渣溫服一升

附越婢方

麻黃 六兩

甘草 二兩

右七味以水五升

美半劑

生薑 三兩

大棗 十五枚

太陽病發熱惡寒

熱多寒少

脈微弱者

此無陽也

不可更汗

此無陽與亡陽不同

並與他處之陽虛亦別

而脈微弱若發其汗必至有又手冒心悸等症故以此湯清疎榮衛合得似汗而解況熱多身有寒熱

在氣分尤與石炭為宜

古聖用藥之審如此

按以上三方所謂一二各半之說照方計實並不對準未

此亦一法也云將本方各藥或一分或二分相和考存

桂枝去桂加茯苓白朮湯

十四

芍藥 三兩

甘草 二兩

生薑

茯苓

白朮 各三兩

大棗 十二枚

右六味以水八升煮取三升去滓溫

服一升

小便利則愈

此方專於利小便也

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者此湯主之

在也以其無汗則不宜更用桂枝心下滿則用白朮小便不利則用茯苓此症乃亡津液而有停飲者也

凡方中有加減法皆佐使之藥若去其君藥則另立方名今去桂枝而仍以桂枝為名所不可解殆以此方雖去桂枝而意

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

十五

桂枝湯原方

去芍藥

加蜀漆

龍骨 三兩

洗牡蠣 五兩

龍骨 四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升

納諸藥

煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

十六

桂枝 二兩

甘草 二兩

龍骨 二兩

牡蠣 二兩

右四味以水一斗二升先煮桂枝甘草減一升

後加龍骨牡蠣煮取三升

去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

以火劫其起卧不安者此湯主之

此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各

有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝去皮甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩右四味以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

脈浮宜以汗解之總訣用灸灸之治邪無從出因火而盛火入內病從腰以下必重而痹名火逆也

則陰氣獨治於火逆下之又誤因燒針煩躁者更誤治下之虛其陰燒針又益桂枝甘草龍骨牡蠣湯

下故重而痹火逆下之又誤因燒針煩躁者更誤治下之虛其陰燒針又益桂枝甘草龍骨牡蠣湯

主之鎮其陰氣散其火邪上下同治前方驚狂治重在心故

桂枝加葛根湯十七有麻黃則為葛根湯矣

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫納

諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強八八反汗出惡風者八八仲頸之象邪氣漸深故加葛根桂枝加葛根湯主之

桂枝加芍藥湯十八

桂枝湯原方芍藥加一倍右五味以水七升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九此二方俱治太陰症而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

本大陽病醫反下之誤因而腹滿時痛屬太陰也引邪入於太陰故桂枝加芍藥湯主之雖見太陰症而未

罷故仍用桂枝湯只加芍藥大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加大黃湯主之此因

藥一倍以斂太陰之症加芍藥大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加大黃湯主之此因

而見太陰之症太陰之症加芍藥大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加大黃湯主之此因

不盡然按活人書云桂枝湯自西北人云時行之無不應驗江淮間惟冬及春可行之春未及夏至以

前桂枝症一兩或加黃升麻一分若病人素虛寒者不必加減

麻黃湯類二

麻黃湯

桂枝湯

麻黃湯



麻黃三兩 去節 桂枝二兩 甘草炙 杏仁七十個 去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升此須多煮取其力

止者一 去上沫 納諸藥 煮取二升半 去滓 溫服八合 覆取微似汗 不須啜粥 以其易發汗也 餘如桂枝將息法

活人書云夏至後用麻黃湯量加知母石 蒸黃芩蓋麻黃性熱恐有發黃斑出之慮

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛此痛處比桂枝症尤多而 惡風無汗而喘者此二症乃肺氣不舒

仁治喘桂枝甘草治太陽諸症 無一味不發切所以謂之經方 太陽與陽明合病陽明之病象甚多如身熱不惡寒口苦鼻乾之類但

喘而胸滿者不可下上焦俱在 宜麻黃湯主之 喘而胸滿此麻黃症 太陽病十日以去經脈浮而

嗜臥者正漸 外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯 邪留少陽故與此湯脈但浮者與麻黃湯 若果邪在

帶弦今但浮則尚在太陽矣故仍 太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛此乃太陽傷寒的 劇者必衄衄乃解熱甚動血

證仍在表證即上 此當發其汗 宜麻 服藥宜微除其人發煩目瞑陽鬱而不 劇者必衄衄乃解熱甚動血

清道而出與汗從皮毛而洩同故熱邪亦解俗語所云 所以然者陽氣重故也風鬱固為熱寒鬱亦為熱

紅汗也經云陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄所以然者陽氣重故也風鬱固為熱寒鬱亦為熱

類麻黃湯主之此言未衄之前可用麻 脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯此脈浮而數者可發

汗宜麻黃湯數為陽非衄後更用麻黃湯 脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯此脈浮而數者可發

陽明病汗浮無汗而喘者無汗而喘則為麻黃湯症矣發汗則愈宜麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯二 加杏仁也 麻黃湯症矣發汗則愈宜麻黃湯

麻黃四兩 去節 杏仁五十個 甘草炙 石羔半助碎 右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥

煮取二升去滓溫服一升 發汗後不可更行桂枝湯既汗不可再汗 汗出而喘故汗出而喘無大熱者邪已可與此湯汗出故用

杏用麻 發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘此二句明致喘之所由蓋喘未必皆 下後不可更行桂枝

湯既下不可復汗若汗出而喘無大熱者可與此湯

大青龍湯

此合麻黃桂枝越婢三方為一方而無芍藥

麻黃

去節桂枝二兩甘草二兩杏仁四十枚生薑三兩大棗十二石膏碎如雞子

先煮麻黃減二升

去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗出多者溫粉撲之

不得眠也

溫粉方明理論載白虎膏本川芎白芷各等分入米粉和勻撲之無養本亦得後人用牡蠣麻黃根鉛粉龍骨亦可

汗出惡風者不可服

服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也惡風非身疼痛汗不出而煩躁者邪深大青龍湯主之若脈微弱

太陽中風脈浮緊

汗不易出發熱惡寒非身疼痛汗不出而煩躁者邪深大青龍湯主之若脈微弱

麻桂而用石羔何以致汗如是之烈

益麻黃湯麻黃用二兩而此方即垂此成聖人之意深矣按此方合

不足相制也

少陰篇云麻黃湯麻黃用二兩而此方即垂此成聖人之意深矣按此方合

陰陽俱反汗出者亡陽也

傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青龍湯主之

身有誤脈浮緩邪輕易散身不疼外邪已退

有輕時病未入陰又別無少陰等症此病之最輕者何必

必有誤脈浮緩邪輕易散身不疼外邪已退

有輕時病未入陰又別無少陰等症此病之最輕者何必

主方而誤以大青龍當之者也有

小青龍湯

麻黃

去節芍藥細辛乾薑甘草桂枝三兩五味子半飴半夏半升右八味以

水一斗先煮麻黃減二升

去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升若微利者去麻黃加薤花如雞

子大熬令赤色

利屬下焦陰分不可更發其陽花明理論作芫花恐誤本草芫花芫花若渴者去

半夏加括蕒根三兩

根主消渴若噎者汗大出得寒氣冷必相捕其人即餉乃按內經而少腹滿即

輕者去麻黃加附子一枚

子溫中若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩則小便不在此下矣



故用若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖杏仁見前按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源若汗無微不到真神劑也未盡必停於肺胃之間病屬有形非一味發散所能除此方

傷寒表不解發汗心下有水氣即未出乾嘔發熱而咳或渴或痢或噎或小便不利少腹滿或喘者傷寒心下有水氣欲而微喘發熱不渴者喘而不渴服湯已青龍

龍湯主之以上皆水停心下現症其傷寒心下有水氣欲而微喘發熱不渴者喘而不渴服湯已青龍

湯渴者此寒氣欲解也欲飲小青龍湯主之此例掌法即指服湯已三字非

麻黃附子細辛湯五

麻黃去節二兩細辛二兩附子一枚右三味先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升

少陰病始得之反發熱脈沉者此湯主之少陰病三字所該者廣必從少陰諸現症細審然後發

必俟其脈象之沉然後益知其為少陰無疑也凡審症皆當如此附子細辛為少陰溫經之藥發熱人又

之用麻黃者以其發熱則知陽未盡也凡審症皆當如此附子細辛為少陰溫經之藥發熱人又

陰始入之邪非麻黃不可況已有附子足以溫少陰之經矣

麻黃附子甘草湯六

麻黃去節二兩甘草二兩附子一枚右三味以水七升先煮麻黃一兩沸此當去上沫納諸藥煮取三升


去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗也三陰經惟少陰與太陽為

此解之理況二三日而無裏症則其邪未深入

葛根湯一

葛根四兩麻黃三兩芍藥二兩生薑三兩甘草二兩桂枝二兩大棗十二右七味以水一斗先煮麻



黃葛根

主藥先煮減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥已能發汗矣

餘如桂枝法將息及禁忌

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之前桂枝加葛根湯一條其現症亦同但彼云反汗出故無汗而惡風熱未全入陽明故曰太陽病按葛根本草治身無汗故加麻黃也陽明症汗出而惡熱今無汗而惡風全在下利一証也以太陽將入陽明之經故加此藥太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之也

合病全在下利一証也以太陽將入陽明之經故加此藥

出益風邪入胃則下利矣

葛根黃芩黃連湯

葛根 半觔 甘草 二兩 黃芩 三兩 黃連 三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去

渣分溫再服

太陽病桂枝症傷風之正病也醫反下之大利遂不止邪下陷則脉促者表未解也促有數意邪猶在外沈微等象故不用理中等法喘而汗出者此湯主之因表未解故用葛根因喘汗而利故用芩連之

葛根加半夏湯三葛根湯原方加半夏半斤先煎服法同

太陽與陽明合病不下利前條因下利而知太陽陽明合病今既不下利則合病何從而但嘔者葛根加

半夏湯主之前條太陽誤下而成利則陽明合病故用葛根湯全方因其但嘔故加半夏一味以止嘔隨病

立方各有法度

柴胡湯類四

小柴胡湯一

柴胡 半觔 黃芩 人參 甘草 炙 生薑 各三兩 半夏 半觔 大棗 十二枚 右七味以水一斗二升煮

取六升去渣再煎此又取三升溫服一升日三服此湯除大棗共二十八兩較今秤亦五兩六錢零雖

使經氣相融不復往來出入古聖不但用藥之妙其煎法俱有精義若胸中煩而不嘔者去半夏人參

葛根湯 柴胡湯

六



煩不可用人參夏加括萸實一枚括萸實除胸痺此若渴者去半夏即夏能燥痰濕加人參生津合前

成四兩半括萸根四兩治消若腹中痛者去黃芩寒加芍藥三兩除若脇中痞硬去大棗補脾

牡蠣四兩別錄云治熱若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩便利若不渴外有微熱去人參則津

足自加桂枝三兩留太熱則邪溫覆取微似汗愈若欬者去人參大棗二味與生薑如乾薑如五味子

半升乾薑二兩古方治嗽五味甘薑必同用一以散寒邪一以斂正氣從無單用五味治嗽之法後人

風火痰涎深入肺藏永難救療矣論凡可通熱之時必有加減法

傷寒五六日正當傳少中風往來寒熱寒往來者寒已而熱熱已而寒也胸脇苦滿胸脇為少默然不

欲飲食木邪心煩喜嘔木氣或胸中煩而不嘔或渴少陽或腹中痛木或脇下痞硬木氣或心下悸有

飲小便不利或不渴有蓄身有微熱少陽或欬者留飲此湯主之之症亦不一加減法具載方末血弱

氣盡腰理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默然不欲飲食藏府相連

其痛必下邪高痛下故使嘔也此條中明所以往來寒熱及不欲食下痛上嘔之故皆小柴胡湯主之

服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之湯服後見渴則屬陽明傷寒四五日身熱惡風頸項強

此是太陽陽所同脇下滿比則少手足溫而渴者滿則雖似陽明不作陽明治矣小柴胡湯主之傷寒陽脉濡陰

脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之詳見桂傷寒中風有柴胡症但見一證

便是不必悉具少陽與太陽陽明相為出入一凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡

湯凡誤治而本証未罷仍用本証可兼治矣必蒸蒸而振却發熱汗出而解邪已陷下故必振動而後能達於外

發戰發熱汗出邪傷寒十三日不解二候胸脇滿而嘔此少陽日晡所發潮熱此以已而微利症現裏

亦以此本柴胡症下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也丸藥利之是為重傷潮熱者

實也先宜小柴胡湯以解外雖潮熱本屬少陽之後以柴胡加芒硝湯主之解在後下傷寒五六日頭

出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結陽氣不能隨經而散故鬱結不舒非必

有表復有理也以上諸症有表有裡脈沈亦在裡也必沈者汗出為陽微以汗假令純陰結不得復有

外證陰則此為半在裡半在表也汗出為表脈雖沈緊細即有不得為少陰病所以然者陰不得有汗為此

要今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解得屎而解者其病愈故大

便之法即如芒硝及陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿而不去者小柴胡湯主之陽明潮熱必當

通小柴胡等方可則裏症未具又胸脇滿陽明病脇下硬滿少陽不大便下可而嘔亦少舌上白胎者於陽明結

故舌胎白雖不大便可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解也此四句申明陽明

不可下此要訣也陽者有兼陽明者內中見也按少陽之外為太陽裏為陽明而少陽居其間故少陽之症有兼太陽陽明中

風脈弦浮大弦屬少陽浮屬陽明而短氣腹都滿脇下及心痛陽症久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥此症又一

身面目悉黃小便難此二症又有潮熱此似耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴

胡湯脈浮雖有裏症但浮無餘症者與麻黃湯但浮無餘症則裏症全無必從汗解故用麻黃湯

麻黃總以脈症為若不尿膀胱氣絕腹滿加噦者不治論中真陽明篇云陽明病之症有裏邪用小柴胡無裏邪則用

嘔大下泄出也傳經復與之水其聲噦乃肺胃得噦靈樞云真邪相攻也虛冷相逆故為明益微熱欲盡也又云然者

少陽者之邪也脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱陽本症尚未吐下脈沉緊者未吐下漸入裏故治不

浮而沈緊則強之與小柴胡湯嘔而發熱者小柴胡湯主之但發熱而非往來寒熱則與太陽湯太

陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯解見麻

傷寒差以後更發熱者小柴胡主之之復症也非勞復非女勞復乃正氣不充餘邪未盡留在半表半裡

傷寒論類方 柴胡湯 七

脉浮者以汗解之脉沉實者以下解之復症之中更當考此二脉如果脉見浮象則邪留太陽當用汗法
之法不一醫者於麻黃桂枝及承氣大柴胡見沈實則裏邪未盡當用下法但汗下不著方名者因汗下
等方對症之輕重擇而用之則無不中病矣婦人中風七八日續得寒熱發作有時謂如瘧也

適斷者此為熱入血室其血未結血因熱結而成瘀矣故使如瘧狀發作有時小柴胡主之即治瘧也
云婦人中風發熱惡寒經水適來彼云來得之七八日熱除而脉邊身涼由伏胸脇下滿如結胸狀

者此為熱入血室也血室為中焦榮氣之所聚肝藏血心主血榮血結
形之症湯劑一時難效刺期門以瀉陰經之氣亦凝故脇滿而神昏譫語當刺期門隨其實而瀉之期門在
二肋端去乳頭約四寸肝募也厥陰經之會刺入四分血結則易散又云婦人傷寒發熱經水適來

書日明了暮則識語如見鬼狀者此為熱入血室屬陰病在陰經也無犯胃氣及上二焦必自愈此為
榮氣之疾汗下二法皆非所宜小柴胡湯刺期門則其治也按熱入血室之

大柴胡湯二小柴胡湯二大柴胡湯二小柴胡湯二
柴胡半斤 半夏半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 生薑五兩 枳實四枚 大棗十二枚 右七味以水一斗二升
煮取六升再煎取三升溫服一升日三服此方本有大黃二兩王叔和云若不加大黃恐不為大柴

胡也太陽病過經十餘日反二三下之一再誤後二三日柴胡症仍在者如寒熱嘔先與小柴胡湯嘔
不止心下急鬱鬱微煩者真証有為未解也與大柴胡湯下之則愈前雖已下非下法也傷寒十餘日

熱結在裡此大黃復往來寒熱之對症與大柴胡湯傷寒發熱汗出不解柴胡心中痞硬嘔吐而下痢
者邪內陷故用枳此湯主之傷寒後後者過經之後諸症脈沈沈者內實也沈為下解之宜大柴胡湯

柴胡加桂枝湯三此小柴胡與桂枝湯併為一方
柴胡四兩 黃芩二兩 人參桂枝芍藥生薑各一兩半 半夏二合 甘草一兩 大棗六枚 右九味

水七升煮取三升去渣溫服一升

傷寒六七日發熱微惡寒支節疼痛煩以上太陽症微嘔心下支結以上少陽症外症未去者太陽症柴胡桂枝湯主

之發汗多亡陽譫語者此亡陽之輕者也不可下勿誤以為有燥屎與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自

愈桂枝湯和榮衛柴胡湯通津液深著二湯合用之功效而陽亡可復矣

柴胡加龍骨牡蠣湯四

柴胡 龍骨

生薑

人參

茯苓

鉛丹

黃芩

牡蠣

桂枝

芍藥

半夏二合 大棗六枚 大黃二兩

右十二味以水八升煮取四升納大黃更煮一二沸

大黃更煮一二沸大黃只煮其生

而流去滓溫服一升

傷寒八九日下之即陷胸滿

柴胡煩驚龍骨鉛丹小便不利茯苓譫語大一身盡重不能轉側者茯苓此湯主之

此乃正氣虛耗已入裏而復外擾三陽故現症錯雜藥亦隨症施治

柴胡桂枝乾薑湯五

柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑

牡蠣熬 甘草各二兩 黃芩三兩 枳實二兩 芍藥二兩 右七味以水一斗二升煮

取六升去渣再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈邪氣已深一時不能即出如蒸

傷寒五六日已發汗而復下之一誤胸脇滿用柴微結小便不利渴以上皆少陽症而不嘔故去半但頭

汗出陽氣上逆往來寒熱用柴心下煩者黃芩此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

柴胡加芒硝湯六

柴胡二兩 黃芩二兩 甘草炙 人參各一兩 生薑各一兩 半夏二兩 大棗四枚 芒硝二兩 右八味以

水四升煮取二升去渣納芒硝更煮微沸分溫再服不解更作今秤計之約二兩分二服則一服止一

兩耳按大柴胡湯加大黃枳實乃合用小承氣也此加芒硝乃合用調胃承氣也皆少陽陽明同治之方

柴胡湯



傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之本草芒硝治之積聚所謂通因通用之法也潮熱而利則邪不停結故較之大柴胡症用藥稍輕

梔子湯類五

梔子豉湯一

梔子十四香豉四合

右二味水四升先煮梔子得二升半納豉煮取升半去滓分為二服溫進一

服得吐止後服此劑分兩最小凡

發汗吐下後諸法俱用未必皆然虛煩不得眠虛為正氣虛煩為邪氣投發汗吐下實邪雖去而其餘者必反覆顛倒心中懊憹反覆顛倒身不得安也梔子豉湯吐之氣無不出矣按汗吐下之而病不結

者必反覆顛倒心中懊憹反覆顛倒身不得安也梔子豉湯吐之氣無不出矣按汗吐下之而病不結

盡則不在經而在肺胃之間為有形之物故必吐而出之反覆顛倒心中懊憹摩發汗若下之而煩熱胸

中室者煩熱且室較前虛梔子豉湯主之傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者欲未解也

外內之邪俱未解梔子豉湯主之按胸中室結痛何以不用瀉心諸法蓋瀉心症乃心下諸法症為無形痛

結痛更甚於室矣梔子豉湯主之陽明病脉浮而緊咽燥口苦胸滿而喘發熱汗出不惡寒反惡

熱身重非因誤治而得者若發汗則躁心憤憤反譫語汗多若加燒針必怵惕煩躁不得眠即前以火逼

之意若下之則胃中空虛客氣動脇心中懊憹故病不解有熱未盡手足溫不結胸實心中懊憹饑不能

食結無物可吐也梔子豉湯主之陽明病下之其外有熱未盡手足溫不結胸實心中懊憹饑不能

停結但頭汗出欲洩不洩梔子豉湯主之下利後更煩按之心下濡者非室非痛也為虛煩也宜

梔子豉湯

