



丹溪心法

卷四



丹溪心法卷之四

痿五十六

新安吳勉學校

○痿病斷不可作風治而用風藥

有濕熱

濕痿

氣虛

血虛

瘀血

濕熱

東垣健步丸

加燥

濕降

陰火

蒼朮

黃芩

黃柏

牛膝

之類

濕痿二陳湯加蒼

朮

白朮

黃芩

黃柏

竹瀝

姜汁

氣虛四君子湯加黃

芩

黃柏

蒼朮

之類

血虛四物湯加黃

柏

蒼朮

補陰丸

亦有食積死血

妨碍不得下降者

大率屬

熱

用參

米四物湯黃柏之類

熱

用參

米四物湯

黃柏之類

熱

用參

米四物湯黃柏之類



附錄謹按五癆等証特立篇目所論致詳後代諸
方獨於此証蓋多缺略攷其由皆因混入中風條
內故也丹溪先生痛千古之弊憫世之罹此疾者
多誤于庸醫之手有忘之士必當究其心源決陳
無澤謂癆因內藏不足所致誠得之矣然癆之所
不足乃陰血也而方悉是補陽補氣之劑寧免實
實虛虛之患乎且無擇以三因立方可謂諸方之
冠其餘此証尤且未明況求於他者乎

附方

健步丸

東垣方

酒洗

羌活

柴胡

滑石

甘草炙

瓜蒌根

酒洗以上各半

澤瀉

防風各二

苦參

酒洗

川烏

各一肉桂五

右為末酒糊為丸梧桐子大每服七十九粒白煎

愈風湯下

見中風類

補陰丸

見諸虛類

清燥湯

治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒

水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下

痿軟癱瘓不能動

黃芪

一不五分

蒼朮一不

白朮

橘皮

澤瀉

各半

人參

白茯苓

升麻

各三



麥門冬

歸身

生下曲末

猪苓各二分

酒栢

柴胡黃連

五味子九箇

甘草炙二分

右每服半兩水煎空心服

厥五十七

附手足十指麻木

○厥逆也手足因血氣逆而冷也因氣虛為主

有因血虛氣虛脉細血虛脉大熱厥脉數

外感脉沉實有疫脉弦因疫者用白朮竹瀝

氣虛四君子血虛四物熱厥用承氣外感用

雙解散加姜汁酒有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰



於下膿或下血大脹有虛火加人參益氣湯

○手足麻者屬氣虛手足木者有濕痿死血

指麻木是胃中有濕痿死血

得錄厥者甚也短也逆也手足逆冷也其証不

散之方書者甚多今姑撮大概且如寒熱厥逆者

則為陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則

發厥也不可作陰証而用熱藥治之精魂絕而死

矣思宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者

始得之身冷脉沉四肢逆足踡臥唇口青或自利

不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之輩



中医药大学图书馆版文所有

仍速灸關元百壯。又尸厥飛尸卒厥此即中惡
以得因冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起
頭面青黃色神不守或錯言妄語牙緊口噤或昏
不知人頭旋暈倒此是卒厥客忤飛尸鬼擊而延
問喪入廟登塚多有此病以蘇合丸灌之候稍甦
以調氣散和平胃散服名調氣平胃散。疫厥者
有寒痰迷悶四肢逆冷宜姜附湯以生附湯以生
附代熱附。虻厥者乃胃寒所生經曰虻若長蟲
也胃中冷即吐虻蟲宜理中湯加炒川椒五粒檳
榔山查青皮。
香附湯干姜
川芎
藜蘆白水下

者與中風相似何以別之風中是溫氣中身冷以
八味順氣散或調氣散如有痰以四知湯導痰湯
服之

附方 八味順氣散 見中風類
調氣散

白豆蔻

丁香

檀香

木香 各二

藿香

甘草 炙 各

砂仁

四不

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

平胃散

蒼朮

升浸 五斤

厚朴

姜制

陳皮

各三

甘草

炒二



南京中医药大学图书馆藏

右為末每服五錢姜三片棗一個煎服入鹽一匙
沸湯點服亦得

四七湯

厚朴 二兩

茯苓 四兩

半夏五兩 紫蘇二兩

右每服四錢水一鍾姜七片棗一個煎服

承氣湯 痢類

四逆湯 理中湯

姜附湯 並見中寒類

烏梅丸 見心痛類

道痰湯 見痰類

瘕五十八



○瘥切不可作風治兼用風藥大率與癰病相
比癰為甚為虛宜帶補多是氣虛有火兼瘥宜用
人參竹瀝之類

附錄古方風瘥曰瘥也經云諸瘥項強皆屬於濕
土是太陽傷濕也又云諸暴強直皆屬於風是陽
明內鬱而陰行於外又曰陽瘥曰剛無汗陰瘥曰
柔有汗亢則害承乃制故濕濕過極反兼風化制之
然兼化者虛象實非風也

附方

葛根湯

治瘥病無汗而小便少反惡寒者名剛瘥



葛根 四錢

麻黃 三錢

桂枝 二錢 芍藥 二錢

甘草 三錢 炙

右咬咀水二鍾生姜三片棗一枚煎服覆取微汗

桂枝加葛根湯

治瘧病有汗不惡寒者服之此名

柔瘧

葛根 四錢

生姜 三錢

桂枝

芍藥

甘草 二錢 炙

右作一服水二鍾棗一箇煎服 二瘧皆可用小

續命湯加減服若胸滿口噤咬齒脚攣卧不着床

者以大承氣湯下之無疑矣



小續命湯見中屬類

大承氣湯見痢類

痢五十九

○驚與疫宜吐

大率行疫為主、用黃連南星瓜蒌

半夏尋火尋疫、分多分少治之、無不愈者

分疫

熱、有熱者以涼藥清其心、有疫者必用吐藥吐

後用東垣安神丸

大法宜吐、吐後用平肝之劑、青

蜜藥胡川芎之類、龍會丸正宜服之

且如痢因驚

而得驚、則神不守舍、會空而疫聚也

戴云痢者俗曰猪癩風者是也



中医药大学图书馆版

附錄癰症有五、馬牛雞猪羊、且如馬癰、張口搖頭、馬鳴、牛癰、目正直視、腹脹、雞癰、搖頭、反折、喜驚、羊癰、喜揚目、吐舌、猪癰、喜吐沫、以其病狀偶類之耳、非無疫涎壅塞、迷悶、孔竅發、則頭旋顛倒、手足搐搦、口眼相引、胃背強直、叫吼吐沫、食頃乃甦、宜星香散加全蝎三箇。

附方

續命湯

主癰發頓悶無知、口吐沫、出四體、角弓反

張、目反上、口噤不得言

竹瀝二合

生薑汁一升

龍齒末

生薑

防風

麻黃

去節各兩

防已

附子

炮各二兩

石膏

桂

二兩

右十味水一斗煎取三升分三服有氣加紫蘇梗皮各半兩

○但小兒癰千金有風食驚三種本事方又有陰

陽癰慢脾風三証慢脾即食癰宜醒脾丸人參散

古方三癰丸

治小兒百二十種驚癰

荊芥穗

二兩

白礬

生半兩

右為末麪糊為丸黍米大朱砂為衣姜湯下二十

丸如慢驚用來復丹烏驚三癰丸食癰醒脾丸可



北京中医药大学图书馆藏

也

本事人參散

治慢脾風神昏痰盛

人參 半兩

圓白大南星

一兩切片以生薑各半湯浸者帶性

煎水

右為末每服一錢水一盞姜三片冬瓜

搗碎

許同煎取半盞作兩三次灌下

寧神丹

清熱養氣血不時潮作者可服

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

茯神

荊芥

僵蠶

獨活

遠志 去心

犀角

麥門冬 吟

酸棗仁 炒

長砂

各半兩

半夏

南星



石膏各一

甘草炙

白附子

川芎

鬱金

牛黃各三錢

珍珠三錢生玢

黃連各半兩

金箔三十片

右為末酒糊丸空心服五十九白湯下

東垣安神丸

黃連

一分酒洗

朱砂一分水飛

酒生玢

歸身

炙甘草

各五分

右除朱砂水飛外四味搗為末和勻湯浸蒸餅丸

如黍米大每服十五丸食後津燕下

星香散

見中風類



東京中医药大学图书馆版权所

顛狂六十

○顛屬陰、狂屬陽、顛多喜而狂多怒、脈虛者可滋、實則死、大率多因痰結於心胸間、治當鎮心神、開痰結、亦有中邪而成此疾者、則以治邪法治之、原病或寒、論尤精、蓋為世所謂重陰者顛、重陽者狂是也、大概
是熱、顛者神不守舍、狂言如有所見、經年不愈、心
經有損、是為真病、如心經蓄熱、當清心除熱、如痰迷
心竅、當下痰寧志、若顛哭呻吟、為邪所憑、非狂也、燒
蠶、昏酒水下方寸匕、卒狂言鬼語、針大指甲下
即止、風顛引脇痛、發則耳鳴、用天門冬去心、日乾