

广东省农作物优良品种志

(初 稿)

第一部 稻谷(下)

广东省农业科学院 编著

目 录

(下 册)

籼稻品种

晚造

中熟种

新西洋14号	350
清水莲12号	351
一粒赤	352
一粒种	353
三線粘	354
三枝香	355
正铁禾	356
雁鹅抱	357
火烧占	358
马尾占	359
仙游本	360
江洲占	361
广西白	363
三百粒	364
三苗青	365
齐臻	366
细只糯托	366
黄骨占	367
大山王	368
大糯筒	369
中脚油粘	369
红米油粘	370
红	370
新头汕	371
45	

汕头矮	373
鹤仔矮	374
潮阳种	375
矮仔种	376
南东种	376
冬白	377
白米搓	378
独枝种	378
薏米种	379
白米掙	379
赤米掙	380
郑白	381
黄壳江占	382
大黄占	382
飞来占	384
黄壳齐眉	385
白壳齐眉	386
雪谷	386
迁罗种	387
大粒油占	388
铁谷	388
叉仔	389
黄禾子	390
缘苗伍	391
高谷	391
翻造白占	392
大炮占	392
大白占	393

野谷	393	养种	409
白壳青占	394	崩岗粘	410
南玉	395	横衣子	410
• 滋占	395	矮芥子	411
油占赤	396	花罗锡	411
阳江白	396	白锡	412
山佬占	397	江西海禾	412
新矮种	397	汤坑粘	413
竹竿岭	398	散尾种	413
稔种	398	白富	414
被空烧	399	美湖粘	414
咸草矮	399	大冬赤	415
老隆蓬	400	广南赤	415
新隆蓬	400	蚊公赤	416
矮学老	401	红咀筒	416
高学老	401	白粘仔	417
赤壳烏沟	402	大抵麦	417
白壳烏沟	402	迁罗红	418
金仔	403	十月红	419
大肚白	403	硬颈红	419
松埠	404	白壳赤	420
赤壳仔	404	鵬鵠球	420
矮脚白	405	芒徒占	421
青枝种	405	沙占	421
黄企	406	小秋箕	422
芋河种	406	白壳起	422
洪山种	406	海口占	423
揭阳矮	407	黑溪占	423
龙眼梗	407	十月鸡占	424
红脚招財	408	潮占	424
• 一粒种	408	内占顏	425
柏黄种	409	• 普宁粘	425
乌种	409	红粘	426

排粘湖	426	冇合眼	457
白米米视	427	赤叶仔	458
红米米视	427	绞盘矮	460
米妹白	427	解放种	461
黄南粘	428	海水一	462
广西粘	428	芋头种	464
浸挑	429	烏帽竹占	465
崖州种	429	金山占	465
临高种	430	智合种	466
增城矮脚紫苗	430	胖梗占	467
粒度	431	跌占	468
中迟熟种	432	水尾赤	469
澄秋5号	432	三斤落	470
塘埔矮	434	博中32号	470
白壳矮	436	淡水2号	471
十石歉	437	石拉种	472
溪南矮	439	烏粘	473
华南15号	441	猫毛矮	474
竹槌11号	442	大黃占	474
石脚种	443	冷水占	475
秋收3号	444	塔洋1号	476
木泉种	446	红壳占	477
新西林	447	阿咽种	478
大刚粘	448	藕坑	478
秋布了	450	美丽红	479
青霄大穗	451	金竹17号	480
短种	452	大线占	481
跌勾矮	453	叶包黄	481
赤种	453	大雪占	482
恶打占	454	红占	483
硬颈牛	455	团结占	484
哈哈	456	黄占仔	485
		迟水占	485

金包银	486	占仔	504
洋参种	486	• 红虎安南占	505
红种	487	• 水钻	506
大海鸟	487	金边仔	507
溪旁种	488	阿姆兰	508
青种	488	• 水苗	508
• 三枝香	489	青占	509
青稗粘	489	赤锡	510
十月青	490		
白壳	491	迟熟种	510
过路优	491	• 大板粘	510
矮脚仔	492	咸雪9号	511
细黄谷	492	养儿种	513
• 嫩枝齐糠	493	高迁罗	514
红脚三粘	493	矮迁罗	515
白谷	494	黑唇迁罗	516
水推黄	495	青梗兰	517
勤推	495	玉绣球	518
青占	496	• 马尾芥	520
细救水占	497	矮卷只	520
野禾	497	石山占	521
白米广占	498	芒国占	522
门教路	498	须谷	523
郭压占	499	√ 冬石燕	523
白壳占	500	• 大金凤	524
• 白米小秋其	500	淡水1号	525
• 红米大秋其	501	夹生稻	526
红米小秋其	501	留子	527
海种	502	蚊公扑	528
番种	502	暗衣仔	528
狗姆占	502	红幼谷	529
铁稗占	503	大嘴占	530
黑粘	503	大白谷	530

白谷仔	530
青枝仔	531
烏辽种	531
半须子	532
坡头种	532
骨岱种	533
糯托	533
吊死鸡	533
榔子	534
白壳三斤种	534
矮脚粘	535
赤坎种	535
大累种	536
白壳红水咧	536

特殊种

长毛	537
深水莲	538
大袍	539
深水莲	540
浅水莲	541
白稻	542
生苏	543
千孙种	544
赤水牛	545
雪占	545
大雪	546
耘铎	546
赤谷	547
咸穗	548
咸占	548
金刚雪	549
黄壳金凤	550

白壳金凤	551
寒公	552
松柏雷	552
深田赤	553
愤仔	553

粳稻品种

早造	555
早熟种	555
陆羽132	555
农林16号	557
北陆12号	558
卫国种	559

迟熟种

嘉南2号	561
高雄10号	563
新竹8号	564
连江密早	566
台中育31号	568
台中育43号	569
台中育153号	569
台中65号	570
日本粳	572
始兴白粳	573
始兴黄粳	573

中造

中熟种	574
青化粳	574
始兴黄壳粳	575
红粳	576

白粳 576
五山粳 577

迟熟种 578

布骨 578

布丁 579

黄谷 580

大赤白 581

粳谷 581

香禾子 582

赤壳禾子 583

大青粳 584

红须香粳 584

晚造 585

迟熟种 585

始兴白壳粳 585

攸攸粳 586

黑节粳 587

番禾子 587

金葫芦 588

粳稻品种

早造 591

早熟种 591

早粳 591

红壳粳 591

中熟种 592

花壳粳 592

白壳粳 592

贵阳粳 593

广东粳 593

早大粳 594

马尾粳 595

甲考 595

早大粳 596

门教叶 596

迟熟种 597

猪油粳 597

六月粳 598

桐仔粳 599

过秋粳 599

白壳粳 600

红梗粳 601

青梗粳 601

瘦田粳 602

三酸粳 602

红糯米 603

元芒田粳 603

番禾粳 604

高渠粳 604

鸡油粳 605

南京花粳 605

早禾粳 606

冬福粳 606

中造 607

早熟种 607

一年粳 607

中熟种 608

白壳大粳 608

大禾粳 609

迟熟种	609
迟大禾粘	609
白壳大冬粘	610
黄壳大粘	611
香粘	611

晚造 612

早熟种 612

细粘	612
黑壳粘	613
油粘粘	613
麻粘	614
虎尾粘	615
赤壳粘	615
晒降粘	616
白壳粘	616
石壁粘	617
白米粘	617

中熟种 618

麻拜粘	618
勾粘粘	619
荔枝粘	620
排蜂粘	620
棉花粘	621
大粘	622
大冬粘	623
黄粘	623
花壳粘	624
红粘	625
猫牙粘	625
黄壳粘	626

南风粘	626
大黄粘	627
荻苗粘	628
龙仔粘	628
粘仔粘	629
秋其粘	629
迈仔粘	630
海北占粘	630
冬白粘	631
海禾粘	631
黄粘	632

迟熟种 632

禾圃粘	632
黄壳粘	633
大粘	634
牛尾粘	635
红脚粘	636
坦头粘	636
大黄粘	637
红咀粘	638
大粘	638
乌壳粘	639
光头粘	639
大粘	640
门敢温	641
门敢乙	641
印任保	642
印能	642
甲参裕	643
甲哈	643
巷粘	644
门敢澄	644

水鬼粘	645
关刀粘	645
深水粘	646
坦粘	646

陆稻品种

早造	647
早熟种(粘稻)	647
矮脚坡禾	647
黑铁仔	648
坡犁	648
长身坡禾	649
红壳仔	650
山禾赤	650

早熟种(粘稻)	651
山禾粘	651
黄禾粘	652

中熟种(粘稻)	652
坡蕾	652

中造	653
早熟种(粘稻)	653
早坡省	653
白水理	654
木头占	654
核禾	655
八月白	655

中熟种(粘稻)	656
大坡禾	656

山禾白	657
-----	-----

中熟种(粘稻)	657
山禾粘	657
山猪粘	658
里丝粘	659
山兰排蜂粘	659

迟熟种(粘稻)	660
打石粘	660

迟熟种(粳稻)	660
地禾黑	660

迟熟种(粘稻)	661
斧头粘	661
芭蕉粘	662
花连粘	662
迟耳禾粘	663

晚造	663
早熟种	663

早禾	663
陵新占	664
白壳坡占	665
红壳坡占	665
秀均	666
苗乾	666
白坡庄	666

中熟种	667
红壳压子	667
坡滴	667

花粘	668
芳粘粘	668
门敢妹	669
厚皮茄	669
门敢倍	670
短芒白水坂禾	670
芭蕉山	670
门敢拉	671
青藕山	671
白壳占	671
迟熟种	672
山兰大米	672
山兰小米	672

坡光	673
门敢郭	673
安南早稻	674
门敢开顺	674
灰屏识	675
红壳香豕	675
粘子稻	675
门些	676
门敢细艾	676
门敢献	677
门敢鸡	677
牛皮刈	677
黑壳香豕	678

晚 造

中 熟 种

新西洋14号

来源与分佈：“新西洋14号”是1950年汕头专区仙河试验站从“西洋种”中单穗选育出来的。1952年开始在梅县农场进行区域化试验，试种结果比当地的“学老禾”增产10—15%。1953年兴梅地区各县表证试种，1954—1955年开始大面积推广。同时，揭阳、潮安等县亦大面积种植。现汕头专区种植面积约6万多亩。1956年佛山专区番禺、东莞等县引进试种，亦表现良好，受到群众欢迎。因而迅速扩大种植面积达30,000亩。1957年湛江专区钦县又引进试种，也表现良好。1959年已推广种植到1500多亩。到目前为止，全省有70,000多亩。一般产量450—600斤。1959年连平县大湖公社1.89亩，平均亩产1,050斤。但是该品种稈高，不够耐肥，加上该种类型杂，抽穗成熟不够整齐，因此种植面积将有逐渐缩减趋势。

特征：“新西洋14号”生势强，株高122.9厘米，茎秆粗壮，散生，叶色深绿，剑叶长35厘米、宽1.02厘米，抽穗成熟不整齐，穗形弯曲，穗颈粗短，穗长24.73厘米，穗枝数平均11.6，每穗平均80粒左右，最多145粒，着粒较密，不实率7%，谷粒长椭圆形，稈黄色，千粒重23.5克，腹白中小，米质中上。

特性：“新西洋14号”在汕头专区一般在小满、芒种播种，大暑前后移植，寒露前后抽穗，立冬前后成熟。本田生育日数110多天，全生育期160多天；湛江专区于芒种播种，霜降后成熟，本田生育期105天，全生育期135天。分蘖力中等，不

较耐肥，比“十石歉”、“塘埔矮”、“澄秋5号”等较易倒伏。抗病虫害力较强。抗落粒性中，结实粒较多，产量稳定。适应山区及半山区中等肥田种植。

栽培特点：

1. 秆较高，后期遇大风易倒伏，要注意合理施肥和排灌水，增强抗倒伏能力。
2. 选择排水方便，半山区的中等肥田种植。
3. 类型复杂，今后应加强选种工作。

清水莲12号

来源与分佈：原产于信宜县，1951年由省农业试验场引进海南农业试验站试种。1954年分佈各县表试试验，普遍比当地中熟品种增产13—15%。几年来逐步推广，海南岛各县种植面积达20多万亩。集中在海南岛东部地区较多。一般可产350—500斤。1956—1957年海南农业试验站试验，结果亩产534—639斤，最高产量达745斤，得到农民群众的好评。

特征：生势强，茎秆粗壮，秆高124.8厘米，叶比长，稍宽，色青绿。穗长19.65厘米，每穗80.78粒，不实粒10.43%，千粒重23.73克。谷粒黄色，椭圆形，无芒，米白色，米质中等，糙米率70%—75%。

特性：在海南地区种植5月下旬播种，7月中旬移植，9月下旬抽穗开花，10月下旬成熟，全生长期140天左右。分蘖中等，抽穗整齐，抗落粒性中等，耐旱性中等，不耐酸、碱，抗病虫害较强，耐肥力中等，抗倒伏性不强。在深肥田种植，排灌不利的条件下易倒伏。适宜山坑田、洞田、中等肥沃的田土种植。

栽培特点：

1. 不宜栽培在酸、碱性强的田土，培育旱秧比较水秧好，播种期在5月上、中旬比较适宜，秧龄35—40天。
2. 种植在中等肥的沙壤土、壤土比较好，本田应施足基肥，不能偏重施氮肥，应合理施用氮肥，促进根群生长发达。

一粒赤

来源与分佈：“一粒赤”又名“一粒种”，原产英德县农家品种，已有几十年的历史。1956年整理地方品种时评为良种，现分佈韶关专区的连州、阳山、乐昌、韶关、连平、清远、河源等县，栽培面积有20多万亩，产量高而稳定。一般亩产400—500斤。1959年韶关市郊马坝公社阳岗大队290.3亩70%种植“一粒赤”，平均亩产600多斤。粤北山区的连州市青莲公社中山大队1.06亩，平均亩产1,150斤。连平县东山公社种植比当地“三枝香”增产20%以上。又如河源东浦公社古闻大队10多亩，平均亩产680斤。在粤北各县颇受群众欢迎。

特征：生势强，根系发达，根系分佈达30—40厘米，分蘖力中等，茎秆粗壮，株高133厘米，叶片细长，剑叶较宽直，穗形弯集，穗颈短，穗长一般23—26厘米，穗枝较多，着粒较密，每穗约90多粒，多的有350粒，谷形椭圆，谷色淡黄，部分有短芒，千粒重24.2克，米质红色，碾米后成为白色，米质中上。

特性：韶关地区6月17日播种，7月30日移植，9月31日抽穗，11月7日成熟，本田生育期100天，全生育期150天，颇耐肥，不易倒伏，虫害为害少，耐旱力强，但易感梁稻热病，在出穗的时候禾穗不能完全抽出剑叶鞘，不实数颇多，落粒性中等，适宜于平原瘠瘦肥田种植。

栽培特点:

1. 经常注意稻热病的发生, 做好预防工作。
2. 施足基肥, 移植后要多次分期施用追肥, 特别要注意壮尾期的施用, 促进抽穗时水穗全部抽出叶鞘减少穗基部不实粒。
3. 根系发达, 必须配合深耕多肥产量才高。

一粒种

来源与分佈: “一粒种”是江门专区的农家品种, 由于分蘖力特别强, 一粒谷分蘖 20—30 余, 故名“一粒种”。1956 年该区推广面积已达 50 万亩, 占该区水稻总面积的 17%。一般亩产约 500 多斤, 产量稳定, 但比不上“塘埔矮”、“澄秋五号”品种。近年面积已大大减少, 德封、高要、新兴、罗定等县保苗了 135000 亩。汕头专区大埔和湛江专区电白等县亦少量栽培共 682 亩, 一般产量 400—500 斤。1959 年高要县新桥公社科德大队种植 11 亩, 平均亩产约 560 斤。在大埔县产量还算高, 亩产 760 多斤。在一部分地区还有保苗和推广价值。

特征: 株高中等, 约 115 厘米, 叶硬直, 叶色青绿, 穗形弯曲, 穗长 18—20 厘米, 穗枝分散, 着粒疏, 每穗 70 粒, 多的 100 粒, 谷形细长, 呈黄色, 千粒重 21.5—22.7 克, 糙米率 73%, 米质上等, 经济价值颇高。

特性: 江门地区一般小满播种, 小暑后移植, 秋分前 2 天抽穗, 霜降后 3 天成熟, 全生育期 14 多天, 分蘖力特别强, 一粒谷可分蘖 20—30 余, 比“广坊 15 号”要多 50% 以上, 抽穗成熟不齐, 适应性较广, 不论垌田、坑田、旱瘠田或肥沃田均可种植。

栽培特点:

1. 提早播种，培育老壮秧。
2. 基肥追肥并重，并注意施用穗肥和配合磷、钾肥，促进茎秆粗壮，防止倒伏。
3. 该品种栽培年代久远，品种已有混杂，抽穗成熟不齐，必须加强选种工作，进一步提高种性。
4. 分蘖力强，每科苗数宜少，加强管理，促进有效分蘖，便可保证一定穗数，提高产量。

三线粘

来源与分佈：“三线粘”又名“寸粘”、“无枕窝”、“还通债”、“坡罗粘”、“逢口粘”、“马尾粘”、“黄壳粘”、“串粘”等。是韶关专区英德县的农家品种，栽培历史悠久。在1956年整理地方品种时，评选为良种。分佈在韶关市、清远、河源等县，以英德县栽培面积最广，全区共有50000亩左右。适应性很广，在粤北山区、半山区都宜种植。一般亩产500斤以上。1958年至1959年出现亩产千斤的事例不少。如1959年清远县山塘公社种植“三线粘”的平均亩产960.3斤；英德县龙颈公社黄田大队种植1.17亩，平均亩产1,036斤；又据韶关市郊品种比较试验在85个品种中列第三位，亩产672斤，比标准叶大刚粘增产20.2%，但比不上密粒尾粘高产，是一个有推广前途的优良品种。

特征：株高125—135厘米，茎秆粗壮，根系发达深生。叶色浓绿，叶厚而硬直，穗形短集，似扫把形，穗颈短，穗枝数多，穗长23—27厘米，着粒较密，每穗平均80—100粒，结实率高，不实粒少，谷形细长，谷壳带黄褐色条纹，米质中，千粒重22克。

特性：在韶关专区，一般在6月上中旬播种，7月下旬移

植，9月下旬抽穗，11月初旬成熟，本田生育期97—103天。长势强，分蘖力中下，不易感染病虫害，颇耐旱，也较为耐浸。易落粒，耐肥，不易倒伏，适于塅田、梯田、山坑田种植。但以开阳的沙质土壤深秧深田产量较高。

栽培特点：

1. 宜早播早植，培育老壮秧，秧苗龄60—80天都适宜。根据各地经验，在谷雨播种，采用水播旱育，争取在小暑到大暑期间移植，一方面移植后死苗率少，植株生长健壮，一方面可提早成熟，避过寒露风。若在立秋后移植，则不太适宜。

为了培育健壮秧，延长本田生长期，粤北地区有采用寄秧的办法。据调查用寄秧的比不寄秧的穗长、粒多，一般亩产增加8—10%左右。

2. 这个品种分蘖力中，茎态直集，根系发达，适宜密植，每株30—35苗都不影响生长发育。

3. 注意选择优良类型，加以栽培繁育。

三枝香

来源与分佈：“三枝香”又名“过命发”、“白壳仔”是东江、北江一带的家品种。现主要分佈在韶关市、乐昌、英德、南雄、新丰、翁源、河源、龙川、连平、惠阳、从化、增城等县的山区及丘陵地区。栽培历史悠久，已有100多年以上。1959年初步统计全省栽培面积120,242亩。一般亩产400—500斤。1959年在韶关市董塘公社50亩，平均亩产600斤；河源县南口公社塘北大队最高亩产达920斤。

特征：秆高110厘米，茎秆比“绿苗”强壮，叶细狭直，剑叶角度小，叶色浓绿。穗长15—18厘米，着粒密，每穗70—80粒，单穗多达200粒，谷形细长，色浅黄，壳薄，出米

率 73—75 %，谷粒饱满，千粒重 21.3 克。

特性：本种在清远县栽培，6月6日播种，7月23日移植，10月29日成熟，本田生育期 100—105 天。英德、翁源表现迟熟，全生育期 140—150 天，在南海、河源、连平表现中迟熟，本田生育日数 95—100 天，全生育期 130—140 天。本种分蘖力极强，有命名为“过命线”。有效穗数多，但不大耐肥，施肥过量会招致倒伏。一般虫害较少，但易染稻热病，容易落粒，叶片直集，适宜密植，出穗整齐，因过于迟熟易受寒露风的侵袭，适宜沙壤土中等肥力的本田种植。

栽培特点：

1. 该品种颇为省肥，适于中等肥田种植。
2. 较迟熟最忌寒露风，宜早播早植，避过寒露风的为害。
3. 叶片直集，适宜密植栽培，易落粒，须及时收获。
4. 易感稻热病，注意防治。

正铁禾

来源与分佈：“正铁禾”原产福建省龙岩专区上杭县，解放前引入我省饶平、大埔县试种，栽培一百余年。在各地命名不一，大埔县有名“高铁”、“矮铁”、“二鸟”、“大鸟”、“官只科”，梅县有称“铁种”、“铁禾”等。解放后在饶平、大埔、梅县种植，面积约 26329 亩。1959 年全省各专区均已引种，是山区、半山区的优良品种。一般亩产 400—450 斤，产量特别稳定。1959 年梅县松源公社利山大队种植 2 亩，平均亩产达 910 斤，1959 年韶关专区试验品种亩产达 457.27 斤，比“大刚占”亩产 391.25 斤，每亩增收 66.47 斤，增产 16.986 %。韶关专区其它各县均表现良好，海南岛和江门专区试种亩产 400—