


活人慈航



金匱要略

家藏袖珍活人慈航外因貫串目錄

太陽

陽明

少陽

太陰

少陰

厥陰

壞病

差後

傷寒中風

夾陰傷寒

夾食

夾內傷

夾氣

夾血

夾痰

雜合邪

脈法

傷風

溫病熱病

風溫

溫瘧

溫疫

溫毒

淫溫



南京中醫藥大學圖書館藏

淫病

淫熱

裏淫

中淫

伏暑瘧疾

時行瘟疫

痢疾

發痧

發熱

往來寒熱

煩

謹語狂妄神昏

風淫

寒淫

燥淫

暑病

燥病

大頭瘟

疫痢

運氣治法

潮熱

如瘧狀

煩躁



南京中医药大学图书馆版权所有

家藏袖珍活人慈航第伍卷

禮集上

福建汀州府長汀縣監生鄭璋玉成字紹宗號直方纂輯

邑庠生男汝恭謹鈔

外因貫串

太陽

其脉從巔絡腦下項俠脊抵腰太陽主表為寒水之經乃一身之軀殼也

何謂太陽經病曰頭項痛腰脊強發熱惡風寒脉浮是也有

衛分虛邪榮分實邪之辨

傷寒論以脉浮緩自汗出惡風為衛分虛邪宜桂枝湯

以脉浮緊無汗身體疼痛惡寒為榮分實邪宜麻黃湯

論曰脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯脉浮而數者可發汗

宜麻黃湯

太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈傷寒脉浮緊不發汗



南京中医药大学图书馆版权所有

因致衄者麻黃湯主之

太陽病外症未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯

傷寒發汗已解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯

此已發汗故宜桂枝

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青

龍湯主之

此中風兼傷寒風寒二傷表閉內擾胸中陽氣也

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青龍湯

發之

此傷寒兼中風榮衛俱病也

太陽病外症未解不可下也下之為逆欲解外者宜桂枝湯

此已下故宜桂枝

太陽病先發汗不解而復下之脉浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯

桂枝本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或

小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

此表邪夾水飲也

太陽病得之八九日過經不解如瘧狀面熱身癢以其不得

小汗出故也宜桂枝麻黃各半湯

此日數頗久故小發其汗

一服桂枝湯大汗出形似瘧日再發者以餘邪未盡故也宜

桂枝二麻黃一湯如形似瘧熱多寒少者陽氣偏盛也宜

桂枝二越婢一湯大汗之後不可再行大汗法而餘邪未

盡不可不從汗以散之宜此輕劑

一或發汗後或下之後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱

者可與麻黃杏仁甘草石膏湯身無大熱邪不在太陽汗

出而喘餘邪留肺肺主皮毛也

已上治太陽之表也 時法用羌活湯敗毒散芎蘇散代已上方

節癢有勞力感寒其症頭痛身熱惡寒微渴澀然汗出鼻痛腳腿痠疼無力沈倦脉空浮而無力宜補中益氣湯加羌活防風川芎細辛有下症者用大柴胡湯下之則輕

有無陽症其症頭痛發熱腰脊強惡寒無汗用發汗藥二三貼汗不出者此陽虛不能作汗也宜再造散

方 羌活 人參 桂枝 甘草 熟附 細辛 羌活 防風 川芎 煨姜 大棗

何謂太陽病莊曰表邪不去必入於裏膀胱為表中之裏也有蓄水蓄血之辨

論曰太陽病發汗後若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散主之

中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

發汗已小便不利煩渴者五苓散主之註云渴者內熱不渴者裏無熱也

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

節庵有如狂症其患初得病無熱譫語煩躁不安精采不與人相當不識者呼為發狂此因熱結膀胱也宜桂苓飲主之

即五苓散加黃柏知母梔子香蘇是也必小便赤為是

已上膀胱蓄水也

論曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

太陽病六七日表症仍在脈微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿而小便自利者下血乃愈所以



然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之以抵當湯

太陽病身黃脉沈結少腹硬滿小便不利者為無血也小便
自利其人如狂者血症諦屬抵當湯

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之
宜抵當丸

今時皆用桃仁承氣湯

已上膀胱畜血也

何謂太陽變症曰汗下失宜或從陽明陽化為熱或從少陰
陰化為寒或邪夾水飲內纏或悞下而表邪內陷或悞下
而邪入裏內結或邪入胸中是也

論曰太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難
以用伸者桂枝加附子湯主之

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振
振欲僻者真武湯主之

節庵亡陽症在後



汗下後晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表症脉沉

微身無大熱者乾姜附子湯主之

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身
疼痛清便有調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝
湯

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

發熱頭痛脉反沈若不差身體疼痛當溫其裏宜四逆湯

此亦陽病見少陰脉

表裏同感也

鄒卷有亡陽症因汗後大虛頭眩振振欲擗地并肉瞤筋

惕此發汗太多亡陽也宜溫經益元湯

即十全大補湯加生地
陳皮去川芎

已上汗下失宜傷其陽陽虛則邪從少陰陰化為寒以太

陽少陰為表裏傳也

論曰服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人



參湯主之

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣和則愈

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之
太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也

此外不解由於內不通下之裏和而表自解
辨小便則表裏的然也

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

太陽病若汗若吐若下後微煩小便數大便因硬者與小承氣湯和之

太陽病未解脉陰陽俱停

停者沈滯不起也陰陽者又寸也

必先振慄汗出而解

但陽脉微者先汗出而解但陰脉微者下之而解若欲下

之宜調胃承氣湯

脉微不可汗下此微字即上文停字也

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉

實者宜下之與大承氣湯脉浮虛者宜發汗與桂枝湯

已上汗下失宜熱熾傷陰則邪從陽化為熱以太陽陽明

遞相傳也

論曰太陽中風表解者乃可攻之其人聚聚汗出發熱有時

頭痛心下痞鞭滿引脇痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表

解裏未和也十棗湯主之

今用控涎丹代此邪夾水飲內實也

吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉洪緊發汗則動經

太陽

禮上之上

五

外因



身為振振搖者苓桂木甘湯主之

此候治傷寒。少陰腎水上干而為飲共少陰陽虛水飲上干則

發汗後臍下悸欲作奔豚苓桂甘棗湯主之

此腎水上凌心而為奔豚以土制水也

節庵有夾痰如鬼崇症有患憎寒壯熱頭痛昏沈迷悶上

氣喘急口出涎沫乃痰迷心竅神不守舍神出舍空空

則痰生也宜加味導痰湯主之

表邪夾痰飲而咳喘者小青龍湯主之

已上邪夾痰飲水氣有虛有實治脾治腎治心治肺之異

太陽為寒水之經也

論曰太陽病外症未除而數下之遂協熱而利利下不止心

下痞硬表裏不解者桂枝人參湯主之

云數下利不止裏虛邪陷也

今時誤下邪陷下利後重者調中益氣湯主之壞病內有脈大下利脈沉遲厥逆下利

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而



汗出者葛根黃芩黃連湯主之

邪熱下陷 或小柴胡加葛根黃連湯

太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之

表邪 若汗 乘胸

出微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯主之

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

此太陽表邪乘肺也

若太陽表邪已解無大熱汗出而喘不可更用桂枝湯是

餘邪留肺宜麻杏甘石湯以治其肺

太陽病下之後其氣上冲者可與桂枝湯方用前法

服後食粥以助汗是也

若不上冲者不可與之

表邪乘虛內陷裏氣實而不受故上冲氣不上冲則邪內陷矣

已上誤下表邪內陷也治以托邪為要

論曰太陽病脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者

表未解也醫反下之膈內拒痛鉅氣煩躁心中懊懷陽氣

內陷心下因硬則為結胸大陷胸湯主之

太陽

禮上之

六

外因



太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹硬滿而痛不可近者大陷胸湯主之

註云病勢達於下宜湯為勢達於上宜丸

傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊心下痛按之石硬者大陷胸湯主之

邪夾水氣內結也

結胸者項亦強如柔瘕狀下之則和宜大陷胸丸

實寒結胸無熱症者與三物白散

小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之

邪氣尚在脈絡也

問曰病有結胸有臟結其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈

沈名曰結胸也何謂臟結答曰如結胸狀飲食如故時時

下利寸脈浮關脈小細沈緊名曰臟結舌上白胎滑者難

治

註云結胸宜下其舌上白胎滑者不可下難治臟結宜溫其舌上黃胎芒刺者難溫也

