

攻陣
散陣

景岳全書

卷五
五十五
六



景岳全書卷之五十五字集 古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

瓊南 雲志高載青民訂

攻陣

仲景大承氣湯

治陽明太陰傷寒譫語五六日不大便腹滿

煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脉實者○劉河間加甘草名三

大黃

四兩

厚樸

半斤

枳實

五枚

芒硝

三合

右以水一斗先煮厚樸二物取五斤去滓內大黃煮取二升
去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服



中國醫藥大學圖書館版權所有

仲景小承氣湯二

治病在太陰無表證汗後潮熱狂言腹脹脉

實六七日不大便喘滿者

即前大承氣湯減去芒硝

仲景調胃承氣湯三

治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日

晡潮熱者○凡陽明病有一證在經者當解肌入腑者當

大黃

芒硝

甘草各五錢此從近法

每服三五錢水一大盞煎七分溫服

仲景桃仁承氣湯四

治傷寒畜血小腹急大便黑而不通

桃仁

十二枚

官桂

甘草各一錢

芒硝二錢

大黃

半兩或一兩此從近法

右咬咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

良方桃仁承氣湯五

治瘀血小腹作痛大便不利或譫語口乾

漱水不嚥通身黃色小便自利或血結胸中硬滿心下不

可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁半兩去皮尖

大黃炒一兩甘草二錢

肉桂一錢

右薑水煎服日五更服

當歸承氣湯六

治燥熱裏熱火鬱爲病或皮膚枯燥或咽乾

鼻乾或便溺結閼通宜此方

當歸

大黃各四錢甘草

芒硝各二錢

右咬咀入薑煎服

仲景大柴胡湯

表證未除裏證急汗下兼行用此

柴胡半斤

半夏半斤

黃芩

芍藥各三兩

生薑五兩

枳實四枚

大黃二兩

大棗十二枚

右七味以水一斗二升煎取六升去滓再煎溫服

氏陶六十一順氣湯

以代大小承氣大柴胡大陷胸等湯之神

藥也○此湯治傷寒執邪傳裏大便秘結實口燥咽乾怕執

語揭衣狂走斑黃陽厥潮熱自汗胸脇滿硬臍腹疼痛等證

大黃

枳實

黃芩

厚樸

柴胡

甘草

芍藥

芒硝

水煎服欲峻者大黃後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩



虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尙未除而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋慤慤性峻急故有此戒經云轉藥孰緊有芒硝者緊也今之庸醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣○仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

仲景大陷胸湯

治大結胸手不可按

大黃

四錢

芒硝

三錢

甘遂末

二分此從近數

用水一鐘半先煎大黃至一鐘內芒硝煎一二沸去粗內甘遂末和勻服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原

方用大黃六兩芒硝一升甘遂末一錢水六升如前法煮三升分二服得快利止後服

小陷胸湯十方在寒陣十六

治小結胸正在心下按之則痛脉浮滑者

河間大黃湯十一治瀉痢濕熱邪盛膿血稠黏裏急後重日夜無度者

大黃二兩

右細剉好酒二大盞浸半日煎至一盞半去大黃分二服頓服之痢止一服如未止再服以痢爲度服乃藥湯以和之痢止再服黃芩湯和之以撤其毒

外科大黃湯十二方在外科六七

治腸癰小腹堅腫

^金大黃甘草湯十三

治食已即吐○按此湯必下焦脹實

便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因胃虛而食已即吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃

四兩

甘草一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

^金大黃硝石湯十四

治黃疸腹滿小便不利面赤自汗出表

和裏實者宜用之

大黃

黃硝

硝石

各四兩

梔子

十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內消更煮取一升頓服

金匱子大黃湯十五
治酒疸心中懊懣或熱痛

梔子十四枚
大黃二兩
枳實五枚
鼓一升

右用水六升煮取二升分溫三服

河間防風通聖散十六
治諸風潮搐手足癱瘓小兒驚風便結

邪熱暴甚肌肉蠕動一切風熱疥痢等疾

防風
川芎
當歸
芍藥

麻黃
連翹
薄荷葉
大黃

芒硝各五錢
石膏
黃芩
桔梗各二兩

滑石三兩
甘草二兩
荆芥
白朮

梔子各二錢半



右爲末每服二錢水一大鐘生薑三片煎六七分溫服○

練方各五分用水二鐘煎服○痰嗽加半夏○閉結加大黃

二錢○破傷風加羌活全蝎各五分○此方有四費司知方

無芒硝崔宣武方無芒硝有縮砂癰瘍棧要有白

雙解散十七方在痘疹四一

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散十八方在外科二百九

治便癰熱毒大小便秘

局涼膈散十九瀉三焦六經諸火

大黃

樸硝

甘草各一錢

連翹一錢



梔子

黃芩

薄荷各五分

水一鐘半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

東垣涼膈散二十方在痘疹八三

解痘疹內熱良方

錢氏黃龍湯二十一

治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬痛而

下利純清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃因湯藥而利也各曰積熱利證宜急下之身無熱者宜用此湯身有熱者宜六一順氣湯醫家有不識此證者便呼爲漏底傷寒卽用熱藥止之者是猶抱薪救火也誤人多矣

大黃

芒硝老弱者去此枳實

厚樸

甘草

人參

當歸

水一鐘半生薑二片棗二枚煎服

黃龍湯二一

方在婦人

八五

治妊婦感冒風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢氏黃龍湯二三

方在小兒二五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

和玉燭散二四

治血虛有滯或婦人經候不通腹脹作痛○

此四物湯對調胃承氣湯也

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草各等分



南京中医药大学图书馆版权所有

右咬咀水煎服。○甚者倍用大黃

四順清涼飲子二五

治大人小兒血脈壅塞臟腑生熱面赤

煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

右咬咀水煎服

元戎四物湯二六

治臟結秘澀

當歸

熟地黃

川芎

白芍藥

大黃煨

桃仁各等分

右用水煎或丸服亦可

仲景抵當湯二七

治傷寒熱在下焦小腹硬滿其人發狂小便

自利者下血乃愈以太陽病熱在裏也

水蛭三十條熬

蠱虫三十個熬 桃仁二十個 大黃三兩酒浸

右四味爲末以水五升煮取三升○又抵當丸亦用此四味

仲景十棗湯二八 治懸飲內痛

芫花 醋拌經宿炒微黑勿焦

大戟 長流水煮半時晒乾

甘遂 麴裹煨各等分

右爲細末先以水一鐘半煮大棗十枚至八分去棗納藥末

強人一錢弱人五分平日服之不下更加五分決下徐以糜粥補之

潔三化湯二九 治中風外有六經之形證先以續命湯主之



內有便溺之阻格此方主之

厚樸薑製

大黃

枳實

羌活各等分

右咬咀每服一兩水煎服微利則止

選透膈湯三十

治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通

脇肋脹痛痰涎嘔逆飲食不下

木香

白豆蔻

砂仁

檳榔

枳殼炒

厚樸薑汁

半夏製

青皮

橘紅

甘草

大黃

樸硝各一錢

水一鍾半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

金茵陳蒿湯三

治傷寒發黃及穀疸發熱不食大小便秘



或食即頭眩是為穀疸

茵陳九錢

大黃四錢

山梔一錢

右作二服每服水二鍾煎八分食遠溫服

開胃藥湯三二

下血調氣經曰洩而使膿血氣行而血止行

血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩

當歸

黃連各五錢

木香

甘草炙

枳櫚各二錢

大黃三錢

官桂一錢

黃芩五錢

右咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則漸加大

黃如汗後臍毒加黃柏半兩依前服○愚按此湯乃河間之



南京中医药大学图书馆版权所有

心方然惟真有實熱者可用若假熱假實者誤服則死

枳實大黃湯三三 治濕滯脚氣

羌活錢半 當歸一錢 枳實五分 大黃酒浸三錢

水一鐘半煎八分食前空心溫服以利為度

羌活導滯湯三四 治風濕實滯脚氣

羌活 獨活各半 防已 當歸各三錢

枳實剉炒二錢 大黃酒浸一兩

右每服五七錢水一鐘半煎至七分溫服量虛實加減則已

牛黃瀉心湯三五 治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黃另研二兩 冰片另研一分 硃石少另研二錢 大黃生一兩

