

臨證指南醫案（九）

臨證指南醫案目

卷九

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室

臨證指南醫案卷九

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

姪旦玉堂

調經

愁鬱氣血滯

張九二經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脈絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

川芎

當歸

肉桂

生艾

小茴

脈數者不宜
桂枝建中湯
脈遲而設仲
有助

後期
鬱傷久
嗽肺氣
虛

茯苓 生香附 南山楂 益母膏丸

姚二久嗽背寒晨汗右臥咳甚經事日遲脈如數而虛穀

減不欲食此情志鬱傷延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙草

南棗 飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則
咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日
遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火
也虛則不可以清寒况穀減不欲食中氣之饒已甚
可復以苦寒損胃平與黃芪建中損其肺者益其氣

肝犯胃

而桂枝白芍非斂陰和血之妙品乎

秦二氣衝心痛嘔涎氣墜少腹爲瀉經來後期其色或淡

或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治

川連

小茴

川楝子

歸尾

炒半夏

茯苓

桂枝

橘紅

鬱傷肝

華三鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱痺宜通而氣弱不主統血況春深泄氣之候必

佐益氣之屬方爲合法 歸脾湯

又向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少

婦人全以血爲
主治法亦當以
血爲事

處處用柴胡而
近日自附天
之門者云天
終身不用柴胡
豈非夢境

腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆
肝木拂逆甚則爲厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動
極之徵爲肝用太過宜制其用前此芩朮守補不可用
矣安胃理中丸去黃柏細辛

錢

脈瀋腕悶減食經水來遲腹痛墜

柴胡

此藥難用血藥

炒白芍

黃芩

鬱金

香附

茯苓

蘇梗

神麴

又

諸恙未減腹但痛不墜

逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許

八經閉寒熱便澹腹痛

加味逍遙散去山梔

血絡鬱
熱腹痛

奇脈虛
寒滯

某 血虛內熱經不至 加味逍遙散去朮

某 經遲腹痛風疹絡血不寧久鬱成熱法當通利

涼膈去芒硝加丹皮赤芍

孫二 奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商八脈治

法 歸建中湯

又 久嗽遇勞寒熱 歸芪建中去薑

謝三 能食不運瘦泄經事愆期少腹中乾涸而痛下焦麻

痺衝心嘔逆腹鳴心辣八脈奇經交病

人參

茯苓

艾葉

製香附

淡薤蓉

淡骨脂

肉桂

當歸

鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏丸

王三脈右緩左瀯經水色淡後期嘔吐痰水食物畢增三載餘不孕此久鬱凝痰滯氣務宜宣通從陽明厥陰立方。

半夏

廣皮

茯苓

厚朴

茅朮

淡吳萸

小香附

山查肉

薑汁法丸

又

三月中用辛溫宣鬱方痰瘀自下胸次寬嘔逆緩今

喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用溫

養衝任栽培生氣方法八珍去朮草地加小茴肉桂

蘼艾香附紫石英河車膠丸

肝腎虛寒

朱二經水一月兩至或幾月不來五年來並不孕育下焦

肢體常冷是衝任脈損無有貯蓄煖益腎肝主之

人參 河車膠 熟地砂仁製 歸身 白芍

川芎 香附 茯神 肉桂 艾炭

小茴 紫石英 益母膏丸

衝脈肝陰虛

程七十三三年不孕育其中幻病非一病人述經期遲至來

期預先三日周身筋骨脈絡牽掣凌楚不得舒展凡女

人月水諸絡之血必彙集血海而下血海者即衝脈也

男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脈病也腹為陰陰

虛生熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛

損惑見病治病之悞。有終身不育。淹淹之累。肝血陰虛。木火內寄。古人溫養下焦。必佐涼肝。堅陰勿執。經後期。為氣滯亂。投破氣剛藥。劫陰。

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花益母草

肝腎奇
脈陰虛

朱

經云陽維為病苦寒熱。緣上年冰雪甚少。冬失其藏。

春半潮濕。地氣升。以肝腎血液久虧之質。春主力淺。

八脈隸乎肝腎。一身綱維。八脈乏束固之司。陰弱內熱。

陽微外寒矣。腎脊常痛。經事愆期。血海漸涸。久延虛怯。

情景已露。局方逍遙散。固女科聖藥。大意重在肝脾二。

經因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃。可使條暢。今可入暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脈不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

炙甘草

阿膠

細生地

生白芍

麥冬

牡蠣

無汗不得用此

某

陰虧內熱。經事愆期。

雄烏骨雞

小生地

阿膠

白芍

枸杞

天冬

茯苓

菟蔚子

女貞子

桂圓

陰虛

補經
鬱傷氣
血滯

右十味用青蒿汁童便醇酒熬膏加蜜丸

張三四寒熱間日經來腹痛

情陽清熱之藥古人凡見表症未有不先治其表者
小生地 丹皮 知母

花粉

生鼈甲 澤蘭

某十二先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病

與下焦痕泄則異

川芎 當歸 香附 煨廣木香

查肉 茯苓

某二寒熱無汗經先腹痛喉中燥癢咳逆食物不思此鬱
傷氣血八脈主病姑先與澤蘭湯

歸身

澤蘭

丹參

白芍

柏子仁

茯神

此方無著

周_{七十}室女、經水不調、先後非一來期、必先腹痛較之平日
爲重、飲食大減、始於初夏、入秋下焦常冷、腹鳴忽瀉、忽
結、究脈察色、是居室易於鬱怒、肝氣偏橫、胃先受戕而
奇經衝任躋維諸脈皆肝胃屬隸、脈不循序流行、氣血
日加阻痺、失治必結、癥聚、疝痞之累。

南山查

生香附

延胡

當歸

青皮

三稜

蓬朮

牛膝

川棟子

澤蘭

肉桂

炒小茴

葱白汁丸

屬經來筋掣腹痛常有心痛乾嘔此肝氣厥逆衝任皆

病務在宣通氣血以調經溫燥忌用自可得效

川棟一錢

丹皮三錢

炒查一錢

胡連八分

延胡一錢

澤蘭二錢

歸鬚二錢

生白芍一錢半

又柏子仁丸

吳鬱傷絡脈痛經

此衝任脈有寒

川芎

當歸

香附

小茴

烏藥

茯苓

紅棗

費

經水紫黑來時嘈雜脈絡收引而痛經過帶下不斷

形瘦日減脈來右大左弱上部火升下焦冷徹骨中陰

鮑魚海味也腥稔異常不堪入煎劑中欲藉以補陰豈本草中別無善藥此老不過一時弄巧以異欺人遂開氣分熱後日庸醫炫奇立異之門取種種不堪入藥之物臚列成方以為獨閱生面則授秘傳足徵廣博并示靈巧此風至今愈甚此老難辭作俑之血滯食酸氣

陽乖違焉得孕育閱醫都以補血清劑宜乎鮮效議通

陽攝陰法

宜用溫經法

鮑魚

內經用此別有意

生地

淡蓯蓉

天冬

當歸

柏子仁

炒山查

牛膝

茯苓

紅棗斬艾湯法丸

朱

熱

脈數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性躁氣分有

細子芩

白芍

黑山梔

鈎藤

茯苓

當歸鬚

香附

菟蔚子

桑枝

李

酸、滴入裏氣血呆鈍痛自心胸脹及少腹昔經行三

各總之近日時
 醫先未能識真
 病症因不敢施
 用經方反藉此
 希奇怪誕之物
 塞責一時明知
 誤治轉可令人
 無從斑駁耳是
 以此風日甚而
 荷葉邊豆豉螺
 殼漏曰批把按
 查核淡菜丑第
 一切神農本草
 反方書所棄之
 物收用不遺時
 此醫道之一變
 也

胃陽虛

日今四日猶未已為凝滯所致痛脹何疑讀內經遺意
 以辛勝酸主治但辛氣最易入表當求其宣絡者宜之

韭白汁

桃仁

延胡

小茴

當歸鬚

川棟子

王三
 苦寒泄降胸膈脹悶已舒此嗽血皆肝膽氣火上逆

必經來可安

南山查

桃仁

黑山梔

丹皮

橘葉

降香木

老韭白汁

朱

當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至今月

事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔

臍滯當停以理胃陽為務

人參

半夏麴

廣皮白

茯苓

生益智仁

煨薑

見寒症方可用

脾胃陽虛

某

脈數形疲咳經閉半年已經食減便溏浮腫無清嗽

通經之理扶持中土望其加穀四君子湯欬者不宜

胃陽不運

某

三經閉兩月脘痺嘔惡此氣窒不宜胃陽礙鈍使然當用和中為主

半夏麴

老蘇梗

茯苓

廣皮

枳殼

川斛

濕熱滯腹痛瀉

某

夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣