

傷寒論註 三之四

陸潤庠
參校

世補齋醫書續集

上海
江東書局
印行

吳縣王 四樓莊著
元和陸懋修九芝校

陽明病狀第八 七十五證方十一首

卽病之陽明病皆中風也風挾寒氣從經而入府及其為病必兼中氣之化中氣者太陰濕土也故

胃家便見飽滿之象至病變之推移而為燥結為溼鬱種種不同蓋可因此而識彼焉

陽明之為病胃家實是也一作胃中寒懋修案千金作胃中寒當亦以胃中有寒飲而推本言也病至陽明寒既化熱熱即成實故成無已直改之曰胃家實耳

胃家者上脘至中脘兩穴處沈堯峯曰此陽明病提綱後稱陽明病俱有胃家實在內胃家實者言以

手按胃中實鞭也

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有微陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實

是也微陽陽明者發其汗若利其小便已胃中燥煩實大便難是也懋修案千金作胃中燥便難是也

太陽陽明是太陽病前已自胃實也正陽陽明燥邪直入胃也微陽陽明太陽邪勢已殺轉成胃實也

問者意陽明病既可下何又分為三等故答云因素脾約而下者為太陽陽明因一起即胃中燥實而

下者為正陽陽明因發汗利小便致胃中燥實而下者為微陽陽明也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發其汗若下之若利小便此亡其津液胃中乾燥因屬陽明不更衣內

實大便難此名陽明病也懋修案千金作若下之胃中乾燥因屬陽明不更衣而便難復為陽明病也無利小便及內實字

太陽之邪已微何反得陽明當下之病則以亡其津液致胃中乾燥燥乃本氣自病非下以和其胃氣

不可古人如廁必更衣不更衣則內實與正陽陽明無異矣

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗出而不惡寒但反惡熱問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何答

曰然雖得之二日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也問曰惡寒何故自罷答曰陽明處中主土萬物所歸無所復傳故始雖惡寒二日自止是為陽明病

懋修案千金作然雖二日惡寒自罷即汗出惡熱也無得之及自而字

此問陽明病之見於外者以何為證也身熱汗自出不惡寒但惡熱是陽明異於太陽處其太陰之溜於陽明者則得之一日不發熱而惡寒然既溜於府則惡寒自罷即顯陽明外證陽明處中主土氣勢雄厚病發必見有餘之象故不惡寒也凡陽明之可用承氣梔子白虎者皆此等證也

太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明

徹通暢也正勝而邪從汗出則通暢矣今汗因藥逼而出邪未淨而津已耗必轉屬陽明也

病發熱無汗嘔不能食而反汗出漑漑然是為轉在陽明

漑漑通身微潤意病起太陰而溜陽明故能發熱然尚無汗也嘔而非吐邪交於胃矣不能食為太陰本病至汗出漑漑然決其轉在陽明也

傷寒三日陽明脈大

此條未詳

病脈浮而緩手足溫是為繫在太陰太陰當發黃小便自利者不能發黃至七八日而大便堅為屬陽明言病從溼土之化其為陽明太陰未可定如脈浮為陽緩為溼與熱似陽明矣然身不熱而手足溫仍為繫在太陰太陰當發黃不可下下必腹脹為逆若小便自利不發黃至七八日大便堅者始屬陽明

調胃承氣證也

傷寒傳屬陽明者其人漑然微汗出

懋修案千金屬作繫微作後

傷寒之傳屬陽明者無論何經所傳驗其入胃必漑然而微汗此大小承氣證也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮若緊下之則腹滿小便難也

腸滿微喘當作脹滿陽明中風即風之中風者此為膈塞於中足陽明穴其難則足少陽滿液動解
穴所以風中陽明而少陽之口苦咽乾並見邪方在胸故胸滿微喘也曰陽明中風者以胃家實且發
熱也病在陽明之經脈故惡寒脈浮為風緊為寒飲在上陽明脈浮緊與太陽有別當吐之誤下而熱
陷太陰甚至腹滿肺氣逆則小便難也

陽明病能食為中風不能食為中寒

風之中面及膺者中風也風之從鼻入胃者中寒也其證皆胃家實故曰陽明病也太陽主榮衛陽明
主肌肉外寒所傷必由太陽無專傷陽明之理故不曰傷寒而曰中寒明寒之不自表入也

陽明病中寒不能食而小便不利手足澀然汗出此為欲作堅瘕也必大便頭堅後澇所以然者胃中冷
水穀不別故也無修案千金
大便秘兩字

陽明病中寒之人上焦之陽必不足足則陽氣已充寒氣不得入胃又必在食後未消時食下則胃虛
寒氣必直入三陰惟食後吸寒入胃故不能食此證斷不可下當於小便不利手足汗出辨之瘕瘕皆
結聚瘕為真而瘕為假大便頭堅後澇則堅為假結可知蓋病前腸中先有結糞因此而見澀然汗出
之假象其實胃中虛冷陽氣不化則小便不利故後澇而水穀不別也

陽明病初為欲食之小便反不數一作利大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂澀然汗出而解
此為水不勝穀氣與汗共併脈緊者即愈金修案千
金緊作堅

此言中風也奄忽也病或多日有不能食者原其初則欲食是中風非中寒而小便反少大便仍調熱
不結於裏可知風從經脈而入入處之骨節必疼如有熱狀亦獨在此處與太陽之發熱有別凡風邪
須從汗解此奄然如狂者則以風中之寒即寒水之氣為胃陽所鼓而升陽氣過旺故忽然發狂而逆
邪從汗出也汗出則寒水之氣亦出矣風脈多緩而今緊風中之寒已出於肌肉之外蓋脈緊為寒若

緩而變緊正氣迫邪以出也

陽明病欲解時從申盡酉

懋修案千金作盡戌

申酉陽明旺時也不云戌者戌非陽旺時矣

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛攻其熱必噦此下十四節言陽明病皆不可妄下也如上文申寒證誤攻下之非但不解且必發噦蓋凡病必求其本初起即不能食者本虛也如之何不顧本虛而反攻標熱耶

陽明病脈遲食難用飽飽即微煩頭眩者必小便難此欲作穀瘕雖下之其腹必滿如故耳所以然者脈遲故也

遲為在藏脾之傷也風故能食但以風中有寒阻其脾陽艱於運轉故飽則微煩而頭眩也脾不輸精於上而穀氣之變有濁無清溼蒸為熱氣化不行必小便難而腹漸滿謂之穀瘕以腹滿而下之必如故也苟明乎脈遲之故必當理脾使風溼熱自消為要金匱論穀瘕謂寸口脈遲與跌陽脈緊皆脾傷之象脾傷而溼熱流於膀胱則一身盡黃以膀胱為太陽統一身肌膚也

陽明病久久而堅者陽明病當多汗而反無汗其身如蟲行皮中之狀此為久虛故也

言陽明證之虛者雖久不大便亦不當下也應有汗而反無汗如蟲行皮中是風邪原尋出路非因邪結以致久堅乃素常津液不足之故豈得妄下立齋謂陰氣外溢則得汗陰血濡潤則便通正指此等證而言也

陽明病反無汗但小便利二三日嘔而欬手足若厥者其人必苦頭痛若不嘔不欬手足不厥者頭不痛

懋修案必苦頭痛千金作頭必痛

此言陽明病不頭痛者多其頭痛者從少陽以達者也當與小柴胡湯

陽明病但頭眩不惡寒故能食而效者其人咽必痛若不效者咽不痛

此言陽明病咽痛者少其咽痛者從肺以達者也

陽明病脈浮而緊其熱必潮發作有時但浮者必盜汗出

此言陽明溼熱從汗而外越者可以脈決之也凡陽明脈浮為在經尚屬於表兼緊為裏熱熱必潮於申酉而汗隨以出若不兼緊必睡而出汗此亦表熱而不致發黃者也

陽明病無汗小便不利心中懊憹必發黃

陽明而過於闔其中風無汗者溼必蒸熱加以小便不利風邪化熱擾動其溼致心中懊憹此必發黃也陽明病被大額上微汗出而小便不利必發黃

中風無汗而強以火迫邪在胃中汗何由得惟額上微出耳然肺為大燥小便因而不利溼無從洩久而蒸熱亦必發黃也

陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必衄

此言溼熱之入血者衄則可免發黃也口燥者溼熱之氣薰蒸於口則思水以漱之也凡溼熱在氣則渴在血則不渴故不欲咽也熱在陽明之經必從衄解以陽明之脈起於鼻也

陽明病本自汗出醫復重發其汗病已差其人微煩不了了此大便堅也以亡津液胃中燥故令其堅當問小便日幾行若本日三四行今日再行者必知大便不久出今為小便數少津液當還入胃中故知必當大便也

言陽明病有似可下而不必下者津液六字微妙可思蓋肺為水母而主氣肺既燥則氣之留於胃者少輸於膀胱者多肺氣決胃則胃中之津液還而大便通矣

夫病陽多者熱下之則堅汗出多極發其汗亦堅

此原大便之堅由於津液已耗不宜妄下也陽多者熱言病人陽氣本盛如陽結之類加以陽經受風寒之鬱熱甚宜汗而先下之大便秘堅復有汗多而過發其汗則津液重傷亦成堅結此豈可執定用下一法乎

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也

嘔多者熱在上焦未入府也傷寒為寒極變熱之病更見陽明外證可下無疑而以嘔多戒攻慎之至也陽明病心下堅滿者不可攻之攻之利遂不止者死止者愈懋修案千金作陽明病當心下堅滿不可攻之利遂不止者無死字陽明以胃家實為病之原以腹鞭滿為病之甚故可下也心下堅滿者成注邪為淺未全入府也利不止者死亦危道矣

陽明病面合色赤不可攻之必發熱色黃者小便不利也

陽明脈上循於面合通也面色通赤風熱在經也誤下則津傷風邪化燥必周身發熱若面色黃者溼熱氣阻必小便不利變為瘴與脹矣

陽明病不吐下而煩者可與承氣湯

成注吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下而煩是胃有鬱熱也與調胃承氣以下鬱熱可知

陽明病其脈遲雖汗出不惡寒其體必重短氣腹滿而喘有潮熱如此者其外為解可攻其裏手足濇然汗出此為已堅大承氣湯主之若汗出多而微惡寒外為未解其熱不潮勿與承氣若腹大滿而不大便者可與小承氣湯微和其胃勿令至大下懋修案千金於上若字下另作一條

凡陽明病之脈遲者皆發於太陰者也雖見陽明外證而其體必重若短氣腹滿喘而潮熱邪既入裏已有可攻之象而至手足汗出則尤可下之微也成注四肢諸陽之本津液足為熱然之則周身汗出

津液不人爲熱熱之手足濡然汗出知大便已鞭與大承氣湯以下胃氣是也其服遲體重而熱未成實不潮熱者雖腹大滿而外未解但可與小承氣微和其胃不可大下也

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之

言潮熱爲承氣證然亦當審其大便微堅而與之

若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉失氣者此爲有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但頭堅後溏不可攻之攻之必腹脹滿不能食欲飲水者即噦其後發熱者必復堅以小承氣湯和之若不轉失氣者慎不可攻之

方見前用第二方

此承上潮熱言失當作矢即屎也試以小承知必初堅後溏雖潮熱尚宜和表誤攻則胃驟虛而不能食矣胃陽鬱於下則上燥故思飲水及與之水則熱爲寒鬱上下不通而作噦幸邪未結於府後必續發潮熱邪熱乘虛反盡入府大便復堅無疑然不可不知其傷津致燥之陽明非氣旺熱結之陽明只當少以小承和之和胃以此除熱以此試其燥屎亦以此其服小承時即轉失氣亦不可改用大承況不轉失氣耶故曰慎不可攻

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語是也直視譫語喘滿者死下利者亦死

譫爲多言而有虛實之分實者胃熱生風前言未竟忽又更端語多必亂故又名譫語虛則中氣內弱詞不能達煩言絮語至再至三故曰重語漢書王莽傳注謂鄭重爲煩煩即是此意直視視物而目精不轉動也譫語非死證惟直視而譫語者可危以風火燔其真精也然猶有可治之法所恐者喘滿而孤陽獨升下利而真陰復竭則皆主死耳按樓全善治虛人譫語用參芪歸朮等愈者無數仲景何不以此蓋本論爲外感設法故只詳譫語若虛證之鄭聲治以內傷爲主非此所及也

陽明病其人多汗津液外出胃中燥大便必堅堅者則譫語承氣湯主之

陽明而至本燥為病如焦土之全無生氣矣故胃有燥屎乃急證也稍遲則攻之不下矣多汗者燥之徵便堅而謔語九燥極之徵不可不主以大承氣也

陽明病謔語妄言發潮熱其脈滑疾如此者承氣湯主之

懋修案千金翼方此下又云因與承氣湯一升腹中轉氣者復與一升如不轉氣者勿與之明

日又不大便服反微瀝此為裏虛為難治不得復與承氣湯

此陽明危證當用承氣急救之而用法又有節制也謔語而加以妄言更發潮熱汗多可知脈滑為有餘數疾為乘府此當於初起時以承氣湯主之無他法也風邪徑入胃中所以謔妄並見風為陽胃燥為熱二者相搏而脈至數疾則衛氣失其常度而又發熱汗出陰津立亡固必清熱化燥之承氣以救其陰矣又恐下多陰傷故只與一升轉氣者知有燥屎復與一升不爾者勿與蓋病機纔現即藥滑疾之脈自轉承氣既未多服明日當不大便假使其脈調和則易愈若反微瀝則胃陰已虛非緩中補虛使津液漸生不可難治者言非一二劑可愈也向用承氣時已早慮邪湊於胃其裏必虛豈有見虛脈而復用承氣之理哉

陽明病謔語有潮熱及不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳承氣湯主之

謔語潮熱而不能食有燥屎也燥為胃家實若能食者必無燥屎但燥在大腸耳承氣主之示人以大小二方可隨宜取用也

陽明病下血而謔語者此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而瀉之澱然汗出者則愈

此風循陽明之經脈由氣街而入血室者也衝為血海其脈起氣街邪與之合熱迫血下血病則謔語即如狂也但頭汗出風邪親上也蓋以熱滯於血不得通身周浹刺期門左右穴視其堅滿者瀉之所謂開厥陰之闔則血中之氣散而陽明之闔亦開故針家以刺期門為能取汗也言外有不用此法必

氣湯懋修案脈經作宜大柴胡承氣

汗出非汗多也何以驟見譫語知其平素胃熱未病之先已有燥屎今因風邪自汗胃中津乾故譫語也燥屎宜下但恐邪未盡解下早而乘虛入胃譫甚則妄故必過此一經之六七日乃可下也汗出為表虛屎燥為裏實辨證既確下之則愈此固必用大承氣也

傷寒四五日脈沈而喘滿沈為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語

伏寒邪自裏出有四五日脈尚沈者沈則猶在裏也喘滿者寒水之氣阻於胸也喘滿可汗而脈沈未可汗若遽發之必譫語又當從小承氣消息燥屎之例更多一番曲折也

陽明病下之心中懊懣而煩胸懋修案千中有燥屎者可攻其人腹微滿頭堅後澇者不可下之有燥屎

者宜承氣湯病者五六日不大便繞臍痛躁煩發作有時此為有燥屎故使不大便也懋修案千金於

言陽明病下之不得其當者宜防有燥屎也心中懊懣而煩似誤下後之虛煩然虛煩則必腹僅微滿

大便先鞭後澇否則胃有燥屎正宜承氣湯可知此何以故凡病五六日不大便者若繞臍痛為有燥

屎蓋臍居腹之中央小腸上口與胃下口接者名幽門在臍上二寸大腸上口與小腸下口接者名闌

門在臍上一寸燥結不通故痛繞於臍小腸丙火之熱又通心之丁火所以痛則煩躁而發作有時也

心中懊懣而煩正燥屎之徵又金匱瘦人繞臍痛必有風冷一條亦宜參看

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發者屬陽明脈實者當下之脈浮虛者當發其汗下之宜承氣湯

發汗宜桂枝湯

此詳宜下之脈言實而沈在其中重在脈實當下句

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者必有宿食故也宜承氣湯用前第二方懋修案千金於腹滿痛下

作此有燥屎所以然者本有宿食故也

宿食即大下後所進之食陽明病因下減者自能進食六七日不大便津液不下大腸也煩不解穀氣助其熱也腹滿痛者實也知必有宿食但當以小承氣和之

病者小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不能卧有燥屎故也宜承氣湯

用前第二方

怫鬱節巷謂陽氣蒸越形於頭面體膚間聚赤而不散也此因病前先用有燥屎風入於胃與燥相合胃熱則肺亦熱而小便不利然其津液未耗風動而熱結則乍難風息而津下大腸故乍易時微熱而怫鬱風在陽明也不能卧者胃脈本下行今胃中有燥屎則脈不得從其故道也亦宜以小承氣和之得病二三日脈弱無太陽柴胡證而煩心下堅至四日雖能食以小承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不大便但頭堅後澹未定成其堅攻之必澹當須小便利定堅乃可攻之宜承氣湯

得病者得胃家實之病以其脈弱知發於太陰也煩而心下堅似柴胡證然非自太陽轉入少陽者故當與承氣下之而自四日以至六七日雖用小承猶以小便之利不利分別其屎之堅不堅而少與之必俟其利且堅乃敢以大承除其熱焉可謂慎矣喻氏曰合上數條總以外證之解不解臍腹之痛不痛脈之弱不弱汗之多不多小便之利不利津液之乾不乾而辨腹中之有燥屎與否以消息微下之全是商量治法以期臨時無誤此等處關係最大蓋熱邪入胃不以寒藥治之則胃傷然寒藥本以救胃不及則藥不勝邪太過則藥反傷正況不勝邪則正愈傷正傷則邪益熾其可不慎耶傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者此為實急下之宜承氣湯

懋修案脈經屬大柴胡承氣又按六

七日千金作七八日

張令韶曰此言陽明悍熱為病也傷寒六七日一經已周目中不了了睛不和者靈樞謂胃氣上注於肺其悍氣別走陽明交空竅而循目系也空竅不在表亦不在裏故大便難推而不便為實急下

之得大汗而解者因其胃燥病生於陽明之本故悍熱之氣先見於清竅急下之者子和所云治得大時燥自了也

陽明病發熱汗多者急下之宜承氣湯

此言悍熱之氣迫其津液外出宜急下者喻氏曰胃中止一津液汗多則津液外滲加以發熱則隨熱熱盡達於外更無他法可止其汗惟有急下引熱從大腸出庶津液不至盡洩耳愚按此亢陽無陰緩亦不及也

發汗不解腹滿痛者急下之宜承氣湯

此言悍熱之氣不上走空竅而下循臍腹者亦宜急下也悍熱病為陽氣盛陽盛則陰虛復發汗以傷其陰故不解而反留於腹為腹滿痛也非急下之不可

腹滿不減減不足言當下之宜承氣湯

內經云中滿者治其標今腹滿不減即稍與小承暫減一二分不足殺其勢必當與大承者也金匱云腹滿時減復如故此為寒當與溫藥虛實之分了然矣

陽明與少陽合病而利脈不負者為順負者失也互相克賊名為負脈滑而數者有宿食宜承氣湯金無負者至為負十一字
案修

負者副也兩陽合病陽明為正少陽為副脈大為正弦為副不負者無弦象也龐安常曰合病土被木克利為胃困脈弦必死負者失也言脈有弦象則不得其正也蓋陽明之脈本大土氣不伸則大變為濇而混於弦中弦為少陽之木氣而克土濇為陽明之燥氣而克木是互相克賊也若滑則為食為積數則為熱宜以承氣和之土奪而木亦伸矣按古人布算用籌兩面各異其色沈括云壽色以別正負

懋修案正負蓋一面為實數一面為法數法實互為乘除正負必相對待仲景特借人所習用者明之
法則算經

若誤作勝負之負此尚有克賊二字可混至於少陰負跌陽則不可通矣

陽明病脈浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反偏惡熱其身體重發汗即躁心中憤憤而反譫語加溫針必怵惕又煩躁不得眠下之胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子湯主之

腹滿當作胸滿此陽明之風中於膈者其始惡寒無汗其後發熱汗出不惡寒反惡熱皆陽明內實之外證獨體重一節則猶未全在陽明之裏也夫太陽以皮毛為表陽明以肌肉為表表間有邪故體重是陽明之帶表者當從胸部達之以胸為陽明裏中之表也發汗則風動化熱汗多致燥溫針則火逆必驚乘胃肆擾下之則風從下陷旋欲上出必為虛痞虛復作熱也舌上白胎裏已有熱表未全解以裏熱而兼表風必有白胎可據也柯韻伯曰梔子湯是胃家兩解表裏之方惟此吐法為表邪出路如太陽之桂枝既可驅邪又可救誤也

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣若飢不能食但頭汗出梔子湯主之

此亦陽明之誤於下早者外有熱手足溫邪未陷裏也所以當胸不硬而惟見懊懣若飢等象必有熱痰在膈間可知大鬱發之合用梔鼓也

梔子十四枚香豉四合綿裹右以水四升先煮梔子取二升半內豉煮取一升半去滓分溫再服溫進一服

得快吐止後服

本草梔子治胃中熱氣性本下行佐以香豉蒸釐久而喜伸載之使上則梔子之苦行到胃中必發惡心迎機作吐半由人助非梔鼓竟能吐也此湯能宣越中上二焦之熱梔勿炒黑全不發吐

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷若自

出者五字

三陽合病有順逆險三證少陽篇目合則汗者順也此條則險者也其無汗者則逆者也三陽經脈之病齊到邪氣瀰漫所以有腹滿以下諸證下之則額上生汗者汗欲出不遽出之意與手足厥冷皆陽鬱也若其人本無汗出則不可治自汗出者無論曾誤汗下與否皆以白虎為主方清其兩陽合明之地則太少齊解也

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎湯主之

承上自汗出言之用白虎加人參以救其津

若脈浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓湯主之

服白虎加參後脈證已平復見肺熱而小便不利宜先治水主以猪苓湯導水且清熱滋乾也

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠略一

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠

烊消溫服七合日三服

此即五苓去木桂而加阿膠滑石也上三味主降降者必燥故以下二味之通表裏而導水者潤之庶降而不偏於燥也

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

胃中虛冷其人不能食者飲水即嘔

脈浮發熱口乾鼻燥能食者即嘔鼻燥一作

若脈浮遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

此於承氣梔子白虎主方外分為四證皆陽明雜療法也一胃中燥不宜利水也一胃虛冷不能食而飲水即嘔不宜清熱也一脈浮發熱雖渴亦止口燥必嗽水不欲嘔而能食即嘔不宜阻其邪出之勢

也至汗多而渴則純是假象脈遲為在藏寒乘於脾也外假熱而內真寒欲急救其脾中之陽非四逆不可蓋亟為胃中風熱下利則胃中寒實也

炙草二兩 乾薑一兩 生附子一枚 右以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚

乾薑三兩

薑草辛甘化熱可守中亦可理邪附子用生者取其氣之剽悍能入下焦而助衛氣以達四肢也強

人薑附可增真陰未衰能勝剛藥也

陽明病發潮熱大便溏小便自可而胸脇滿不去小柴胡湯主之

此風之中膈而及脇者陽明為主故發潮熱風在經脈故大便溏小便自可然有汗而中滿不去則少陽之樞不轉可知樞轉則陽明自解也

陽明病脇下堅滿不大便而嘔舌上胎者可以小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解

凡陽明病兼見少陽便當從樞以達闔蓋脇下堅滿少陽之氣不通於上焦也津液不下故不大便木鬱土中故嘔胃氣不和故舌上胎白通其上焦則表裏俱徹矣喻氏曰上焦得通津液得下關係病機最切蓋風寒之邪協津液而上聚膈中為喘嘔諸證邪不解則津液必不得下倘誤行發散恐不惟不下且轉增上逆之勢此所以和之於中而上焦反通也

懋修案於此可見柴胡非發散之用蓋於少陽禁汗而特立小柴胡湯已可見矣今人於升葛紫前羌活獨活芫花蘇藿一概指為發散而悉屏之其為未見古人一方何疑

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜卧一身及目悉黃

止風中之其者也陽明之氣所以闔極不通者以少陽之樞不動也初得病即脈弦而浮大弦為少陽之鬱混於浮大中則樞不轉可知短氣因於腹滿邪之實也胃家既實於中其左右為足陽明經脈其外為足太陰經脈又其外為足少陽經脈一鬱則無不鬱故云都滿脇下為少陽而手足少陽氣相應三焦脈又散絡心包鬱則俱痛即久按摩氣亦不通非若寒之可摩而散也鼻乾不得汗風熱不行於表也嗜卧者膽熱也時噦者木邪乘胃也手足少陽皆從耳後出走耳前熱勝而腫風必親上也當是時熱勢向裏脈已不浮刺腫處以洩少陽之熱則諸證小差而潮熱未解不可欲速用藥蓋病由風來定須從表而出但樞未轉和解無益必俟過二經後續見浮脈然後以小柴和之則從樞以轉上焦得通而胃氣和也若脈但浮而無少陽餘證惟潮熱不除者與麻黃湯使陽明之氣交出太陽或可順其常度若十二日中不溺腹滿加噦是邪踞中宮所謂關則不得小便格則吐逆乃不治之證也平脈法云脈浮為虛大為實在尺為關在寸為格知脈但欲浮兼大則病進也

陽明病其脈遲汗出多而微惡寒表為未解可發汗宜桂枝湯

太陰中風溜於陽明故脈遲而微惡寒桂枝湯和其榮衛不云即愈無待言也

陽明病脈浮無汗其人必喘發汗即愈宜麻黃湯

風中於膺從陽明之闔而無汗蓋風性浮而上行故必作喘用麻黃湯發汗即愈順其常度也

陽明病汗出若發其汗小便自利此為內竭雖堅不可攻當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導

蜜七合內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦候可丸捻如指許長二寸令頭銳內穀道中以手急抱欲大便時乃去之又大猪膽一枚瀉汁和少醋灌穀道中如一食頃當大便出宿食惡物已試

甚良

成注津液內竭腸胃乾燥大便因鞭此非結熱故不可攻宜以藥外治而導引之按土瓜即本草王瓜所在多有用根汁如猪膽法見肘後方

陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出其身無有齧頸而還小便不利渴引水漿此為瘵熱在裏身必發黃茵陳湯主之

此與下條言陽明病之熱黃當利小便也越達也劑齊也引長也將者以炊米漬一宿微酸可解渴也病由風熱故渴瘵熱者濕與風相持也凡熱黃者其色如橘茵陳湯利小便亦下法也

傷寒七八日身黃如橘小便不利其腹微滿茵陳湯主之

傷寒雖得汗熱未全越故溼為熱蒸而身黃如橘也小便不利而加以腹滿溼熱阻於裏也故亦用茵陳湯以逐其熱

茵陳六兩 梔子十四枚 大黃二兩

右以水一斗二升先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三

服小便當利溺如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便去

本草茵陳治風溼寒熱黃瘵故陽明風熱之溼及傷寒寒熱之溼皆可治之梔子清肺大黃調胃以茵陳為之君而先煎其半則梔黃隨之祛上中之溼熱而從小便出矣

陽明證其人喜忘必有蓄血所以然者本有久瘀血故令喜忘雖堅大便必黑抵當湯主之

此與下條言陽明之蓄瘀當下也不曰病而曰證者蓋在陽明病後已曾見過目疼鼻乾不得眠等證

也喜忘猶言善忘經云上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虛虛則榮衛之氣留於下而不上故善忘

也今以血瘀於胃而致榮衛之氣不以時上其善忘固宜胃既有熱故尿定堅血裏屎下行故反易而