

医门法津

中医医案医论医史

編號 11-180-4  
8

三卷中風門方目

一侯氏黑散

二風引湯

三愈風丹

四胃風湯

五薏苡仁湯

六排風湯

七人參補氣湯

八舒筋保安散

九解風散

十搜風順氣丸

十一桂枝湯

十二小續命湯

十三防風通聖散

十四祛風至寶膏

十五不換金丹

十六三化湯

十七攝生散調蘇合丸

十八烏藥順氣散

十九勻氣散

二十稀涎散

二十一加味六君子湯

二十二三聖散

二十三轉舌膏

二十四正舌散

二十五資壽解語湯

二十六鴻青丸

二十七愈風湯

二十八四白丹

二十九大秦艽湯

三十養血當歸地黃湯

三十一天麻丸

三十二滌痰湯

三十三青州白丸子

三十四竹瀝湯

三十五貝母瓜蔞散

三十六千金地黃湯

三十七涼膈散

三十八清心散

三十九地黃欵子宣明方

四十三因自散子

四十一二丹丸

四十二稀薺丸

四十三黑錫丹

四十四三建二香湯

四十五星附散

四十六古今錄驗續命湯

四十七千金三黃湯

四十八近効白朮附子湯

四十九史國公浸酒方

附辨證方目二十方

五十三痺湯

五十一桂枝五物湯

五十二十味剉散

五十三烏頭礪

五十四薏苡湯

五十五通痺丹

五十六控涎丹

五十七人參丸

五十八括蔥薤白半夏湯

五十九腎瀝湯

六十呉茱萸散

六十一羚羊角散

六十二羌活湯

六十三升麻湯

六十四巴戟天湯

六十五犀角散

六十六人參散

六十七溫中法麵丸

六十八紫蘇湯

六十 九牛膝酒

附風弓蕪方目 七方

七十 和榮湯

七十一 緊風散

七十二 獨聖散

七十三 祖風丸

七十四 四神丹

七十五 扉角湯

七十六 牛蒡子散

中風門諸方卷三

丁侯氏黑散 治大風四肢煩重。心中惡寒不足者。  
外臺治風癲方論。見前法中。然以菊花爲君。  
亦恐風邪乘虛。进入心藏故也。

菊花

四十分

白朮

十分細辛

三分

茯苓

三分

牡礪

三分

桔梗

八分

防風

十分

人參

三分

礬石

三分

黃芩

三分

當歸

三分

乾薑

三分

芎藭

三分

桂枝

三分

右十四味杵爲散。

酒服方寸七日

三服初服

二十日用溫酒調服。禁一切實肉。大蒜常宜。

冷食六十日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷食自能助藥力。

○風引湯 除熱癱癪方論見前法中。蓋風者外司厥陰。內屬肝木。上隸手經。下隸足經。中見少陽相火。所以風自內發者。由火熱而生也。風生必害中土。土主四肢。土病則四末不用。聚液成痰癱癧者。以風火挾痰注於四肢故也。觀金匱此方可見。非退火則風必不熄。非填竅。則風復生。風火一熾。則五神無主。故其用藥如是之周到也。

大黃

乾薑

龍骨

各四兩桂枝二兩

甘草

牡礪各兩

滑石

石膏

寒石

碧脂

白脂

紫石英

各六兩

右十二味杵麩篩以革囊盛之取三指撮井花水三升煮沸溫服一升治大人風引少小驚癇瘲癰日數十發醫所不療除熱方巢氏用此方治脚氣。

○愈風丹 治諸風證偏正頭痛。

防風通聖散。四物湯。黃連解毒湯各一料加

羌活

細辛

葛菊花

天麻

獨活

薄荷

何首烏各二兩

右爲細末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。細嚼茶清下。不拘時服。

按外風與身中之火熱相合。以陽從陽必上攻於頭。然風火盛。榮血必虧。故其藥如是也。

四胃風湯

治虛風證能食。可是麻木。牙闊急搐。目

內蠕動。胃風面腫。

升麻

白芷

各一錢

麻黃

葛根

各一錢

當歸

荳蔻

分

甘草

炙

柴胡

羌活

藁本

黃柏

二錢

草薢

右水二盞薑三片棗一枚煎一盞去滓服。按風入胃中何以反能食。蓋風生其熱。卽內經。痺成爲消中之理也。方中但去其風不去其熱者。以熱必隨風外解不必加治耳。

五薏苡仁湯 治中風手足流注疼痛。麻痺不仁。難

以屈伸。

薏苡仁三錢

當歸

芍藥各二錢

分

麻黃五分

官桂

五分

蒼朮米茶梗炒錢分

甘草八分

右水二盞。生薑七片。煎八分去渣溫服。食前。

下。自汗減麻黃。有熱減官桂。  
按此爲風濕相搏。鬱節不利之證。故用藥如  
是也。

○排風湯 治風虛冷濕邪氣入臟。症言妄語。精神  
錯亂。及五臟風發等證。

荆風

白朮

當歸

芍藥

肉桂

杏仁

川芎

白朮

甘草

炙各一錢

麻黃

茯苓

獨活

各一錢

右作二服。每服水二盞。煎三片。煎七分去渣。

服。

按虛風冷濕雖已入臟其治法必先宣之使從外散故用藥如是也。

七人參補氣湯 治手指麻木

人參  
黃芪各一錢升麻

柴胡

芍藥

生草

炙草

五味子各五分

當右水一盞煎至五分食遠臨睡服渣再煎。

愚按諸陽起於指。手指麻木風已見端宜亟補其氣以禦外入之風。故用此爲綢繆計也。

八舒筋保安散 治左癱右瘓筋脉拘攣身體不遂。脚腿少力。乾濕腳氣及濕滯經絡久不能去。

宣導諸氣

卷之十

木瓜 五兩 草薢

靈脂

牛膝 酒浸

續斷

白僵蠶 炒

松節

白芍藥

烏藥

天麻

威靈仙

黃芪

當歸

防風

虎骨

酒浸各兩

有用無灰酒一斗。浸上藥二七日。緊封扎。日足取藥焙乾。搗爲細末。每服二錢。用浸藥酒調下。酒盡用米湯調下。

按此治風濕搏結於筋脉之間。凝滯不散。阻遏正氣。不得通行。故用藥丸。是也。