

第二十八章子宮連網發炎症

此症近悉其爲常見者，乃子宮前後左右相連之肥網脈管及廣筋等處發炎症也。

〔兼症〕 子宮連網炎症所易兼者有如

骨盤統膜炎症

子核衣炎症

子帶衣炎症

子宮內皮炎症

子宮離位等症是也

按以上各症之所以兼於本症，以其症皆爲此症所必有之狀。若重者則更不可少，而廣筋受累更甚至於子宮內皮炎症，又每因用各器具以致傷內皮而起炎症者，是皆可謂爲此症之病也。



起止病期

茲所論此症與別者不同，蓋人每以此症與骨盤連網、骨盤衣炎症相同，故每統而論之，而此則不同。夫骨盤連網發炎，並不兼連別症，且無日久轉爲舊炎，與發膿而止之理。此症則發膿而轉爲舊症者多，卽其所兼各症，如統膜炎、子宮內膜炎、子核子帶衣炎等症，皆可轉爲舊症，且內有一二瘡穿破發膿，時或經年累月，時有膿出，而骨盤連網炎則無舊症。骨盤生瘡，日久不愈者，或可有之。凡新炎發膿者，每在起病數日，乃其常，斷不至兩三禮拜之久而舊症則膿積於內，或變實，數月不出，然此亦非常見者也。

當膿流出之後，則症必有轉變，然所變者，不外三等。



一其膿發後自流至盡則瘡消而愈

二其瘡流膿之後上爲皮癩所蓋則膿必復發復流似無止日
三此處各瘡穿破流膿將愈別處又起幾將連網潰爛迨盡

按膿流出之道路不一

一由腹肌穿出或近大迴管穿出 二或傳入膀胱或傳入直
腸或傳入陰道或傳入尿管或傳入子宮 三由會厭近肛門
處穿出 四入骨盤孔竅或入尾閭骨竅 五由骨盤之上穿
入統膜

判症 凡判此症者貴能定其就愈之期而其行病固不能預

知可否於三禮拜瘡破流膿自愈可否一瘡穿破並不再起其

症自愈，抑或轉成舊症，日久不愈，皆未可預料，惟幸不至有性命之憂。第於流膿之後，每有統膜發炎之患。

病原 起病之原，每不外以下各端：

一、產後或半產之後

二、子宮或子核發炎

三、受傷 如破身太早，或用烙灸，或用扶子宮器，或割傷，與及跌打等是也。

於各事之中，因產後與半產而起者，得其半，甚或三份之二，其餘尚少。蓋子宮連網炎症，除因產後而起之外，餘尚少見。因孕時本有此症之基，再兼以感寒身倦，與用力過度，以激其病勢，而症於以成矣。

病狀 子宮連網發炎新症，每有一定病狀，而因產後起者，更

不外以下各狀：

一 受寒

二 發熱

三 作痛

四 發燒

五 小便難

六 經水太多

受寒一狀，雖或無之，然有之者多。受寒不久，即覺脈數，有一百一十至者，有百二十至者，而於胸際則覺熾痛，如此者數時，或一二日後，脈更加數，身熱繼起，初至寒熱表一百零三四度，重者更熱，外此則肛門與膀胱亦兼有病狀。若經期遇此，則經必妄行，縱非經期，亦有流之者，然而醫者祇可知有此等病狀而

已若固執此以辨症，則又恐有誤。蓋舊症固無以上各狀，卽新症亦或無之。凡遇此症，可分三等以論其病狀。

一、有受寒發冷、發燒、作痛，及一切發炎症狀者。

二、祇有作痛，而無受寒發熱者。

三、以上各狀全無，祇覺虛弱，與骨盤墜重，晚間微有身熱者。蓋凡舊症，其行病也有不同之勢。譬之一人，於一兩三月之前，已起此症，既未全愈，則虛弱日甚，胃口已失，心驚畏響，顏容憔悴。臨晚身燒，子宮亦非甚痛，總覺下部不舒。時覺子宮墜漲，每於大小便與行動時，更覺墜漲。此則必須探查下部，始能辨認其症也。

查驗患狀

此症必須藉查驗之法，庶可早定其病勢。凡初起者，於入指探查時，必覺其內甚熱，且或遇有腫漲之處，再以指各處摩之，則必痛。更用兩手內外摩按，則能查出近子宮左右有一處痛甚者，病行至次候，約第三四日，此時連網發炎，見痛之處，發明汁，生成一實團。若用兩手內外摩按，則覺其實團約菩提子大，或雞蛋大，甚或橙子大者，生於廣筋，或子頸旁之連網不等。

然而醫者，甚勿謂藉此入指一次，遂可知其症之底蘊。蓋必小心再查，先將指抵於子頸，用手在腹外四圍擠按，自子頸以及子宮底，皆須小心查摩，次再將指向骨盤廣筋，各處摩察，然後

更將指向骨盤上面，四圍摩按，若是者週圍查按，自可定其炎處，係在子宮之前，或在左，在右，若在子宮之後，更須入指於肛門，始能查知。

若病至三候，約第五六日，則爲實團生膿之候，此時除現以上各狀之外，其子宮必離本位，而爲其膿瘡漸漸擠歪矣，亦有倒於骨盤之上者，及向前向後，或向左向右，歪倒者，亦皆有之，而彎卷者，則少子頸雖定，而子宮體尙活動不定。

辨症 此症與之相淆者，有如

子宮生肉瘤、

子宮生血瘤、

骨盤統膜發炎、

受孕太早、

然子宮生肉癰，則不痛，摩亦不疼，且能於骨盤內移動，一切受寒、發冷，及炎症各病狀，皆無之。每生於子宮之一邊，若子宮連網發炎生瘡，則異是。且在子宮之外，貼附子宮本體者也。生血癰者，忽然而起，子宮流血不止，其人身冷，兼露失血各狀。且血癰起時，癰體軟，漸生至硬，連網發炎，生瘡起必硬，由硬而漸變爲軟，是又不同也。

骨盤統膜發炎者，必現其統膜炎狀，其於經期，極痛而畏摩，酷痛且內無瘡癰，不過於骨盤上面，略堅硬耳。久之雖或起一小癰，但癰之步位，每在子宮之後，斷無在兩邊之理。而其子宮較之連網發炎者活動，即使子宮本體不能動，而子頸尙覺活潑。



是又與連網發炎者不同也

至受孕太早，則與此症其形狀略同，醫者宜小心查察，庶可分辨

〔炎後各患〕

此症後患甚多，縱當時無甚危險，嗣後常多禍患

如子核因發膿漸至損壞，或至發腐，子帶亦常不妥，子宮必爲明汁，羈扯離位，故雖其症可愈，而其人每於內腑功用有所損傷，蓋不能生育者有之，經水妄行，與經難經痛者有之，生胎與子宮不正，皆此症之後患也，且其纏綿不愈之狀，於病者固形急苦，於醫者亦覺無法

〔治法〕

若遇症時，尙在初起之候，應屬新炎者，則當亟用鴉片

以靖其炎，若作痛甚慘者，則可以節射入皮，否則服之，或射糞

門皆可，蓋鴉片一藥，乃新炎症在所必用者，其功既可止痛，止
炎，亦可結便，寧睡，安腦。若初遇症，覺其人忍痛難堪，卽宜用嗎
啡水，以節射入手臂之皮腠，病人宜靜臥，不可起坐，余意以靜
臥一事，勝似別法，亟宜力勸病者勿起。○食物宜以清淡易化
者，如牛奶粥、牛奶湯、咖啡等。如在症初起，未至發膿，可用冰
袋置腹際，以冀內炎消散，然若已經發膿，不可消散，則宜用甘
菊麥糠，或胡麻子，熱敷腹際，每三四點鐘一次，大便宜結，而發
冷發燒，亦當治理，或用青藜蘆酒，或用草烏頭酒，或洋茉莉酒
皆可。當發膿之先，用指入內查摩，若覺其發炎內患未清，將
近發膿，欲轉成舊症，卽宜用一弔膏，橫闊四寸，長六寸者，貼於



腹外然必於身無寒熱與炎狀渾減之候方可弔之當發膿之後則發炎之病狀亦皆宜理或謂宜服鈹鎳或鈹鎳鈹鎳每服五西釐每三四點鐘一次鈹鎳每服十釐十五釐至二十釐每間三四點鐘一次

炎狀稍靜之後其大便可通之此則莫妙於水銀瀉藥惟時更當於腹外打吊膏勿使其發膿而轉成舊症病人靜睡於牀用絨手中溼熱水敷於腹上外以綢布包裹再用熱水箭射陰內其水之熱以病人僅能忍受者爲妙再加以鎳酒或鈹鎳少許和熱水射之不獨使內患輕淨亦可以減其炎狀誠此症不可少之法也

至於症已至三候、內復發膿、瘡已見於骨盤、則祇可聽其自破、而病人極宜防備小心、數禮拜內、切勿用力勞動、防其穿破、縱使病者可以行動、而每至經期、亟宜靜臥、





第二十九章 骨盆統膜發炎症

此乃統膜之胞於婦女骨盆者發炎其炎勢止限於骨盆一處而非延蔓於腹者及其病狀亦止現骨盆發炎之狀耳

病原 起病之原不外以下各端

一子宮連網發炎 二產後或半產後 三流白濁 四子宮
子帶內皮及子核發炎 五經水及別液流於骨盆膜內 六
受傷 七經期不小心 八骨盆內積壞體或姦砂 九子宮
離位等皆可累及骨盆胞膜發炎者也

各症不同 此症有新炎舊炎之分然其自起者每多新症而

因或生壞體與子宮受患各症累及此症者則一起即為舊症



況於新舊之外仍有二等凡經期之骨盆統膜炎則每覺於經期時其病特重凡復發之骨盆統膜炎每於起病數年後病勢如常忽因小事而復起甚重余經驗數症皆如此者內一人有此症十年一起八年皆於起病後八九或十一二個月病勢如常嗣因小事忽然極重蓋此必其內之瘡破而膿流入骨盆統膜也

病狀

新炎之病狀不外

骨盆疼痛畏摩

時或膀胱發熱不舒

每覺寒熱不定

作悶作嘔

面容愁楚心不自然

腹內有風成氣臌

新炎初起，每覺微寒，發冷，然不甚重，病人非畱意，卽不覺亦有起時作痛，與發冷發燒者，痛狀有輕有重，有一起卽作痛者，有數日後始覺痛者，腹部疼不可摩，時或被蓋亦不能忍受，病人每思仰睡，縮腳以令腹肌鬆放，診其脈，輕者不甚速，重者則數細，速至每咪呢一百一二十至，身熱亦此症所常有者，有極燒者，有反涼者，若一起病卽在寒暑表一百零六度，則恐病勢轉危，作悶作嘔，亦所不免，然非甚重，顏容愁楚，時或眼眶黑陷，心固不舒，望而知其病甚，卽日久成舊症，仍覺其心神悶苦，余曾見一人因此症而致狂妄者，大概觀之，頗似腹內總膜發炎之狀，然察其骨盆處作痛與畏摩等狀，則可知爲骨盆內之

