

殿胞煎

見本卷三審門

類中風痙瘓及語澁口噤不語筋攣瘰癧等證論

凡婦人衝脉爲血脉之海。若血脉充足。流暢無滯。氣血冲和。則關節清利而無病矣。至於產後勞損。臟腑氣血暴竭。百骸少血。濡養多有陰虛內熱。熱極生風。雖外證如風實內臟陰血不足。氣無所主。卒爾口噤牙緊。唇青肉冷。汗出或唇口喎僻。手足筋脉攣搐。諸證類如中風者。或因血氣耗損。腠理不密。汗出過多。神無所主。致角弓反張。此乃厥

陰虛極類瘧瘧者在傷寒之家雖有剛柔之分而產後無非血燥血枯之證總宜養陰補血血長而虛風自滅任其痰火乘虛泛上皆當以末治之母執偏門而用治風消痰之方以重虛產婦也治初產當服生化湯以生旺新血如見危證三貼後卽用人參益氣以救之如有痰有火或少佐橘紅竹瀝薑汁其黃連芩栢不可並用胆心蘇子尤不宜加慎之慎之如產已數日腹無塊痛卽用滋榮活絡湯如語澁四肢不利宜天麻湯密齋治語言蹇澁加味生麥散治汗多口噤背反氣微類瘧瘧用止汗生血飲治無汗筋

學用芎歸棗仁湯。諸書所用悉皆參附。十全理陰大補元煎之類。溫養而竣補之。從未有以風痰治之者。昔立齋用十全大補治口噤。空開口灌之。如不得下。令側其面。吐之。仍灌熱者。又冷。又灌。數次。卽能下而甦矣。醫通云。口噤則挾齒灌之。斷噤則灌入鼻中。卽蘇。此古人救急灌法。不可不知。至於治口噤不能爲語。竣補之中。少兼通心氣之藥。治之故密齋尊生俱用七珍散。以通心氣也。馮氏治產後癰瘕。用八珍加丹皮。鈎藤。以生陰血。不應用四君子。芎歸。丹皮。鈎藤。補脾土。蓋血生於至陰。至陰者脾土也。且氣有



生血之功耳。再此證如傷寒誤汗亡液。誤下亡陰。潰瘍膿血大小之後。小兒吐瀉之後。悉多患之。故在產後亦惟去血過多或大汗大瀉而然。其爲元氣虧極。血液枯敗可知。若肢體惡寒。脈微細者。此爲正狀。若脈浮大。發熱煩渴。此爲假象。惟當固本爲善。若至於無力抽搐戴眼反折。汗出如珠。兩手撮空者。不治。尊生治產久拘攣不宜補者。用舒筋湯治之。

昔余奉

差督運。亡室因胎前過月不生。忽患子癰。證誤爲醫人認傷。

榮於舌。語言不清。含糊寒澁。

人參

麥冬

去心

歸身

生地

炙草

石菖蒲

各一錢

五味子

十三粒搥碎

豬心一個。劈開水二盞。煎至一盞半。去心入藥煎七分。食後服。○此方治怔忡甚效。

止汗生血飲。治產後汗出多而口噤不開背強而

直。氣息欲絕。類瘧證。宜速治也。

治產心法

卷下

類中風瘧瘧及語澁口

方

二



北京中醫藥大學圖書館藏
1994

當歸 二錢酒浸

川芎

麻黃根 各一錢

桂枝

羌活

防風

羚羊角

天麻 各六分

附子 製

炙草 各四分

水煎服○一方有人參一錢

芎歸棗仁湯

治產後無汗筋脉拘攣類瘧證

當歸 二錢酒洗

川芎

防風 各一錢

棗仁 五分去殼炒研



水煎服○一方有羌活 七分

七珍散

治產後敗血停積閉於心竅神志不明

心氣通於舌心氣閉則舌強不語

人參

石菖蒲

各一錢

為散各一兩

川芎

一錢

為散七錢五分

生地

一錢

為散易炙甘草三錢

細辛

二分

為散二錢五分

薄荷

一分

為散無此味

防風

五分一方四分

辰砂

五分研細水飛

為散三錢

尊生合生化湯服○一方為散薄荷湯調服三錢

舒筋湯

治產後日久拘攣不宜用補劑者

合卷

類中風痙症及語澁口

方

全

別... 卷一 際不語筋攣癰瘕等證

羌活

薑黃

炙草

各二錢

海桐皮

當歸

赤芍

各一錢

白朮

一錢土炒

沉香

少許

薑煎參證治

參附湯

人參

當歸

酒浸各二三錢

肉桂

八分或一錢

黃耆

蜜炙

白朮

土炒各一錢五分

熟地

二錢



北京中医药大学图书馆版权所有

製附子 四分或六分

炙草 四分

生化湯 見本卷生化湯論後

加參生化湯 見本卷暈厥門

十全大補湯 見上卷胎不長養門

理陰煎 見上卷惡阻門

大補元煎 見本卷惡露不止門

八珍湯 見上卷諸痛門

四君子湯 見上卷胎逆上逼門

怔忡驚悸並虛煩煩燥論。

怔忡驚悸並虛煩煩燥論



南京中医药大学图书馆版权所有

產婦憂驚勞倦去血過多則心中燥動不寧。謂之怔忡。若
惕然而驚。心中怯怯。如人將捕之狀。謂之驚悸。治此二證。
惟調和脾胃。補養心血。俾志寧神定。氣舒心安。而病愈矣。
如分娩後血塊未消。宜服生化湯以補血行塊。連服數劑。
則血旺而怔忡驚悸自平。不必加定志安神之品。如塊痛
已止。服加減歸脾湯。如心中驚悸。目睛不轉。而不能動。診
其脈動而弱者。宜養血佐以安神藥。養心湯主之。素壯火
盛者。兼服安神丸。如虛煩不眠。亦心虛所致。加減歸脾湯
並治之。孫正人用人參丸治驚悸不眠亦效。至於煩燥不

寧亦宜分塊痛有無如塊痛未除有瘀血也生化湯調失笑散如塊痛已止是虛或有熱人參當歸湯治之

加減歸脾湯 治產後血塊痛止怔忡驚悸

人參

茯苓

棗仁炒

麥冬去心

黃耆密炙

白朮土炒各一錢

當歸二錢酒浸

川芎八分

遠志肉六分製

陳皮

炙草各四分

龍眼肉八枚

治產心法
怔忡驚悸並虛煩煩燥方



薑一片水煎服。○虛煩加竹茹。一團。○有痰加竹瀝。薑

汁或更加栝子仁。○一方茯苓易茯神無川芎陳皮有

木香。二分

養心湯 治產後心血不寧驚悸不安

人參 一錢五分

當歸身 二錢酒浸

黃耆 蜜炙

麥冬 去心

棗仁 炒

栝子仁 各一錢

茯神

川芎

遠志肉 製各八分

五味子 十粒



炙草 四分

水煎服

安神丸

治產後怔忡驚悸。素壯火盛者。

歸身 酒浸

生地 各三分

黃連 二錢炒

甘草 五分炙用生用俱可

以上四味共爲末。蒸餅丸如菉豆大。以硃砂爲衣。每服四十丸。

人參丸 治產後大虛心悸志意不安恍惚恐畏虛

煩不眠少氣。

怔忡驚悸並虛煩燥方



人參

茯苓

麥冬

去心

薯蕷

各二兩

澤瀉

菖蒲

乾薑

桂心

甘草

各一兩

共爲末。白蜜和棗膏丸。如梧子大。空心酒服。二十丸。早晚服。

人參當歸湯

治產後塊痛已止。或虛。或虛而有熱。

煩燥不寧。



南京中医药大学图书馆藏
1964

人參

當歸

酒浸

熟地

麥冬

去心各二錢

肉桂

四分

白芍

一錢酒炒

生地

八分

竹葉

十片

水煎服

生化湯

見本卷生化湯論後

失笑散

見中卷胞衣不下門

麻瞽論

產後麻瞽皆因氣虛血少不能充溢乎週身也即如人曲



肱而枕。稍久卽麻木不爲我用。其非氣血不週遍之明徵歟。目得血而能視。得清氣之升而能用。血虛氣弱不能升清。故濁不降而瞶。宜生血補氣十全大補湯主之。至於去血過多。手足發麻。小腹大痛。則遍體麻暈欲死。此非惡露凝滯乃虛中挾痰。六君子加炮薑香附當歸。曾治一婦產後右半身麻瞶而昏暈不省人事。發卽胸膈痞悶。下體重着。或時心神蕩搖若無心肺之狀。頃則周身冷汗如漉。大吐痰涎而蘇。此產後經脉空虛痰飲乘虛襲入之故。因與六君子加歸朮肉桂。隨手而效。復有一婦產後左半身麻

瞽昏暈。不省人事。發則周身大痛。筋脉癱瘓。肌肉潤動。或時頭面赤熱。或時腿上振振動搖。頃則蒸蒸汗出而蘇。此產後營血大虧。虛風襲入之故。用十全大補湯治之。諸證悉平。但麻瞽不止。後與地黃飲子而安。

地黃飲子 治腎氣上交於心。舌瘖足痹。

熟地 三兩

巴戟天 酒浸去骨

附子 炮

山茱萸 去核

肉苁蓉 酒浸去腐切焙

石斛 斛

白茯苓

石菖蒲