

等開自有
三。即導之

天鈞

天風外觸內熱痰因乳母愛酸鹹天鈞屬陽。由乳母酒

氣入乳。遂令芽兒心肺生熱痰鬱氣滯。加之外感天搖熱

風觸動。卒然目直身強。如魚上釣之狀。故曰天鈞。甚者爪甲亦

眼翻如邪祟。或喘或笑。喜驚不常。如邪祟狀。

青藍通用鈞藤并保命鈞藤散。人參犀角各五分。全蝎天

風熱勝者保命丹。痰盛者換食疎通和胃無

腹內跳動。宜寬熱飲。墮下熱後與

和脾胃之藥治之。不

內鈞

內釣內臟抽掣痛胎中風氣壅原因胎驚胎風動胎中風氣壅眼

有紅筋血點身反張唇黑喘喘外腎腫吐瀉方了外搐來內

外蕪攻實可恐誰知至寶鈎疎風調氣鎮驚疎風內外共

驚風內釣腹中極痛面青服冷尿如米泔者內藤膏

乳香各三錢木香姜黃各四錢木驚肉十一箇為末

蜜調成劑收秘內兒天小加錢鈎藤煎湯或四磨湯

化下次服五味木香煎川練肉七箇用巴豆卅五粒去皮

同炒豆黃去巴豆末香史君子玄明索首香各一錢為末

量兒大小加減米飲下內鈎痛者古等歸湯加乾

姜肉桂等分下香泥香膏皮小煎水煎服痛甚者

魏木散我末五錢內錢先用水化阿魏浸我水一

晝夜焙乾為末每一字茶煎湯米飲調下內鈎腹

痛驚者乳香五分沒香各一錢鴉精十

箇填持一錢生薑末雙九子六分

湯化下內鈎痛者古等歸湯加乾

○已上皆歸湯加乾

之劑若驚重者宜盤腸腰乾虫嘔攻盤腸痛因寒驚小兒

但似但痛則曲腰乾帝額汗為異古方用白豈歲敗仁膏

皮疎皮香附義木汁草等分為末紫蘇煎湯下○虫症亦

與內釣相似但虫痛攻心叫哭合眼嘔吐涎沫清水四肢

痛瘦面青黃或寒或熱沉黙不知病處發作有時為異此

凡主之○一切積痛盤腸虫痛者通用泥乳感應丸沉

香杏仁木香丁香各一錢肉豆蔻一箇百草霜一分

已十四粒為末酒煮過黃蠟和丸菜豆中風不語似三

人盤腸虫症中風三種俱以內釣但中風不語為異治與

人一人同小兒有中風後瘡不能言者用木香陳皮其

能煎湯吞肥兒丸內有黃連能去心竅惡血故也○有肺

風喘促涎潮竄視者用阿膠煎服蓋阿膠

能育神驚風後眼中

腫子不正者最宜

疝氣

疝氣亦因胎患得有因父服藥以致氣滯於下者有因

有父坐濕地而得者多啼冷氣傳腎經有因兒多啼不已冷氣吸入

又有水腎有腎腫有腎癰有偏墜面青吐沫陰囊腫甚則

有癰疝有奔豚有疝瘕與大科同面青吐沫陰囊腫小便

淋瀝陰囊腫痛者用甘草汁調地龍糞塗之風熱外腎

振赤腫痛日夜啼呼不數日退皮如雞卵壳愈而復作者

用老杉木燒灰入臍小腹痛連腰背傾諸疝皆因腎虛寒

粉清油調敷神効小腹痛連腰背傾邪冷濕之氣侵入

膀胱之經留而不散故陰核腫硬沉墜治法先宜踈利次

用逐寒溫臟之藥按穴灸之惟木腎腎癰瘡毒之氣入於

先宜踈導歸牛散

腎經久則成膿治法外用接毒之藥敷貼內服消散癰毒排膿利水道等藥

肉桂牽牛各五錢當歸大黃桃仁各二錢半全蝎一錢每

一錢入蜜煎服利後以青皮陳皮茯苓木香砂仁甘草生

姜煎服和胃養青者死治疝氣次與和胃養金鈴散金鈴

便閉小腹陰囊牽引痛甚夜啼次與和胃養金鈴散肉一錢

砂仁七錢半 華澄茄 木香 各五錢 為末 每一錢 大者二錢
鹽湯或酒調服 治疝痛 時先曲腰 乾啼 脚冷 唇乾 額汗 或
外腎鈎上 陰囊偏大
通用鈎藤膏 魏木散

變蒸

變則氣升 蒸則熱 變者變生 五臟蒸者蒸養 六
八蒸十變

長氣血 小兒初生 形體雖具 臟腑氣血 尚未成就 而精神
志意魂魄 俱未生全 故三十二日一變 六十四日

一蒸 凡遇一變 即覺性情有異 於前上唇中心 有一點白
者是也 初生至三十二日 一變 生癸水 屬足少陰 腎主精

至六十四日 一蒸 二變 生壬水 屬足太陽 膀胱其發耳與
尻冷 至九十六日 三變 生丁火 屬手少陰 心主藏神 其性

為喜 至一百二十八日 二蒸 四變 生丙火 屬手太陽 小腸
其發汗出而微驚 至一百六十日 五變 生乙木 屬足厥陰

肝主藏魂 喜笑 至一百九十二日 三蒸 六變 生甲木 屬足
少陽 膽其發兩目不閉而赤 至二百二十四日 七變 生辛

金屬手太陰肺主藏魄生至二百五十六日四蒸八變

生庚金屬手陽明大腸其發藏熱而汗或不汗至二百八

十日五蒸十變生巳土屬足太陰脾主藏意與智至三百二

乳又手厥陰心胞絡與手少陽三焦二經俱無形狀故不

變而不蒸十變五蒸者天地之數以生成之然後生意志

能言語知喜怒故云始全也十變後六十四日為一大蒸

計三百八十四日長其經脉手足故手受血而能持物足

受血而能行立又六十四日為二大蒸計四百四十八日

則言語意各有異於前又六十四日為三大蒸計五百一

十二日變蒸於畢學語倚立扶步能食血脉筋骨皆輕則

牢稟氣盛者暗合而無外症稟氣弱者乃有蒸病輕則

筋汗微似驚

輕則發熱微汗重則壯熱吐且渴重則壯熱

或吐或汗或煩啼燥渴七八日始解與傷寒相似亦有變

蒸之後續感寒者如蒸於肝則目昏微赤蒸於肺則嚏

嗽毛聾隨

治貴平和汗下微

者微者微之不可妄治宜平和

症調治

飲子白茯苓一錢半人參甘草各五分升麻二分稟受弱者加白朮一錢水煎服變蒸前後三日各進一服可免百病及百日內亦宜。吐瀉不乳多啼者和氣散木香香附厚朴人參陳皮藿香甘草各等分姜棗煎服。宿乳者紫霜丸。痰熱者惺惺散。柴胡當歸寒熱過胃熱心煩啼叫不已者柴草各二分龍膽草防風各一分水煎服。有寒無熱者當歸湯當歸四分木香辣桂人參甘草各二分姜棗煎服。蒸熱甚者紫陽黑散。積熱寒熱如瘧者梨漿飲。

龜胸龜背

附解顙顙填顙陷滯顙

龜胸肺熱百合丹

妊孕及乳子時多食五辛炙博淹臙生下嬰孩或胸高起形如龜壯此乃肺經

受熱也行動喘乏但遇風寒或多食則痰嗽氣急喘滿肢體瘦悴久而不治將成疳勞之疾百合丹主之大黃三分

天門冬杏仁百合木通桑白皮甜葶藶石羔各五錢為末煉蜜丸如棗荳大每服一十五丸食後臨卧熟水化下

龜背客風松藥驗

嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓所致或小兒坐早偃僂背高如龜多

成痼疾間有灸肺俞膈俞炷粟米大艾三五壯收功內服松藥丹松花枳壳防風獨活各一兩麻黃前胡大黃桂心各五錢爲末煉蜜丸如黍米大每服十九或二十丸粥飲下量兒大小加減思之或外以烏龜尿點骨縫中効

解頤原是腎家虛

小兒年大頭縫開解而不合腎生髓腦爲髓海腎氣有虧腦髓不足所致凡腦

髓欠少如木無根不過十日終成廢人宜腎氣丸或八物湯加酒炒芩連外用南星白欬爲末醋調攤紅帛上烘熱貼之或顙頭骨燒灰油調敷縫中外作頭布遮護其父母宜服腎氣丸虎潛丸俾精血充足後育子女無是患也

風熱顙填脾虧陷

顙填者顙門腫起也脾主肌肉乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘脾以致臟腑

不調其氣上衝填脹顙高而突毛髮短黃自汗若寒氣上衝則勞鞠宜溫之熱氣上衝則柔軟宜涼之劑量輕重兼與調氣又有肝盛風熱交攻以致顙填突起者瀉青丸如因驚熱者驚風卽至○顙陷者顙門成坑也始因臟腑有

熱渴飲水漿。致成泄利。反則氣血虛弱。不能上充。腸胃受
顛。陷如坑。不得平肅。宜黃狗頭骨炙黃為末。鷄子清調服。
滯。願熱者。胃火炎。冷涎胃弱。不收飲。滯。願者。口涎流。出而
稠粘者。乃胃火炎上也。宜通心飲。或瀉黃散加減。○冷涎
自流者。乃胃虛不能收約也。宜朱香半夏丸。朱香半夏丁
香各五錢。白姜白朮青皮陳皮各二錢半。為末
蒸餅丸。麻子大。一歲十丸。二歲倍之。米湯灌下。

五軟五硬

五軟皆因稟受虧。行遲語遲齒髮遲。五軟者。頭項軟。手軟。

○頭軟。頭不能立。諸腎虧條。○項軟。天柱倒也。有吐瀉又
弱者。宜補脾胃。有傷寒不及發表成者。難治。○有所瞻伏
熱。面紅唇紅肌熱者。羊角散。炙羊角。白茯苓。虎脛骨。酸棗
仁。桂心。熟地。防風。甘草各等分。為末。每一錢。酒調服。或涼
肝丸。防風二錢。人參赤茯苓各一錢。黃芩芍藥。蔚子。黑參
大黃。知母各一兩。為末。蜜丸。粟豆大。量兒大小。食後茶清

下。兼治痘後目赤腫痛。○葛根氣入肝筋舒項軟者。天
枉丸。蛇含石一塊。大燄醋淬七次。麝香各少許。為末。
飯九龍眼核大。每一丸。刺背煎湯。或金銀薄荷煎湯化下。
○通用健骨散。單姜。薑。妙。末。每三五分。薄荷煎湯化下。
治久患喪疾體虛不食。及諸病後天柱骨倒。○外用生筋
散。木鱉子六箇。草麻子六十箇。俱去壳搗爛。先抱起兒頭。
摩項上。令熱。後用津液調勻貼之。効。○貼項方。生附子兩
星等分。為末。生薑自然汁調敷項軟處。○手軟。無力。以
動也。所受肝弱。兩手筋縮不能舒伸。意效丸。意效丸。當歸
秦元酸棗仁防風羌活各一兩。為末。蜜丸。灰實大。每一丸
至二丸。麝香荊芥煎湯化下。○脚軟行遲。乃骨髓不肅。氣
血不充。筋弱不能束骨。宜腎氣丸。加牛膝五加皮鹿茸五
六歲不能行者。羊角丸。羚羊角虎脛骨。生地酸棗仁白茯
苓各五錢。桂心防風當歸黃芪各二錢半。為末。蜜丸。包于
大。每一丸。或三丸。溫酒化下。三歲不能行者。用五加皮
兩。牛膝木瓜各五錢。為末。每一錢米飲入酒。以許。調服。
有脚指蹇。無力不能伸展者。海桐散。海桐皮。杜仲皮。黃
歸熟地牛膝各二錢。山茱萸補骨脂各一分。葱煎酒。○有

鷓鴣節風俗云鼓鼙風乃腎虛精髓內流為風邪所襲皮膚
不榮日漸枯瘠如鷓鴣脚之節宜腎氣丸加五加皮鹿茸牛
膝○身軟肉少皮膚自離飲食不為肌膚四君子湯紫皮
丸遍身筋軟者鹿茸四片九加當歸青蘆各等分○口軟
語遲嬰兒在胎母卒有驚怖驚氣乘胞絡之經使生子心
神不足舌本不通四五歲猶不能言菖蒲九石菖蒲人參
麥門冬遠志川芎當歸各二錢乳香硃砂各一錢為末蜜
九麻子大每十九米飲下○諸病後不能語者鷓鴣頭九雄
鷄頭一箇鳴蟬三箇俱炙焦大黃川芎甘草各一兩人參
木通各五錢當歸黃芪遠志麥門冬各三分為末蜜丸小
豆大每五九空心米飲下久服取効○齒遲因稟氣不足
則髓不能充骨宜腎氣丸或十全大補湯加知母黃柏外
用當歸川芎芍藥山藥沉香甘草各等分為末糝齒齲上
仍可白湯調服單方雄鼠屎汁粒每日用一粒搗齒齲上
至廿一日當生○髮遲乃血氣不能上榮旋蓉丸肉苁蓉
川芎當歸為藥熟地各等分為末蜜丸黍米大
或十九黑豆煎湯下仍磨化吞頭上○已上皆因稟受不
或因此為後致者可以滋補

五硬強直本風症若無癰硬無積醫直五硬者頭項四肢強

也宜小續命湯烏藥順氣散主之○腰大骨痛不寬者五積散加烏藥姜黃積消氣和則愈若心腹俱硬面青者死

丹毒 附胎毒

丹毒遊行走遍身病因濕熱逼心君丹名不一皆由丹食

或不甚乾即著濕熱侵淫心火驟盛以致毒與血搏而風乘之所以赤腫遊行遍身不定其始發於手足或頭面胸

背令人煩悶腹脹其熱如火痛不可言若入小兒陰囊如青傷者死拔毒涼肌審起處治法

針砭去血外用拔毒涼肌之藥敷○從頭頂上起用葱自然汁塗○從頭頂上紅腫痛用赤小豆為末鷄子清調塗

○從面上赤腫用蠶心土末鷄子清調塗○從背起用桑白皮末羊脂調塗○從兩背赤腫黃色柳木燒灰水調塗

○從兩脇虛腫用生鉄剉末入猪糞水調塗○從臍上腫起用乳香為末米醋調塗○從兩脚赤腫起用乳香為末

羊脂調塗。○從兩脚赤白點起。用猪槽下土為末。清油調塗。○從陰上起。用屋漏處土為末。羊脂調塗。○錢氏通用。

朴硝土硃為末。藍葉浮萍水苔同研絞汁調塗。或用朴硝一兩。大黃五錢為末。新汲水調。時時塗掃。○凡丹毒變易。

非輕。如經三日不入裏內消可救人。毒氣入裏。腹脹則死。治攻入臟腑即死。入裏內消可救人。紅內消散收之。紅內

消當歸茄片或茄蒂亦好。甘草荒活黃芩各五錢。麝香五分。為末。每二錢。生地黄煎湯調服。○通用五福化毒丹。犀

角消毒飲。四順清涼飲。人參敗毒散。加紫草。或升麻葛根湯。加白朮茯苓木香枳殼。大抵以清心火去濕熱為主。勿

令毒陷。有不可服胎瘡必先化其毒。次用父便刷如神。二

涼藥者。惺惺散妙。胎瘡必先化其毒。次用父便刷如神。二

歲生瘡遍身。先服五福化毒丹。或犀角消毒飲。外用父小便。驚翎蘸刷。濕者青黛末乾搽。更與丹毒通用條。參看。

內傷乳食類

吐瀉腹脹

五疳

諸積

癰病

八疳

乳嗽

疳

癰痛

吐瀉

吐瀉初生怎可當

解虛則瀉胃虛則吐。解胃俱虛吐瀉不止。久則變成慢驚與癇。○初生惡物未

下。但嘔黃汁者。木瓜丸。木水臍粉。不香檳榔。麝香各等分。為末。麩糊丸。小豆大。每一二丸。甘草煎湯下。○初生吐瀉

不止者。硃砂丸。硃砂。南星。巴霜各等分。為末。糊丸。黍米大。每二九。薄荷煎湯灌服下之。後以硃沉煎調之。硃砂二錢。

藿香三錢。滑石五錢。丁香十四粒。為末。用新汲水一盞。麻油滴成花。抄藥五分在上。須臾墜下。澄去水。別用溫水下。

○初生吐瀉。壯熱不思乳食。大便秘白。或不通者。停乳也。先宜紫霜丸下之。後用香檳餅。木香。橘皮。青皮各二錢半。

厚朴。神麩。麥芽。砂仁各五錢。為末。蜜丸。芡實大。每二九。紫蘇煎湯。米湯任化下。或加肉豆蔻。訶子。一切冷積泄瀉俱

効。治者先分身熱涼。寒吐腥臊瀉青白。熱吐酸臭瀉色黃。

初生及稍長嬰兒吐瀉。以身涼面黃瀉青白。吐腥臊者。為內傷寒乳。或外感風寒。以身熱面赤瀉黃赤。吐酸臭者。為

內傷熱食。或外感暑熱。○古方吐瀉身涼者。觀音散。○吐瀉身熱作渴者。錢氏白朮散。○吐瀉身溫。或乍寒乍熱。不思乳食。或食乳難化。大便青白。此上實下虛也。先宜益黃散。後宜四君子湯。隨五臟見症加減。如吐瀉肢厥顛陷。加藿香丁香。脾虛生風多困。加半夏麴。沒石子。及冬瓜子少許。驚啼痰癇。睡卧不安。加全蝎釣藤白附子。赤白痢。加歸芍藥米。白痢加乾薑粟。泄瀉加陳皮厚朴。傷風加川芎防風羌活細辛。發渴加乾葛。枇杷葉。及木瓜少許。挾風

必定增寒熱

傷風多作吐瀉。風木好侵脾土。故也。外症必增寒壯熱。時有頭疼咳嗽氣促。大槩熱者宜

先服大青膏。或釣藤散發散。後服益黃散補脾。冷者先服益黃散補脾。後服大青膏。或釣藤散發散。如吐驟或瀉完穀者。乃傷風甚也。大半夏湯。被濕腹脹溺不長。濕多身重。腹脹小水不利。平胃散主之。虛者異

攻散。○吐瀉作渴。溺澀者。五苓散。○壯熱體重。吐酸瀉濁者。濕兼熱也。羌活黃芩蒼朮甘草等分。水煎溫服。寒

多腹痛暑必渴

寒月吐瀉白色不渴者。益黃散。腹痛者理中丸。肢冷加附子。○久不止者。沒石子丸。

沒石子一箇。白豆蔻五箇。訶子二箇。木香黃連各一錢。爲末。飯丸。麻子大。每十五丸。米飲下。兼治疳痢。釀瀉。○暑月吐瀉。色黃引飲者。異攻丸。或玉露丸。石羔寒水石各一兩。甘草五錢。爲末。糊丸。黃豆大。每一丸。冷水下。吐不止。薑湯下。○久不止者。古連栢丸。黃連黃栢各一兩。爲末。入猪膽汁內煮丸。菉豆大。每廿丸。米飲下。○抑論二症多見於夏秋。如立夏前後濕熱時行。暴吐瀉者。蘇葛湯。夏至後吐瀉身熱。或傷乳食瀉。淡黃者。益元散。合四苓散。加蒼朮。爲末。溫水調服。大暑後吐瀉身溫。或傷乳食瀉。黃白者。食前服益元散。食後服益元散。立秋後吐瀉身涼不食。多睡多噦。不渴者。頻服益元散。少服益元散。秋分後吐瀉身冷不食。瀉青褐水者。益元散。瀉臭。乳食必傷。內傷乳食不化。面黃腹脹。瀉如抱壤。鷄卵臭者。消乳食丹。丁香木香青皮肉豆蔻三稜莪朮各等分。爲末。糊丸。麻子大。每五丸。米飲下。○小便不清者。胃苓湯。加肉豆蔻。爲丸。米飲下。○腹痛吐乳者。平胃散。合蘇合香丸。蜜調。米飲下。○挾痰者。二陳湯。加山查麥芽白朮烏梅。熱加黃連。寒加乾薑。○危甚者。燒針丸。黃丹一兩。或加枯礬等分。爲末。棗

肉丸芡實太每服一丸。用針挑於燈焰上燒存性。乳汁或米泔冷水任化下。此藥清鎮專主吐逆及瀉。大人亦宜。

內虛失音爲腎怯。吐瀉五內俱虛。有失音者乃腎怯也。腎氣丸主之。凡大病後失音者可。**食**

少氣陷損胃陽。吐瀉久不止者。乃清氣下陷。胃口陽虛。飲食少進。四肢無力。升陽益胃湯主之。或異

攻散。虛渴者。**但食卽吐先除積。**內傷乳食。面色青白發熱。錢氏白朮散。

乳食丹。取積消導寬利胸膈。如嘔甚者。只用白豆蔻砂仁等分。甘草減半。爲末乾糝芽兒口中凡喫乳喫物飲水不

下者宜。或燒針丸亦妙。○冷氣入胃嘔吐不已者。四君子湯加白豆蔻砂仁肉豆蔻山藥爲末。或蜜丸每一錢。木瓜

紫蘇煎湯下。○脾胃虛弱逆痰含哭飲乳食物停滯不散。腹滿嘔吐。見乳者。四君子湯加南星砂仁丁香藿香冬瓜

子薑煎服。或啓脾丸。○嘔而不止痰涎在喉有聲將作驚者。二陳湯加丁香藿香或抱龍丸主之。○因驚氣逆而吐

者。大溫驚丸。○吐而湯水不納者。五苓散。○吐涎痰熱者。白玉餅下之。冷者溫之。有吐沫或白綠水者。胃冷也。理中