

醫  
四  
書



醫四書

上海古籍書店複印  
四冊 定價二十二元

四二·一·三五〇·八〇·三



醫鏡序

嘗觀許氏鳴醫自巢由而下漢  
有許定晉有許遜隋有許智藏  
唐有許孝崇許胤宗宋有許叔  
微許洪皆能淵造醫闈而著書  
立言師表萬世者也許君培元



學躋董賈文偏司韓而所以求  
益者毋論江之左右雖薄海內  
外未始不爲之屈一指也余嘗  
器其才而勸之應試乃有感而  
曰富貴有命不可强也與其登  
庸於仕籍而危見忌于同朝孰



若繼承醫術以躋斯人於仁壽  
之域哉遂取家傳的本及歷代  
以來方書細玩潛研三爲裘葛  
而工其術故上自王侯大臣下  
至里井間術凡有患者沾其七  
劑經其療理煥然如赫日之消



南京中医药大学图书馆版权所有  
南京中医药大学 1951

凍灑然如執熱之濯清顛以慈  
仁爲念未嘗要謝故澤被生靈  
名驚昭代而亘古醫流所罕覩  
焉者也復自念曰醫之道大矣  
古人之言亦夥矣苟不反之以  
約而識之以籍則使後之業者

將何取衷哉於是博采諸家審  
脉論證辨名定經微妙之語與  
夫用藥君臣佐使寒熱溫平緩  
急之方備著於書曰診翼曰醫  
辯曰藥徑曰素問評林曰醫家  
四書曰傷寒解惑曰女科要論

曰衍嗣寶訓曰痘疹筆議曰外  
科集驗盛行於世矣尤憇其難  
於記誦故復出家藏秘訣編成  
詩括以便之余閱之累日見其  
旨遂而理明言簡而意盡雖中  
醫執此施治可以奏功如病者



知之亦不爲庸醫所誤真醫家  
之鍊鑑而深幸是編不可少也  
遂名之曰醫鏡以溥其傳凡有  
志於此者果能熟而通之不圖  
經而百草吾嘗矣不素難而岐  
扁其再生矣不長沙而傷寒昭



融宣朗矣不守真而熟證光明  
洞達矣不明之而內外傷舌辯  
矣不彥修而大成吾集矣若登  
雲臺而識璿璣之要訣則天文  
可笞入武庫而得門鑰之要樞  
則器具畢舉所謂捷徑一通不

待騁驥而千里可適者信然矣  
否則雖善奔如慶忌且告病焉  
而矧於踟蹰不進者哉夫西施  
家多爛色而冀北多神駒他日  
步前躅而鳴于天下者詎可謂  
無其人古人云莫爲于前雖美



南京中医药大学图书馆版权所有  
为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertonge.com](http://www.ertonge.com)

而弗彰莫爲於後雖盛而弗傳  
是集也美而彰盛而傳者歟

萬曆丙戌孟夏吉旦

賜進士出身中順大夫知江西  
九江府事前刑部河南清吏司  
郎中吳秀頃首撰



醫鏡卷上

明贈光祿大夫少保大學夫醫院院使秀菴崇儒鑒定

明吳興山人培元許兆禎輯著

中風

風爲天地之浩蕩或中腑兮或中臟或中血脉  
或中經善行數變難名狀腑中風邪着四肢惡  
寒拘急脈浮遲中臟唇緩滯九竅便塞不語氣  
難舒中血脉則口眼歪又有中經亦要知六經  
無證溺調和口不能開肢不持諸家之論各偏  
主若還拘泥枉勞思從來邪湊氣必虛是以東



南京中醫藥大學  
南京中醫藥大學圖書館版權所有

垣獨主氣河間主火丹溪濕元戎酒毒傷脾胃  
其原大率主血虛亦有氣虛兼瘀治中有挾火  
與濕者總以治瘀補養次治瘀須評三陳方  
陳甘半應相當外加竹瀝生薑汁磨入沉香與  
木香在左屬血右屬氣血虛加芍芎歸地瘀血  
桃仁與紅花氣虛參术芪同劑盜汗遺尿亦如  
之小便不利不可利風盛自汗身體痛防風羌  
活并薄桂頭目不利或頭疼芎芷蔓荆辛芥穗  
項痛去芎易藁本酒炒片芩同其類無汗身疼  
加羌芷芎防蒼术秦艽配心血虧欠神恍惚黃

連遠志菖蒲石。或心動搖驚悸者。酸棗茯神焰  
側柏風痰熾盛加南星。防枳皂角括萎仁。食鹽  
麵蘖連查實甚者還須吐下。

### 中寒

中寒傷寒殊非一。傷則漸深中直入。或因外受  
肅殺氣或因內傷生冷物卒然口噤并失音。四  
肢強直不知人。脈來沉軟而無力。加味理中湯  
可尋。參木乾薑并肉桂。茯陳甘半與細辛。加煨  
生薑五大片。服入薑汁一盞半。仍用薑粗炒極  
熟絹包腹上熨有驗。惡寒甚者麻黃加。挾氣攻

刺木香。重而腹痛全無。脈嘔吐瀉痢無休息。  
加炮附子去皮臍。依舊加薑。并薑汁。但見目紅  
知附毒解之。汁取生蘿菔。犀角甘草及黃連。此  
法施之功最速。

### 暑

脉虛身熱傷暑病。暑入口齒心主應。大渴倦怠  
背惡寒。自汗毛聳心煩悶。四肢微冷。吐瀉兼身  
體。但無疼痛證。加減香薷湯可施。麥冬五味茯  
陳皮扁豆黃連及甘草。燈心薑棗水煎之。柴胡  
加上。因身熱元氣不足。共參芪。嘔加半夏。須薑

炒渴用天花此最宜。小水不利或短赤澤瀉山  
梔加入歟。或自汗兮或水瀉升麻白朮總相陪。  
頭痛川芎石膏好。痰悶瓜蔞枳實隨俱可。益元  
散滑石六錢甘草一錢常服。熱渴虛煩効更奇。

### 濕

東南之地恒多濕。居民感受茲非一。或受山嵐  
雨霧蒸或過飲冷因而得。小便短赤身體重骨  
肉痠麻行不疾漸加浮腫及身黃加減滲濕湯  
可識陳皮半夏茯苓甘厚朴黃連蒼白朮煎用  
燈心棗與姜臨服二匙鹽可入外濕寒熱身腫