

同治丙寅冬刊

增輯傷寒類方

古吳潘氏藏板



曩余官京師稔潘君偉如之孝以
子締姻好時偉如讀儒門事親
書知
醫未精也嗣習西醫同知獄秩卑不足
展抱負慨然曰活國非我分獨不能
活人乎爰集古今岐黃家言研究
之由博返約探本窮源遂契靈素難



經冰旨而窺仲景之奧值粵氛起驛
路阻遣戍之犯留禁拱極城多疾疢
偉如日按視處方親予之湯獄苦死
者由是遠近爭求療治罔不應亦罔
不效名噪甚咸寧五年七月應

召至京進



壽康宮視脈迺奇矣其令天津牧昌
平也皆廣施良藥以已境內之疾迺擢
天津守兵火新經疫大作偉如妙
製一方銀板傳布全活無算今偉
如以監目典按東海誠和中外晉都特
銜受任自重駸々乎收擴其向之活人



者而活國矣然活人之志不稍懈
所讀傷寒類方暨神農本草學長沙
歌括傷寒附法都為編將付手民以
便後學誦習適余玉之果出以相示
且曰仲景傷寒論與金匱相表裏
學者必先讀傷寒論次讀金匱方



識經治又曰傷寒論之六經即百病之
六經病雖百變經則有常凡臨證
以上經為主治病必無差謬若不究病
根祇以多熱為陰虛多寒為陽虛特
偽術耳孫愈病手出憶丁巳戊午間
偉如房都門士大夫競相延致他



醫不能治之疾得偉如一方即主起
目擊其拯救之神而今所纂述
技論乃平易若此可令醫無奇術惟
在取法乎上熟讀深思毋泛騫毋嗜
奇毋惑於邪說庶幾古昔活人之法日
益講明而天下可無夭札願以告世



讀是書者同治四年八月下泮
安沈丙鑒敘



南京中醫藥大學圖書館藏

四

原序

王叔和傷寒例云。今搜採仲景舊論。錄其證候。診脈聲色。對病眞方。擬防世急。則知傷寒論。當時已無成書。乃叔和之所搜集者。雖分定六經。而語無詮次。陽經中多陰經治法。陰經中多陽經治法。叅錯不一。後人各生議論。每成一書。必前後更易數條。互相訾議。各是其說。愈更愈亂。終無定論。不知此書非仲景依經立方之書。乃

救。誤。之。書。也。其。自。序。云。傷。天。橫。之。莫。救。所。以。尋
求。古。訓。博。採。眾。方。蓋。因。誤。治。之。後。變。症。錯。雜。必
無。循。經。現。症。之。理。當。時。著。書。亦。不。過。隨。症。立。方。
本。無。一。定。之。次。序。也。余。始。亦。疑。其。有。錯。亂。乃。探
求。三。十。年。而。後。悟。其。所。以。然。之。故。於。是。不。類。經
而。類。方。蓋。方。之。治。病。有。定。而。病。之。變。遷。無。定。知
其。一。定。之。治。隨。其。病。之。千。變。萬。化。而。應。用。不。爽。
此。從。流。溯。源。之。法。病。無。遁。形。矣。至。於。用。藥。則。各

有條理解肌發汗。攻邪散痞。逐水驅寒。溫中除熱。皆有主方。其加減輕重。又各有法度。不可分毫假借。細分之不外十二類。每類先定主方。卽以同類諸方附焉。其方之精思妙用。又復一一注明。條分而縷悉之。隨以論中用此方之症。列於方後。而更發明其所以然之故。使讀者於病情藥性。一目顯然。不論從何經來。從何經去。而見症施治。與仲景之意。無不吻合。豈非至便之

法乎。余纂集成帙之後。又復鑽窮者七年。而五
易其稿。乃無遺憾。前宋朱肱活人書。亦曾彙治
法於方後。但方不分類。而又無所發明。故閱之
終不得其要領。此書之成。後之讀傷寒論者。庶
可以此爲津梁乎。

乾隆二十四年歲在屠維單闕陽月上浣涇溪
徐大椿序

增輯傷寒類方目錄

卷一

桂枝湯類一方十九

麻黃湯類二方六

葛根湯類三方三

柴胡湯類四方六

目錄



長沙方歌括

古閩陳念祖原本

貴州蕭庭滋

增輯

古吳潘

霽

古越汪

均校閱

桂枝湯歌

項強頭痛汗憎風桂芍生
姜三兩同棗十二枚甘二
兩解肌還借粥之功按桂
枝辛溫陽也芍藥苦平陰
也桂枝又得生薑之辛同
氣相求可恃之以調周身

傷寒論類方

古吳潘

霽增輯

茗上趙斯鏞校

吳江徐大椿編釋

桂枝湯

一

桂枝

三兩
去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩
炙

生姜

三兩

大棗

十二
枚擘

右五味。以水七升。微火



之陽氣。芍藥而得大棗。甘草之甘。苦甘合化。可恃之。以滋周身之陰液。師取大補陰陽之品。養其汗源。為勝邪之本。又啣粥以助之。取水穀之津。以為汗。汗後毫不受傷。所謂立身於不敗之地。以圖萬全也。桂氣味辛溫無毒。主上氣欬逆。結氣喉痺。吐吸利關節。補中益氣。久服通神。輕身不老。上品芍藥氣味苦平無毒。主治邪氣腹痛。除血痺。破堅積。寒熱疝瘕。止痛利小便。益氣。中品甘草氣味甘平無毒。主五藏六府寒熱邪氣。堅筋骨。

煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已須

臠。啣熱稀粥一升餘。以助藥力。桂枝本不能發

汗。故須助以熱粥。內經云。穀入於胃。以傳於肺。肺主皮毛。汗所從出。啣粥充胃。氣以達於肺也。觀此可知。傷寒不禁食矣。溫覆令一時許。遍

身。熱微似有汗者。益佳。不可令如水

流。漓病不必除。此解肌之法也。若如水

流漓則動營氣。衛邪仍

長肌肉倍氣力。金瘡腫。解毒。久服輕身延年。上品。
 乾薑氣味辛溫無毒。主治胸滿欬逆。上氣溫中止血。出汗逐風溼痺。腸澼下痢。生者尤良。中品。
 大棗氣味甘平無毒。主心腹邪氣。安中養脾。氣平胃氣。通九竅。助十二經。補少氣。少津液。身中不足。大驚。四肢重。和百藥。久服輕身延年。上品。

在。

若一服汗出病瘥。停後服。不必盡劑。

若不汗更服。依前法。又不汗。後服小促。

其間半日許。令三服盡。若病重者。一日

一夜服。周時觀之。服一劑盡。病症猶在。

者更作服。若汗不出。乃服至二三劑。

桂枝

湯全料。謂之一劑。三分之一。謂之一服。古一兩。今二錢零。則一劑之藥。除姜棗。

僅一兩六錢零一服不過五錢零矣。治傷寒大症。分兩不過如此。一服即汗。不再服。無汗。服至二三劑。總以中病為主。後世見服藥得效者。反令多服。無效者。即疑藥誤。又復易方。無往不誤矣。禁生冷粘滑肉麪五

辛酒酪及臭惡等物。

太陽中風。陽浮而陰弱。風在外故陽脈浮。衛氣有邪則

不能護營。陽浮者熱自發。風為陽邪。故發熱。桂枝之