





第七七三册

四庫全書

●上海古籍出版社

● 上海古籍出版社

本草綱目

本冊目次

本草綱目(二)

明 李時珍撰……………一

本草綱目

欽定四庫全書

子部
本草綱目卷十二下

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勛

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣徐彩

欽定四庫全書

本草綱目卷十二目錄

草部

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根莖柔交

于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草中有木木中有

草得氣之粹者為良得氣之戾者為毒故有五形焉金木水火土

五氣焉香臭腥臊五色焉青赤黃白黑五味焉酸苦甘辛鹹五性焉寒熱溫涼

五用焉升降浮沉炎農膏而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋

明賢良醫代有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出涇渭

不分苟不察其精微審其善惡何以權七方衡十劑而寄死

生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱分目除穀米

外凡得草屬之可供醫藥者六百一十種分為十類曰山曰

芳曰隲曰毒曰蔓曰水曰石曰苔曰雜曰有名未用舊本草部上中下

下三品共四百四十七種今併入三十一種移二十三

種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木

部移併一十四種蔓草二十九種菜部移併一十三

種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種
神農本草經一百六十四種 梁陶弘景註

名醫別錄一百三十種陶弘景註七十種有名未用

李氏藥錄一種魏李當之 吳氏本草一種魏吳普

唐本草三十四種唐蘇恭 藥性本草一種唐甄權

本草拾遺六十八種唐陳藏器 食療本草二種唐孟詵

海藥本草四種唐李珣 四聲本草一種唐蕭炳

開寶本草三十七種宋馬志 嘉祐本草一十七種宋掌禹錫

圖經本草五十四種宋蘇頌 日華本草七種宋人大明

用藥法象一種元李杲 本草補遺一種元朱震亨

欽定四庫全書
本草綱目
卷十二目錄
本草會編一種明汪機 本草綱目八十六種明李時珍

附註宋雷斅地灸論 北齊徐之才藥對

唐楊損之刪繁 唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註 南唐陳士良食性

宋寇宗奭衍義 唐慎微證類

陳承別說 金張元素珍珠囊

元王好古湯液 吳瑞日用

明汪穎食物 王綸集要

草之一 山草類上三十一種

甘草本經

黃耆本經

人參本經

沙參本經

薺芫別錄

桔梗本經

長松拾遺

黃精別錄

萎蕤本經

知母本經

肉蓯蓉本經

列當開寶

瑣陽補遺

赤箭天麻本經

木本經

狗脊本經

貫衆本經

欽定四庫全書
本草綱目
卷十二目錄

三蛇附

三

已戟天本經

遠志本經

百脉根唐本

淫羊藿本經

仙茅開寶

玄參本經

地榆本經

丹參本經

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二目錄

紫參本經

王孫本經

紫草本經

白頭翁本經

白及本經

三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

本草綱目卷十二目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

明李時珍撰

草之一山草類上
一十三種

甘草本經

釋名密甘別錄密草別錄美草別錄路草別錄靈通北事國老

劉錄弘景曰此草最為藥之主經方少有不用者猶如香中有沈香也國老即帝師之稱雖非君而為君所宗是以龍安和淳石而解諸毒也甄權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解一千二百般草

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

木毒調和衆藥有功故有國老之號

集解別錄曰甘草生河西南川谷積沙山及上郡二月

郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸道中來亦皮斷理看之堅實者是抱單草最佳抱單乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間有而不如入有紫甘草細而實之時亦可蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似桑冬結實作角子如單豆根長者三四尺粗細不定皮赤色土有橫梁梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細勤者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云藎大苦郭璞註似地黃又詩唐風云采芩采芩首陽之藎是也藎與芩通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生

處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅薑大苦之註為甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而穗濤似有白毛結角如相思角作一本生至熟時角折子扁如小豆極堅齒啣不破今出河東西界寇氏行義亦取此說而不言大苦非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近之今人惟以小者經寸而結緊斷文者為佳謂之粉草其輕虛細土人皆不及之錫積靈雪錄言安南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根修治雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每用切長三寸學作六七片入甕器中或用酒浸蒸從巳至午取出暴乾剉細用一法每斤用酥七兩塗炙酥盡為度又法先炮令內外赤黃用時珍曰

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

方書炙甘草皆用長流水煎濕炙之至熟刮去赤皮或用滾水炙熱未有酥炙酒蒸者大底補中宜炙用瀉火宜生用

氣味甘平無毒寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則溫王好古曰氣薄味厚升而浮陽也入

足太陰厥陰經時珍曰通入手足十二經徐之才曰木苦參乾漆為之使惡志遠反大戟芫花甘遂海

藻權曰忌豬肉時珍曰甘草與藻戟蓬芫四物皆反而胡洽居士治痰涎以十棗湯加甘草大黃乃是痰

在膈上欲令通泄以拭去病根也東垣李果治項下結核消腫腫堅湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵蓮心

飲用芫花二方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶弘景言古方亦有相惡相反並乃不為害非妙達精

微者不能知此理
主治五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍氣力金瘡腫解毒久服輕身延年本經時珍切腫也溫

中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉血氣解

百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種

草列主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣

內傷令人陰不痿主婦人血滯腰痛凡虛而多熱者

加用之甄權安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩

悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨明生用瀉

火熱熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

脾胃潤肺李果吐肺痿之膿血消五發之瘡疽好解小

兒胎毒驚癇降火止痛時珍

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮玄胡索

苦楝子尤妙元素

頭主治生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血消腫

導毒震亨主癰腫宜入吐藥時珍

發明震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德載

薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以甘甘

溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心

火炎之則氣溫補三焦元氣而散寒除邪熱去咽
痛緩正氣養陰血凡心大寒脾腹中急痛腹皮急縮
者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭
故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者
用之得其平好古曰五味之用苦泄辛散酸收鹹收
甘上行而發而本草言甘草下氣何也蓋甘味主中
有升降浮沉可上可下可外可內有和有緩有補其
泄居中之道蓋矣張仲景附子理中湯用甘草恐其
得上也調胃承氣湯用甘草恐其速下也皆緩之用
意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用
甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩
脾急也風髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘
補之意又曰甘草令人中滿而用炙甘草為之補若
中滿而用生甘草為之獨能引諸藥直至滿所甘味
入脾歸其所喜凡升降浮沉之理也經云以甘補之

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

以甘瀉之以甘緩之是矣時珍曰甘草外赤中黃色
兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元老之功
普治百邪得王道之化贊帝力而人不知飲神功而
己不與可謂藥中之良相也然中滿嘔吐飲客之病
緩不可以致昏昧而君子當見嫉於宵人之意與
頌曰揀揀思選千金方論云甘草解百藥毒如湯沃
雪有中烏頭巴豆毒甘草入腹即定驗如反掌方稱
大豆汁解百藥毒予每試之不效加八甘草為甘豆
湯其驗乃奇也又葛洪時後備急方云席辨刺其法
言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法
乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得
其詳凡飲食時先取炙熟甘草一寸嚼之熱汁若中
毒隨即吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮
二升日三服或用都淋藤黃藤二物酒煮溫常服則
毒隨大小洩出又常帶甘草數寸隨身備急若經合

甘草而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土
常山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

附方新舊十五傷寒心忤脈結代者甘草二兩水三升

類傷寒咽痛少陰證甘草湯主之用甘草二兩水

要仲景論肺熱喉痛有痰者一升甘草炒二兩桔梗末

傷寒論肺熱喉痛有痰者一升甘草炒二兩桔梗末

入阿膠半斤煎肺痿多涎肺痿吐涎沫頭眩小便數

服錢乙直訣肺痿多涎肺痿吐涎沫頭眩小便數

乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑地二兩水三升

升姜一升五分合分服張仲景景金匱要略三兩炙甘草

嗽日取小便三合調甘草末一錢服之廣利方

小兒熱嗽甘草二兩豬膽汁浸五宿炙研末蜜丸

豆大食後薄荷湯下十九名涼膈丸

惠初生解毒小兒初生未可便與珠砂蜜只以甘草

綿染點兒口中可為一規規當吐出水出胸中惡汁此後

待兒饑渴更與之令兒智慧無病出痘稀少王璵

運初生使閉甘草枳殼煨各一錢水盪小兒撮口用生

甘草二錢半水半盪煎六分溫服玉嬰兒目澀內

疾涎後以乳汁點兒口中金匱玉函嬰兒目澀內

目閉不開或腫差明或出血者名慢肝風用甘草一

載以豬膽汁炙為末每用米泔調少許灌之

新小兒遺尿服之危氏得效方小兒尿血甘草一兩
合煎二合一歲兒一日小兒羸瘦甘草三兩炙為末
服盡姚和衆至寶方小兒羸瘦蜜丸綠豆大熱溫水
服五九玉函大人羸瘦甘草三兩炙每旦以小便煮三
服金匱玉函大人羸瘦四沸頓服之良外臺秘要

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

五

赤白痢下

在宣州街所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水煎水一升半煎取八合服之立效

用甘草一兩炙肉豆蔻七個
煨到以水三升煎一升分服
舌腫塞口不立效
煎濃湯熱漱頻

吐聖藥
太陰口瘡
甘草二寸白礬一兩
保命集發背癰疽
亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘

草三大兩生搗篩末大麥麴九兩和一分取好酥上許八
內下沸水搜和餅狀方圓大於瘡一分熱傳腫上以絛
片及改紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成

者腫便內消仍當與黃芪粥為妙
又法甘草一大兩水炙根碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿

平明以物攪令沫出去沫服之但諸般癰疽
是瘡腫發背皆甚效
蘇頌國經諸般癰疽微火切以

酒一斗中浸數中用黑鉛一片溶成汁投酒中取出
如此九度令病者飲酒至醉寢後即愈也
經驗方

欽定四庫全書

本草綱目卷十三上

切癰疽諸發預期服之能消腫運毒使毒不內攻功
宿搗取濃汁再以蜜糊過銀石器內慢火熬成膏以
諸收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者亦

解之或微利無妨名癰疽秘塞
生甘草二錢半并水煎服能疎導下毒物
國老膏外科精要方

指乳癰初起仍令人唾之
直指方些小癰癰即愈
草節晒乾為末熱酒服之
二錢連痘瘡煩渴粉甘草

根等分水煎服之
甘草能通陰下懸癰
生於後初發如松

血脈發瘡癰也
直指方陰下懸癰
後初發如松

子大漸如蓮子數十日後亦腫如桃李成膿即破
則難愈也周橫文甘草一兩四寸截斷以深澗長流

水一盞河水并水不用以文武火慢慢煎水炙之自
早至午令水盡為度劈開視之中心水潤乃止細到

用無灰好酒二小盞煎至一盞溫服次日再服便可
保無虞此藥不能急消過二十日方得消盡與化守

康朝病已破衆醫拱手服此二劑即合陰頭生瘡
口乃詔州劉從周方也
李迅癰疽方陰頭生瘡

甘草末頻頻塗之
陰下濕瘡
甘草湯洗之次以黃

腫痛
甘草煎湯漬凍瘡發裂
甘草煎湯洗之次以黃

麻油調傳
湯火瘡灼
甘草煎湯洗之次以黃

真麻油浸之年久愈妙
每用時小兒中蠱欲飲者甘

吐出一盞煎五分服當
牛馬肉毒甘草煎湯洗之次以黃

渴不可飲水飲之
飲饌中毒
甘草煎湯洗之次以黃

欽定四庫全書

本草綱目卷十三上

活金匱水菰若毒
菜中有水菰若毒葉圓而光有毒
吐以甘草煮汁服之即

解金匱玉函妙方
誤食令人狂亂狀若中風或作

黃耆

上品

釋名黃耆
綱目戴樸木
經戴樸名獨樸支草別錄又

別王孫藥性論
時珍曰耆長也黃耆色黃為補藥

乃著龜之著音尸王
錄與牡蒙同名異物

集解別錄曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中二月十月
今亦難得次用黑水宕昌者色白肌理粗新者亦甘

而溫補又有紫皮白水者色理勝蜀中者而冷補又

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

必傷人命當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中以甘寒瀉火以酸涼補金使金旺火衰風木自平矣今立黃者湯瀉火補金益土為神治之法用炙黃者二錢人參一錢炙甘草五分白芍藥五分水一大盞煎半盞溫服按曰蕭山親直著博愛心鑑三卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證順者為吉不用藥逆者為凶不必用藥惟險乃悔春之象當以藥轉危為安宜用保元湯加減此方原出東垣治慢驚土衰火旺之法今借而治痘以其內固營血外疏衛氣滋助陰陽作為膿水其證雖異其理則同去白芍藥草一錢生薑一錢水煎服之陰證者初出圓暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也既出雖起慘色乾紅也漿行色反不榮也漿定光潤不消也漿老濕潤不明生癰腫也癰潰而欬遲也凡有諸證並宜此湯或

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

加芎藭加官桂加糯米以助之詳見本書嘉慶曰人參補中黃者實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄急卧脹滿痞塞神短脈微者當以人參為君黃者為臣若表虛自汗亡陽瀉瀉瘡瘡者當以黃者為君人參為臣一也

附方 舊五 新九 小便不通 綿黃者二錢水二盞煎一盞酒

疸黃疾 心下懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致黃者二兩木蘭一兩為末酒服方寸七

治渴補虛 男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面下經方治渴補虛色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡瘡或先癰疽而後發渴並宜常服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽之疾用綿黃者箭蘇者去

蘆六兩一半生焙一半以鹽水潤濕飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩一半生用一半炙黃為末每服二錢煎服名黃芪六一湯 外科精要 老人閱塞 陳皮去

白各半兩為末每服三錢用大麻子一合研爛以水遮漿煎至乳起入白蜜一起再煎沸調藥空心服甚無秘塞之患此藥不冷不熱常服

腸風瀉血 黃者黃丸未乾細丸綠豆大每服三十 尿血沙淋痛不可忍丸未飲下 孫用和秘寶方

等分為末以大蘆薈一個切一拈厚大四五片安二兩淹炙令盡不令焦點末食無時以鹽湯下 永類

吐血不止 黃者二錢薑蜜水浮萍五錢為末方

膿血 咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以好黃者四兩甘草一兩為末每服二錢點湯服 席延實方

肺癰得吐黃者二兩為末每服二錢水一中盞

瘡膿生足趾甲邊赤肉突出時常舉發者黃者二兩

二合絞去滓以封瘡口上日胎動不安腹痛火黃汁

三度其內自消外臺秘要胎動不安腹痛火黃汁

各一兩糯米一合水一升陰汗濕痒綿黃者酒炒為

煎半升分服婦人良方陰汗濕痒綿黃者酒炒為

瘰癧妙方趙真瘰癧內固黃者人參各一兩為末入真

人參本經上品

欽定四庫全書本草綱目卷十二上

草錄別名音或黃黃參血參別名人街鬼蓋本神

浸新長成者根如人形有神故謂之人參神草漢字

從浸亦浸漸之義浸即浸字後世因文字繁運以參

星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟

張仲景傷寒論尚作蓮字別錄一名人微微乃蓮字

鬼蓋其在五成有階級故曰人街其脾胃生陰血故有黃

參血參之名得地之精靈故有土精地精之名廣五

尺不得去宅一里許見人參枝葉異常掘之入地五

莖葉主治療渴及筋攣癰腫瘡瘻別錄

本經上品

欽定四庫全書

草錄別名音或黃黃參血參別名人街鬼蓋本神

浸新長成者根如人形有神故謂之人參神草漢字

從浸亦浸漸之義浸即浸字後世因文字繁運以參

星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟

張仲景傷寒論尚作蓮字別錄一名人微微乃蓮字

鬼蓋其在五成有階級故曰人街其脾胃生陰血故有黃

參血參之名得地之精靈故有土精地精之名廣五

尺不得去宅一里許見人參枝葉異常掘之入地五

利則神草之光明人參不生觀

集解別錄曰人參竹刀刮暴乾無令見風根如人形

者有神善曰或生邯鄲三月生葉小銳枝黑莖有毛

三月九月采根根有手足面目如人者神弘景曰上

黨在冀州西南今來者形長而黃狀如防風多潤實

而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨者

次用高麗者高麗即是遼東形大而虛軟不生花紫色

並不及上黨者其草一莖直上四五相對生花紫色

高麗人作人參讚三根五葉背陽向陰欲來求我

擬樹相尋根音實樹似相甚大陰廣則多生采作甚

有法今近山亦有但作之不好恭曰人參見用多是

高麗百濟者潞州太行紫團山所出者謂之紫團參

保升曰今沁州遼州澤州冀州平州易州檀州幽州

榆州并州並出人參蓋其山皆與太行連亘相接故

也項曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘以

杉木夾定紅絲纏飾之及沙州參短小不堪用頃曰

今河東諸州及泰山皆有之又有河北權場及閭中

本經上品

欽定四庫全書

草錄別名音或黃黃參血參別名人街鬼蓋本神

浸新長成者根如人形有神故謂之人參神草漢字

從浸亦浸漸之義浸即浸字後世因文字繁運以參

星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟

張仲景傷寒論尚作蓮字別錄一名人微微乃蓮字

鬼蓋其在五成有階級故曰人街其脾胃生陰血故有黃

參血參之名得地之精靈故有土精地精之名廣五

尺不得去宅一里許見人參枝葉異常掘之入地五

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

上黨者根頗纖長根下垂有及一尺餘者或十歧者

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

上黨者根頗纖長根下垂有及一尺餘者或十歧者

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

參走必大喘含者氣息自如其人參乃真也宗典曰

欽定四庫全書

本草綱目

十四

其價與銀等稍為難得土人得一窠則置板上以新
 絲絨飾之嘉謨曰紫園參紫色稍扁百竇長白堅且
 圓名曰條參俗名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚俗
 名黃參獨勝高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖
 人形者神其類雖難辨力洪時珍曰上堂今潞州也
 民以人參為地方害不復採取今所用者皆是遼參
 其高麗市亦濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參獨來
 中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋末
 者堅實春夏采者虛軟非地產有虛實者皆以沙參
 者黃潤色如防風去皮者堅白如粉傷者皆以沙參
 薺芫桔梗求根造作乳之沙參體虛無心而味淡薺
 芫體虛無心桔梗體堅有心而味苦人參體實有心
 而味甘微帶苦自有多餘俗名金井玉蘭也其似人
 形者謂之孩兒參尤多賈偽宋蘇頌圖經本草所繪
 潞州者三根五葉真人參也其蘇州者乃沙參之苗
 葉沁州兗州者皆薺芫之苗葉其所云江淮土人參

修治

弘景曰人參易蛀惟納新器中密封可經年
 不壞炳曰人參頻見風日則易蛀惟用盛過麻

油瓦罐泡淨焙乾入華陰細辛與參相間收之密封
 可留經年一法用淋過薑反晒乾收亦可用李言聞

曰人參生時背陽故不喜風日凡生用宜吹咀熟
 用宜隔紙焙之或醇酒潤透吹咀焙熟用並忌鐵器

根氣味甘微寒無毒別錄曰微溫善曰神農小寒桐

素曰性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽中之陽也

又曰陽中微陰之才曰茯苓馬蘭為之使惡凌疏

欽定四庫全書

本草綱目

十五

肉鹹反藜蘆一云畏五靈脂惡皂莢黑豆動紫石英
 元素曰人參得升麻引用補上焦之元氣瀉肺中之
 火得茯苓引用補下焦之元氣瀉腎中之火得麥門
 冬則生脈得乾薑則補氣氣元曰得黃耆甘草乃甘溫
 除大熱瀉陰火補元氣又為瘧疾聖藥震亨曰人參
 入手大陰與藜蘆相反服參一兩入藜蘆一錢其功
 盡廢也言聞曰東垣李氏理脾胃瀉陰火交泰丸內
 用人參皂莢是惡而不惡也古方瘧疾用四物湯加
 人參五靈脂是畏而不畏也又瘧疾在胸膈以人參
 藜蘆同用而取涌越是激其怒性也此皆精微妙奧
 非達權衡者不能知

主治補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪
 氣明目開心益智久服輕身延年本經瘵腸胃中冷心
 腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破
 堅積令人不忘別錄主五勞七傷虛損痰弱止嘔噦補
 五臟六腑保中守神消胸中痰治肺痿及癰疾冷氣
 逆上傷寒不下食凡虛而多夢紛紜者加之甄權止煩
 躁變酸水李消食開胃調中治氣殺金石藥毒明大治
 脾胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉心
 肺脾胃中大邪止渴生津液元治男婦一切虛證發
 熱自汗眩暈頭痛反胃吐食痰瘧滑瀉久痢小便頻
 數淋瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血血

淋血崩胎前產後諸病時珍

發明 弘景曰人參為藥切要與甘草同功果曰人參

精自生而形自滅肺主諸氣故也張仲景云病人汗

後身熱亡血脈沉遲者下利身涼脈微血虛者並加

人參古人血脫者益氣蓋血不自生須得生陽氣之

藥乃生陽生則陰長血乃旺也若單用補血藥血無

由而生氣素問言無陽則陰無以生無陰則陽無以

化故補氣須用人參血虛者亦須用之本草十劑云

補可去弱人參羊肉之屬是也蓋人參補氣羊肉補

形氣者有無之象也好古曰潔古老人云以沙參

代人參取其味甘也然人參補五臟之陽沙參補五

臟之陰安得無異雖云補五臟亦須各用本臟藥相

佐使引之言聞曰人參生用氣涼熟用氣溫乎地氣

陽微苦補陰氣主生物本乎天味主成物本乎地氣

味生咸陰陽之造化也涼者高秋清肅之氣天之陰

也其性降溫者陽春生發之氣天之陽也其性升甘

者濕土化生之味地之陽也其性浮微苦者火土相

生之味地之陰也其性沉人參氣味俱薄氣之薄者

生降熟升味之薄者生升熟降如土虛火旺之病則

宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾

虛肺其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘

純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘

欽定四庫全書

本草綱目

卷十二上

欽定四庫全書

本草綱目

卷十二上

正誤 穀曰夏月少使人參發心症之病好古曰人參

肺受火邪則反傷肺宜以沙參代之王綸曰凡酒色

過度損傷肺腎真陰虛火動勞嗽吐血數血等證

勿用之蓋人參入手太陰能補火故肺受火邪者忌

之若誤用人參者甘溫之劑則病日增服之過多則死

不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消惟苦

甘寒之藥生甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消惟苦

死多矣則百病不生李東垣亦言生脈散清暑益氣

湯三劑則百病不生李東垣亦言生脈散清暑益氣

湯乃三伏瀉大益金之聖藥而雷斅反謂發心症久

患非矣症乃臍旁積氣非心病也人參能養正破堅

積宜有發症之理觀張仲景治腹中寒食上衝有頭

足又下藏王好古言人參補陽泄陰肺寒宜用肺熱

不宜用節齋王綸因而和之謂參者能補肺火陰虛

火動失血諸病多服必死二家之失皆偏矣夫人參

能補元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣

仲景張氏言亡血虛者並加人參又言肺寒者去

人參加乾薑無令氣連連之屬漢朱氏亦言虛火可補

者之屬實火可瀉參連連之屬漢朱氏亦言虛火可補

而謂人參補火可瀉參連連之屬漢朱氏亦言虛火可補

邪火退人參既補元氣而又補邪火是反復之小人

矣何以與甘草參苓補元氣而四君子耶雖然三家之言

十八

橫之

用人參十兩細切以活火二十
盞浸透入銀石器內桑柴火緩

十九

但

五火

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

三服聖惠方如陳橘

皮五錢 經驗方 胃寒氣滿 不能傳化 易饑 不能

子末半錢 打轉空 心服之 聖濟總錄 脾胃虛弱 不

飲食生薑半斤 取汁白蜜十兩 人參末四兩 胃虛惡

心或嘔吐 有痰人參一兩 水二盞 煎一盞 入竹瀝一

便胃寒嘔惡 不能腐熟 水穀食即嘔吐 人參丁香 薑

蓋煎一盞 溫反胃嘔吐 飲食入口即吐 困弱無力 垂

服 扶草方 反胃嘔吐 飲食入口即吐 困弱無力 垂

水一大升 煮取四合 熱服 日再服 以人參汁入粟米

雞子白 蘆白煮粥 與噉李直方司熟於漢南患此兩

月餘 諸方不瘥 遂與此方 當時便定 後十餘日 遂此

京師 絳每與名醫論此 藥難可為傳也 李絳兵部手

集食入即吐 人參半夏湯 用人參一兩 半夏一兩 五

通取三升 八白蜜三合 煮一霍亂嘔惡 人參二兩 水

升半分 服 張仲景金匱方 霍亂嘔惡 人參二兩 水

一盞 人參白一升 再煎 溫霍亂煩悶 人參五錢 桂

服一加丁香 衛生家寶方 霍亂煩悶 人參五錢 桂

聖惠方 霍亂吐瀉 煩躁不止 人參二兩 橘皮三兩

服 聖惠方 霍亂吐瀉 煩躁不止 人參二兩 橘皮三兩

濟總錄 妊吐水酸 心腹病不能飲食 人參乾薑 炮

湯下 每服五十九米 陽虛氣喘 自汗盜汗 氣短頭暈 人

作四帖 每帖以生薑十片 流水兩 喘急欲絕 上氣鳴

參末湯服方寸七日 產後發喘 乃血入肺 竅危証也

欽定四庫全書

本草綱目
卷十二上

兩水二盞 煮汁一盞 調產後血運 人參一兩 紫蘇半

參末服神效 聖惠方 產後血運 人參一兩 紫蘇半

合煎服 聖惠方 產後不語 人參五錢 水煎服 婦人良方 產

後諸虛 發熱自汗 人參當歸等分 為末 用豬腰子二

至八分 米熟取汁 一盞 入藥煎 產後秘塞 人參多仁 枳

殼炒為末 煎溫服 人參類方 產後秘塞 人參多仁 枳

服五十九米 飲下 濟生方 橫生倒產 人參末各一

錢 丹砂末五分 研勻 難子白一升 人生薑自然汁 三

匙 攪勻 冷服 即母子俱安 神效 此施漢卿方也 婦

方 良 開心益智 人參末一兩 鍊成殯豬肥肪十兩 以

日耳目聰明 骨髓充盈 肌膚潤澤 日 聞雷即昏 兒一

歲 聞雷即昏 倒不知人事 此氣怯也 以人參當歸 麥

門冬各二兩 五味子五錢 水一斗 煎汁五升 湯化 忽

五升 煎汁取汁二升 合煎成膏 每服三匙 白湯化 忽

下服盡一斤 自後聞雷自若矣 楊起簡便方

喘悶絕 方見大 離魂異疾 有人臥則覺身外有身 一

魂歸於肝 此由肝虛邪襲 魂不歸舍 病名曰離魂 用

人參龍齒 赤茯苓各一錢 水一盞 煎半盞 調飛過 朱

砂末一錢 睡時服一服 三服三夜 後真者 怔忡自汗

氣與假者 即化矣 人參半兩 當歸半兩 用豬腰子二個

以水二盞 煮至一盞 半取腰子細切 人參歸同煎至

八分 空心喫腰子以汁送下 其滓培乾 為末 以山藥

末作糊 丸綠豆大 每服五十九米 食遠棗湯下 不遇二