

四

胎前心法

卷下



時

記

藥書

寒胎死用承氣調天水散下之及產後惡露即停止不行
此原非瓜熟自落乃惡露隨胎爲藥所逐則一時盡下非
有瘀滯不行也所以腹無塊痛醫者不明此理不問塊痛
有無用牡丹皮澤蘭等藥以致有形之血不生無形之氣
更傷是以隨變神脫妄言妄見虛火引痰上升治者猶不
知此孤陽浮越之候復不辨脉證仍進逐瘀退熱之劑病
勢愈深豈知產後大虛再經辛散消尅則神愈亡而血愈
竭是以心血竭而妄言愈甚肝血竭而內虛生風成搐肺
氣竭而發喘鼻孔黑如烟煤脾氣竭而四肢不爲所用胃

中元氣告匱不能散精痰壅愈甚治之者仍不識爲虛證
反用胆星蘇子以化痰降氣梨汁以清痰降火殭蠶紫胡
天麻以止搐諸如此等藥類雜進交攻罔知顧本遂致殞
命良可慟也

滋榮活絡湯 治產後口噤項強筋搐類中風證

人參 二錢或三錢

川芎

茯神 各一錢

當歸 三錢酒浸

黃耆 一二錢密炙

麥冬 一錢二分或一錢去心

天麻 八分或一錢

熟地 二錢

光緒二十年拾月念日

陳皮

荆芥

防風

羌活

炙草

各四分

黃連

三分薑汁炒

水煎服○有痰加半夏

七分製

竹瀝

七分

薑汁

少許○

有肉食加山查砂仁麪食加神麪麥芽○大便秘加肉

蓯蓉

一錢五分酒洗去泥

○渴加麥冬乾葛

各八分○

汗加麻黃根

八分

○驚悸加酸棗仁

一錢去殼

天麻湯

治產後中風恍惚語澁四肢不利

人參

棗仁

炒



活
茯神

遠志
淨肉製

雲

山藥

栢子仁

龍苑

麥冬

去心各一錢

當歸

一二錢

玉

石菖蒲

半夏

恒不日

南星麴

各八分

川芎

臺車謂經

羌活

各七分

天麻

吳半江老

防風

各五分

細辛

四分

斧在

或煉蜜爲丸硃砂爲衣淡薑湯送

雷

加味生脉散

治產後去血太多心血虛弱不能上

榮於舌語言不清含糊寒澁

人參

麥冬 去心

歸身

生地

炙草

石菖蒲 各一錢

五味子 十三粒搥碎

獐猪心一個劈開水二盞煎至一盞半去心入藥煎七分食後服○此方治怔忡甚效

止汗生血飲 治產後汗出多而口噤不開背強而直氣息欲絕類症證宜速治也



當歸 一錢酒浸

川芎 五

麻黃根 各一錢

桂枝 五

羌活

防風 五

羚羊角

天麻 各六分

附子 製

炙草 各四分

水煎服○一方有人參一錢

芎歸棗仁湯 治產後無汗筋脉拘攣類瘧證

當歸 二錢酒洗

川芎

防風 各一錢

棗仁 五分去殼炒研



水煎服○一方有羌活 七分

七珍散 治產後敗血停積閉於心竅神志不明益

心氣通於舌心氣閉則舌強不語

人參

石菖蒲 各一錢 為散各一

川芎 一錢

為散七錢五

生地 一錢

為散易炙甘草三錢

細辛 二分

為散二錢五

薄荷 一分

為散無此味

防風

五分 一方四分

辰砂

五分 研細水飛

為散三錢

尊生合生化湯服○一方為散薄荷湯調服三錢

舒筋湯

治產後日久拘攣不宜用補劑者



羌活

薑黃

炙草

各二錢

海桐皮

當歸

赤芍

各一錢

白朮

一錢土炒

沉香

少許

薑煎蒸證治

參附湯

人參

當歸

酒浸各二三錢

肉桂

八分或一錢

黃耆

蜜炙

白朮

土炒各一錢五分

熟地

二錢



南京中医药大学图书馆版权所有

製附子

炙草

生化湯 見本卷生化湯論後

加參生化湯 見本卷暈厥門

十全大補湯 見上卷胎不長養門

理陰煎 見上卷惡阻門

大補元煎 見本卷惡露不止門

八珍湯 見上卷諸痛門

四君子湯 見上卷胎逆上逼門

怔忡驚悸並虛煩煩燥論

胎產心去

卷下

怔忡驚悸並虛煩煩燥論

全



明生公使李
生清泰月

產婦憂驚勞倦去血過多則心中燥動不寧謂之怔忡若
惕然而驚心中怯怯如人將捕之狀謂之驚悸治此三證
惟調和脾胃補養心血俾志寧神定氣舒心安而病愈矣
如分娩後血塊未消宜服生化湯以補血行塊連服數劑
則血旺而怔忡驚悸自平不必加定志安神之品如塊痛
已止服加減歸脾湯如心中驚悸目睛不轉而不能動診
其脈動而弱者宜養血佐以安神藥養心湯主之素壯火
盛者兼服安神丸如虛煩不眠亦神虛所致加減歸脾湯
並治之孫正人用人參丸治驚悸不眠亦效至於煩燥不

寧亦宜分塊痛有無如塊痛未除有瘀血也生化湯調失

笑散如塊痛已止是虛或有熱人參當歸湯治之

加減歸脾湯 治產後血塊痛止怔忡驚悸

人參

茯苓

棗仁炒

麥冬去心

黃耆蜜炙

白朮土炒各一錢

當歸二錢酒浸

川芎八分

遠志肉六分製

陳皮

炙草各四分

龍眼肉八枚



不可用
先敬不
根平

薑一片水煎服○虛煩加竹茹一團○有痰加竹瀝薑

汁或更加栝子仁○一方茯苓易茯神無川芎陳皮有

木香二分

養心湯 治產後心血不寧驚悸不安

人參 一錢五分

當歸身 二錢酒浸

黃耆 蜜炙

麥冬 去心

棗仁 炒

栝子仁 各一錢

茯神

川芎

遠志肉 製各八分

五味子 十粒

公生明

生明江

月公符德

美里王

訓胃補

蘇省城

連連連

連連連

連連連

連連連

連連連

公生明

公生明

公生明

公生明

公生明

炙草 四分

水煎服

早安神丸

治產後怔忡驚悸素壯火盛者

歸身

酒浸

生干地

各三錢

黃連

二錢炒

甘草

五分炙用生用俱可

以上四味共為末蒸餅丸如菜豆大以硃砂為末每服

四十丸

人參丸

治產後大虛心悸志意不安恍惚恐畏虛

煩不眠少氣

卷下

怔忡驚悸並虛煩燥方



中醫藥大學圖書館藏

人參

茯苓

麥冬

去心

薯蕷

各二兩
即山藥

澤瀉

菖蒲

乾薑

桂心

甘草

各一兩

共為末白蜜和棗膏丸如梧子大空心酒服二三十丸

早晚服

人參當歸湯

治產後塊痛已止或虛或虛而有熱

煩燥不寧



中國醫藥大學圖書館版權所有

人參

當歸

酒浸

熟地

麥冬

去心各二錢

肉桂

四分

白芍

一錢酒炒

生地

八分

竹葉

十片

水煎服

生化湯

見本卷生化湯論後

失笑散

見中卷胞衣不下門

麻瞽論

產後麻瞽皆因氣虛血少不能充溢乎週身也即如人曲



菖蒲

菖蒲

石騰

肱而枕稍久卽麻木不爲我用其非氣血不週遍之明徵
歟目得血而能視得清氣之升而能用血虛氣弱不能升
清故濁不降而瞽宜生血補氣十全大補湯主之至於去
血過多手足發麻小腹大痛則遍體麻暈欲死此非惡露
凝滯乃虛中挾痰六君子加炮薑香附當歸曾治一婦產
後右半身麻瞽而昏暈不省人事發卽胸膈痞悶下體重
着或時心神蕩搖若無心肺之狀頃則周身冷汗如漉大
吐痰涎而蘇此產後經脉空虛痰飲乘虛襲入之故因與
六君子加歸耆肉桂隨手而效復有一婦產後左半身麻