

絳雪園古方選註

古吳

王子接晉三註

藥桂天士校

汗劑

麻黃湯

麻黃

三兩
去節

杏仁

七十粒
去皮尖

桂枝

二兩
去皮

甘草

一兩
炙

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫法內諸

藥煮取二升半去滓法溫服八合覆取微似汗法不

須啜粥餘如桂枝法將息

麻黃湯破營方也試觀立方大義麻黃輕清入肺杏仁重濁入心仲景治太陽初病必從心營肺衛入意也分言其功能麻黃開竅發汗桂枝和陽解肌杏仁下氣定喘甘草安內攘外四者各擅其長有非諸藥之所能及兼論其相制七法桂枝外監麻黃之發表不使其大汗亡陽甘草內守麻黃之出汗不使其劫陰脫營去薑棗者薑性上升又恐礙麻黃發表棗味緩中又恐阻杏仁下氣輾轉回顧無非欲其神速一劑奏績若喜功屢用必不戢而召亡陽之禍矣故服已又叮嚀不須啜粥亦恐有留戀麻黃之性也

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃

四兩

杏仁

五十個泡
去皮尖

甘草

二兩
炙

石膏

八兩碎
綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減一升去上沫

法內諸

藥煮取二升去滓

法溫服一升

法本云黃耳杯

喘家作桂枝湯加厚朴杏子治寒喘也今以麻黃石膏加

杏子治熱喘也麻黃開毛竅杏仁下裏氣而以甘草載石

膏辛寒之性從肺發泄俾陽邪出者出降者降分頭解散

喘雖忌汗然此重在急清肺熱以存陰熱清喘定汗即不

輟而陽亦不亡矣觀二喘一寒一熱治法仍有營衛分途

之義

麻黃附子甘草湯

麻黃

二兩
去節

附子

一枚
炮去
皮切八片

甘草

二兩
炙

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫法內諸

藥煮取三升去滓法溫服一升法日三服法

少陰無裏症欲發汗者當以熟附固腎不使麻黃深入腎經劫液為汗更妙在甘草緩麻黃於中焦取水穀之津為汗則內不傷陰邪從表散必無過汗亡陽之慮矣

麻黃附子細辛湯

麻黃

二兩
去節

細辛

二兩

附子

一枚
炮去
皮破八片

右二味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫法內諸

藥煮取三升去滓 ② 溫服一升 ③ 日三服 ④

少陰得太陽之熱而病者用麻黃發太陽之表汗細辛散少陰之浮熱相須為用欲其引麻黃入於少陰以出太陽陷入之邪尤藉熟附合表裏以溫經外護太陽之剛氣內固少陰之腎根則津液內守而微陽不致外亡此從裏達表由陰出陽之劑也

麻黃升麻湯

麻黃 二兩半 升麻 一兩一分 當歸 一兩一分

知母 十八銖 黃芩 十八銖 姜 十八銖

石膏 碎綿裹 天門冬 去心一方 茯苓

甘草
乾薑

桂枝 各六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一二沸去上沫^法內

諸藥煮取三升去滓^法分溫三服^法相去如炊三斗

米頃令盡^法汗出愈

麻黃升麻湯方中升散寒潤收緩滲泄諸法具備推其所
重在陰中升陽故以麻黃升麻名其湯膏芩知母苦辛清
降上焦之津芍藥天冬酸苦收引下焦之液苓草甘淡以
生胃津液歸木萎蕤緩脾以致津液獨是九味之藥雖有
調和之致不能提出陰分熱邪故以麻黃升麻桂枝乾薑

開入陰分與寒涼藥從化其熱庶幾在上之燥氣除在下之陰氣堅而厥陰錯雜之邪可解

麻黃連軀赤小豆湯

連軀即連翹根弘景曰方藥不川無人識者蘇恭亦退入有名未用中

麻黃

二兩去節

連軀

二兩

赤小豆

一升

杏仁

四十個去皮尖

生薑

二兩切

生梓白皮

一升

甘草

二兩炙

大棗

十二枚擘

已上八味以潦水一斗

法

先煮麻黃再沸去上沫

法

內諸藥煮取三升

法

分溫三服

法

半日服盡

法

麻黃連軀赤小豆湯表裏分解法或太陽之熱或陽明之

熱內合太陰之濕乃成瘧熱發黃病雖從外之內而粘着

之邪當從陰以出陽也杏仁赤小豆泄肉理濕熱生薑梓
白皮泄肌表濕熱仍以甘草大棗奠安太陰之氣麻黃使
濕熱從汗而出太陽連軹根導濕熱從小便而出太陽潦
水助藥力從陰出陽經云濕上甚為熱若濕下行則熱解
熱解則黃退也

大青龍湯

麻黃

六兩
去節

桂枝

二兩
去皮

甘草

二兩
炙

杏仁

四十個
去皮尖

生薑

三兩
切

大棗

十二枚
擘

石膏

如雞子大
碎綿裹

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫

法內諸

藥煮取三升去滓^法溫服一升取微似汗^法汗出多
溫粉撲之^法一服汗者停後服

麻黃桂枝越脾互複成方取名於龍者辛熱之劑複以石
膏變為辛涼正如龍為陽體而變其用則為陰雨也太陽
寒鬱於表而生喘用杏仁降之太陽熱灼於裏而無汗用
石膏泄之麻黃發汗甘草護營復有薑棗以調之方義專
在泄衛故不用芍藥欲其直達下焦故倍加鉅兩從衛分
根本上泄邪庶幾表裏鬱熱之氣頃刻致和不使有傳變
之虞內經治遠用奇方大制故稱大青龍

小青龍湯

麻黃
去節

桂枝
去皮

芍藥
三兩

乾薑
三兩

細辛
三兩

五味子
半升

甘草
三兩

半夏
半升
湯洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫法內諸

藥煮取三升去滓法溫服一升法

小青龍湯治太陽表裏俱寒方義迥異於大青龍之治裏
熱也蓋水寒上逆即涉少陰腎虛不得已而發表豈可不
相綰照獨泄衛氣立剷孤陽之根乎故於麻桂二湯內不
但留芍藥之收拘其散表之猛再複乾薑五味攝太陽之
氣監制其逆細辛半夏滑香幽導綱藥深入少陰溫散

水寒從陰出陽推測全方是不欲發汗之意推原神妙亦在乎陽劑而以斂陰為用偶方小制故稱之曰小青龍

桂枝麻黃各半湯

桂枝

一兩十六銖去皮

麻黃

一兩去節

芍藥

一兩

杏仁

二十四粒去皮尖

甘草

一兩炙

生薑

一兩切

大棗

四枚擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

內諸

藥煮取一升八合去滓

溫服六合

法

桂枝麻黃互複註解者皆為兩解法是以淺陋之見測作

聖之深心良可慨也曷不觀其法先煮麻黃後內諸藥顯

然麻黃為主而以桂枝芍藥為監制也蓋太陽邪未解又因陰陽俱虛汗吐下皆禁不能勝麻黃之銳故監以桂枝約以白芍而又銖兩各減其半以為小制服後得小汗即已庶無大汗亡陽之過爾

桂枝二麻黃一湯

桂枝

一兩十七銖去皮

芍藥

一兩六銖

甘草

一兩二銖炙

麻黃

十六銖去節

杏仁

十六個去皮尖

生薑

一兩六銖切

大棗

五枚擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫法內諸

藥煮取二升去滓法溫服一升法日再服法

桂枝銖兩多麻黃銖數少即啜粥助汗之變法桂枝湯減用四分之二麻黃湯減用四分之一則固表護陰為主而以發汗為復假麻黃開發血脉精氣助桂枝湯於衛分作微汗耳第十六銖麻黃不能勝一兩十七銖桂枝一兩六銖白芍則發汗之力太微故又先煮麻黃為之嚮道而以桂芍襲其後也

桂枝二越脾一湯

桂枝

十八銖
去皮

芍藥

十八銖

甘草

十八銖

生薑

一兩二銖

大棗

四枚
擘

麻黃

十八銖
去節

石膏

二十四銖
碎綿裹

右七味咬咀法以水五升煮麻蕒一法二沸去上沫法

內諸藥煮取二升去滓法溫服一升法本方當裁為

越脾湯桂枝湯合飲一升法今合為一方桂枝二越

脾一

桂枝二越脾一湯治脉微無陽者陽分亡津之謂故
於桂枝湯照原方用四分之一以和陽越脾湯照原方用
四分之一以行陰行陰者發越脾氣而行胃中之津俾陽
和津生而脉復因其病在陽故有陽用二陰用一之殊後
人稱越婢者傳寫之誤也

葛根湯

葛根 四兩

麻黃 三兩
去節

桂枝 二兩
去皮

白芍 二兩

甘草 二兩
炙

生薑 三兩
切

大棗 十二枚
擘

右七味㕮咀法以水一斗先煮麻黃葛根減二升去

沫法內諸藥煮取三升去滓法溫服一升法覆取微

似汗法不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

葛根湯即桂枝湯加麻黃倍葛根以去營實小變麻桂之

法也獨是葛根麻黃治營衛實芍藥桂枝治營衛虛方中

虛實互複者其微妙在法先煮麻黃葛根減二升後內諸

藥則是發營衛之汗為先而固表收陰襲於後不使熱邪

傳入陽明也故仲景治太陽病未入陽明者用以驅邪斷入陽明之路若陽明正病中未嘗有葛根之方東垣易老謂葛根是陽明經主藥誤矣

葛根加半夏湯

葛根

四兩

麻黃

三兩去節湯泡去黃汁焙乾

桂枝

二兩去皮

芍藥

二兩

甘草

二兩炙

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

半夏

半升洗

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫

法

內諸藥煮取三升去滓

法

溫服一升

法

覆取微似汗

法

葛根湯升劑也半夏辛滑芍藥收陰降藥也太陽陽明兩經皆病開闔失機故以升降法治之麻葛薑桂其性皆升惟其升極即有降理寓於其中又有芍藥甘草奠安中焦再加半夏以通陰陽而氣遂下嘔亦止是先升後降之制也
梔子豉湯

梔子

十四枚
華生用

香豉

四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取