

竹林女科證治卷二

安胎下

暗產須知

婦人受胎在腹七日一變展轉相成各有相生今婦人墮胎在三五七月者多在二四六月者少臟陰而腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺當在五臟之脈陰常易虧故多墮耳此其可知者也惟一月墮胎人皆不知有胎但謂不孕不知其已受孕而墮也一日屬肝怒則墮多洗下體則竅開亦墮既墮一次則肝脈受傷他次亦必如期而墮今之無子者大半是一



北京中医药大学图书馆版权所有

月暗墜非盡不孕也故凡初交之後最宜將息切勿  
交接以擾子宮勿怒勿勞勿舉動勿洗浴而又常腹  
養血順氣之藥育下文妊娠至寶  
係實證選用可也胎可保矣

妊娠至寶

墮胎乃血虛氣弱不能榮養而自墮譬諸草木枝枯  
則葉落藤萎則花墜而胎亦如之蓋氣虛則提攝不  
固血虛則灌漑不周是以胎墮故善保胎者必當專  
補氣血以胎元飲爲主而加減用之次則芎歸補中  
湯泰山磐石散千金保胎丸保胎無憂丸皆奪造化  
之功妊娠之至寶也

胎元飲

治婦人衝任失守胎元不固隨證加減用之或間日或三日服一劑

人參

隨宜

當歸

杜仲

鹽水斷絲

炒白芍

各二錢

熟地

二錢

白朮

蜜炙一錢五分

炙甘草

一錢

陳皮

七分無滯

不用

水二鍾煎七分食遠服如下元不固而多遺濁者

加山藥補血脂五味子

各一錢

一氣分虛甚者倍白朮

加黃芪

蜜炙一錢但畏火氣浮能滯胃口微胸膈有飽悶不快者須慎用之

虛而兼寒多嘔者加炮

姜

七八分一錢

虛而兼熱者加黃芩

一錢

或加生地黃

杜仲二錢去

陰虛小腹痛加枸杞

二錢

多怒氣逆者加香

附分製七

或加砂仁

七分

若有所觸而動血者加川續

七分

阿膠

炒珠各二錢

姜汁製炒

生

斷分炒一二錢

阿膠

炒珠各二錢

姜汁製炒

生

姜片三五

芎歸補中湯

治姪娠氣血兩虛半產

川芎

當歸

黃芪

蜜炙白朮

蜜炙人參

白芍

杜仲

鹽水斷絲

炒五味子

炒杵阿膠

蛤粉炒珠

艾葉

各一錢

甘草

炙五分

水二鍾煎七分服

泰山盤石散

治婦人氣血兩虛或肥而無實，盛虛而血熱，有暗胎之患。

人參

黃芪

蜜炙當歸

川續斷

炒黃芩

各一錢

川芎

白芍

熟地黃

各入分

白朮

蜜炙二錢

甘草

炙砂仁各五分

糯米

米一撮

水一鍾半

煎七分食

遠服

復骨有孕三五日常服一劑未怀孕

如有

熟者倍黃芩少用砂仁胃弱者倍砂仁少用黃芩

千金保胎散

治姪娠腰背疼  
於小產

杜仲

四兩同米炒斷絲

川續斷

二兩酒洗

右爲末山藥糊丸每服入九十九丸空心米飲下

保胎無憂丸

黨參

飯上蒸三次

白朮

蜜炙勿焦

黃當歸

酒炒各四兩

熟地黃

酒蒸六兩

茯苓

乳蒸三次

山藥

乳蒸三次

杜仲

姜汁炒斷絲

白芍

酒炒各三兩

川芎

炒黑續斷

酒洗晒二次兩

乾五兩

子芩

酒炒砂仁

炒另研細末

甘草

蜜炙各一兩

糯米

炒兩兩

爲末蜜丸每服三錢白湯下早晚各一服

惡阻



妊娠之初經脈內閉育養胎元腸胃阻洳散入焦膈  
逆氣上冲食飲輒吐此由于宮經脈絡於胃口故達  
食氣引動精氣上衝故惡聞食氣喜啖酸鹹四肢倦  
怠多臥少起厭厭困懶名曰惡阻俗謂病兒輕者但以所  
思之物任意與之必愈甚者宜烏附湯若嘔吐痰水  
宜參橘湯若脾胃虛弱宜異功散若痰涎壅滯宜半  
夏茯苓湯若嘔吐清水惡寒發熱宜白朮散或體肥  
惡阻痰必盛宜加昧六君湯體瘦惡阻火必多宜加  
味溫膽湯若飲食停滯胸膈脹悶宜和中飲若胸背  
脹滿宜芩連半夏湯若腹中疼痛宜和胃飲若暴怒

氣逆胎氣上逼而嘔吐者宜解肝煎

烏附湯

烏藥 香附 製白朮 蜜炙陳皮 各一錢 人参 炙甘草

各八分 入姜三片水鍾半煎七分服吐甚者加丁香砂仁各七粒

參橘湯

人參 陳皮 麥冬 去心白朮 蜜炙各一錢 厚樸 製茯苓  
各五分 炙甘草 三分 淡竹茹 一丸 姜三片水煎溫服

異功散

人參 白朮 蜜炙茯苓 炙甘草 陳皮 各一錢

姜三片棗二枚水煎服

半夏茯苓湯

白朮

蜜炙二錢

半夏

湯泡炒黃

陳皮

砂仁

各一錢炒

茯苓

二錢分

甘草

五分

姜三片

棗二枚

烏梅一個

水煎服

白朮散

白朮

蜜炙二錢

人參一錢

丁香六分

甘草三分

姜三片

水煎服

加味六君湯

人參

蜜炙一錢

白朮

蜜炙二錢

茯苓

陳皮

半夏

湯泡炒黃

枳殼

炒麸炒

各一錢

炙甘草

五分

姜三片

棗一枚

水一鍾

半煎七分服

加味溫膽湯

麥冬

去心二錢

陳皮

半夏

湯泡炒黃

茯苓

各一分

枳實

一錢

姜製炒



黃芩 蘆根 竹茹 各一錢  
黃連 姜製

炙甘草 各五分

姜三片 藕二枚 水煎湯服

和中飲

茯苓

陳皮

半夏

湯泡炒黃

厚樸

姜製各一錢半

山楂肉

扁豆

炒各二錢

甘草

五分

砂仁

七分

姜三片 水煎服 如火鬱於上 加山楂仁

炒一錢

芩連半夏湯

黃芩

一錢

白朮

蜜炙

半夏

姜製炒黃

赤茯苓

各一錢

黃連

當歸

二分

根殼

麌炒

香附

製人參

蒼朮

米泔浸

砂仁

甘草

各五分

姜七片 水煎服

和胃飲

陳皮 桔梗 厚樸 姜製 小茴香 益智仁  
各八分 砂仁 五分 蒼朮 米泔浸 四分 甘草 三分 水煎服

解肝煎

陳皮 半夏 姜炒黃 厚樸 姜製 茵苓 各一錢  
芍 各一錢 砂仁 七分 姜三片 水煎服

子氣

姪娠三月之後兩足浮腫甚則自脚面腫至腿膝飲食不甘小水流利者屬濕氣爲病名曰子氣宜赤朮湯若兩足發腫漸至腿膝或足指縫間出水乃水氣

腫滿之故宜天仙藤散若脾胃虛弱佐以四君子湯  
未應宜用補中益氣湯兼用逍遙散

### 赤苓湯

厚樸姜製陳皮去白各八分蒼朮米泔浸炒一錢炙甘草五分

赤茯苓 桑白皮各一錢半姜三片水煎服

### 天仙藤散

天仙藤即青木香香附製陳皮 烏藥 甘草

各二錢

木瓜三片蘇葉四分姜三片水煎食前服日服

二次以

水盡腫消爲度若脾胃虛弱佐以四君子湯人參白朮

茯苓各八分  
甘草

補中益氣湯

人參 黃芪

蜜炙

白朮

蜜炙

甘草

炙各一錢

當歸

五分

當歸

一錢

陳皮

五分

升麻

柴胡各三分

姜三片

棗二枚水煎服

逍遙散

當歸

白朮

蜜炙

白芍

茯神

甘草

柴胡

各一錢

姜三片水煎服

子滿

姪姪五六月間腹大異常胸膈脹滿小水不通遍身浮腫名曰子滿此胞中蓄水也若不早治生子手足必然軟短形體殘疾或水下卽死宜鯉魚湯

鯉魚湯

白朮 蜜炙  
二錢 茯苓 一錢  
五分 當歸

各一錢

橘紅

一分

鯉魚 一尾  
不拘大小去鱗  
白水煮熟取汁 生姜 五片

錢

各五片

右將魚汁一鍾半入藥煎至一鍾空心服以水盡

腫消爲度如胎死腹中脹悶未除須再服一劑

子腫

妊娠五六月偏身浮腫腹脹喘促高過心胸氣逆不安小便不利者屬水氣爲病名曰子腫俗云  
墮胎  
此胎  
中有水也宜防已湯若面目虛腫四肢作腫宜全生白朮散未應佐以四君子湯若下部腫甚宜補中益



氣湯方見子  
氣條中

加茯苓三錢

若脾虛腫滿宜單氏白朮散

若胎前浮腫脾肺俱病者宜五皮散若濕熱腫滿宜

梔子湯

### 防已湯

防已

赤茯苓

桑白皮

紫蘇葉各一錢

一木香

不見火  
五分

姜三片水煎服

全生白朮散

白朮

蜜炙一兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

茯苓皮

各五錢

爲末每服二錢米飲調下如末應佐以四君子湯

卽人參白朮茯苓炙草各一錢

煎湯調服

單氏白朮散

白朮 蜜炙 當歸各二錢  
川芎八分 大腹皮

茯苓 分各七錢  
陳皮 四分 甘草三分 姜三片 水煎服如水

渴致腫加山藥扁豆澤瀉

五皮散

大腹皮 桑白皮 茯苓皮 陳皮 生姜皮 各等分  
加木香少許 濃煎半鍾空心服

梔子散

山梔仁 炒 蘿蔔子 炒 等分爲末 每服一錢 米飲調下

子暈

妊娠七八月忽然卒倒僵仆不省人事頃刻卽醒名曰子暈宜葛根湯亦有血虛陰火炎上鼓動甚疾而眩暈者宜葛根四物湯亦有氣血兩虛而眩暈者宜八珍湯

葛根湯

葛根一錢桂枝去皮二分麻黃去節各八分白芍各六分甘草各六分姜三片棗二枚水一鍾半先將麻黃葛根煎至一鍾去沫入諸藥煎七分溫服

葛根四物湯

熟地黃  
當歸  
川芎  
白芍各一錢  
葛根  
秦艽

防風

各八分

牡丹皮

六分

細辛

三分

水煎入竹懸

一盃和勻溫服

八珍湯

人參

白朮

蜜炙

茯苓

炙甘草

熟地黃

當歸

白芍

川芎

各等分

姜三片

棗二枚

水煎服

子癇

妊娠中風頸項強直筋脈攣急口噤語澁痰盛昏迷  
顛癇發搐不省人事名曰子癇輕則宜四物湯加黃  
芩黃連以降火半夏陳皮以化痰更加白朮以燥濕  
強脾名曰清痰四物湯甚則角弓反張宜羚羊角散