

女科撮要

女科撮要下卷

薛氏醫按

吳郡薛

已著

保胎

新刊畏道政校

妊娠若元氣不實發熱倦怠或胎動不安用當歸散
因氣惱加枳殼胸膈痞悶再加蘇梗或作痛加柴胡
若飲食不甘或欲嘔吐用六君加紫蘇枳殼若惡阻
嘔逆頭暈體倦用參橘散未應用六君子湯若惡阻
嘔吐不食煩悶亦用參橘散之類若頓仆胎動腹痛
下血用膠艾湯未應用八珍加膠艾若頓仆毒藥腰

痛短氣用阿膠散未應煎送知母丸若顫仆胎傷下
血腹痛用佛手散未應用八珍送知母丸若心驚膽
怯煩悶不安名子煩用竹葉湯未應血虛佐以四物
氣虛佐以四君若下血不止名胎漏血虛用二黃散
血去多用八珍湯未應用補中益氣湯若因事而動
下血用枳殼湯加生熟地黃未應或作痛更加當歸
血不止八珍加膠艾若不時作痛若小腹重墜名胎
痛用地黃當歸湯未應加參朮陳皮或因脾氣虛用
四君加歸地中氣虛用補中益氣湯若面目虛浮肢
體如水氣名子腫用全生白朮散未應用六君子湯

下部腫甚用補中益氣倍加茯苓或因飲食失宜嘔吐泄瀉此是脾胃虧損用六君子湯若足指發腫漸至腿膝喘悶不安或足指縫出水名水氣用天仙藤散脾胃虛弱兼以四君子未應用補中益氣兼以逍遙散若胎氣上攻心腹脹滿作痛名子懸用紫蘇飲飲食不甘兼四君子內熱晡熱兼逍遙散若小便澹少或成淋瀝名子淋用安榮散不應兼八瓊湯腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若項強筋攣語瀉痰盛名子癰用羚羊角散或飲食停滯腹脹嘔吐此是脾胃虛弱而不能消化用六君子湯不應

用平胃散加參苓或胎作脹或腹作痛此是脾胃氣
虛而不能承載用安胎飲加升麻白朮不應用補中
益氣湯或臍腹作脹或小便淋閉此是脾胃氣虛胎
壓尿胞用四物加二陳參朮空心服後探吐藥出氣
定又服又吐數次必安或因勞役所傷或食煎炒小
便帶血此是血得熱而流於脬中宜清膀胱用逍遙
散或遺尿不禁或爲頻數此是肝火血熱用加味逍
遙散若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫名胎水不利
用鯉魚湯脾胃虛佐以四君子病名同而形在裏
症異而病名同聊見本方凡用見症之藥不應當分

月經治之

治驗

一姪娘三月其經月來三五次但不多飲食精神如故此血盛有餘兒大能飲自不來矣果然

一姪娘六月每怒氣便見血甚至寒熱頭痛脇脹腹痛作嘔少食余謂寒熱頭痛肝火上衝也脇脹腹痛肝氣不行也作嘔少食肝侮脾胃也小便見血肝火血熱也用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓白朮而愈一姪娘六月體倦食少勞役見血用六君加當歸熟地升麻柴胡而愈

一妊娠每三四月胎便作痛余用地黃當歸湯治之不日而愈

一妊娠三月飲食後因怒患瘧連吐三次用藿香正氣散二劑隨用安胎飲一劑而愈後因怒痰甚狂言發熱胸脹手按少得此肝脾氣滯用加味逍遙散加川芎二劑頓退四劑而安

一婦人每怒發熱脇脹小便淋瀝每月經行旬餘未已受胎三月因怒前症復作朝用加味逍遙散夕用安胎飲各二劑而安五月又怒復作下血如經行四日未止仍用前藥而愈

一妊娠將三月嘔吐惡食體倦嗜卧此惡阻之症用
人參橘皮湯二劑漸愈又用六君加紫蘇三劑而安
一妊娠吞酸惡心欲作嘔吐此飲食停滯用六君加
麴藥炒黑子芩枳殼香附治之而愈

一妊娠飲食後惱怒寒熱嘔吐頭痛惡寒胸腹脹痛
大便不實而色青小便頻數而有血余曰當清肝健
脾爲主不信乃主安胎止血益甚問余曰何也余曰
大便不實而或青此是飲食既傷脾土而兼木侮小
便頻數而有血此是肝火血流於胞而兼挺痿也用
六君子加枳殼紫蘇山梔二劑脾胃頓醒又用加味

逍遙散加紫蘇枳殼二劑小便頓清更節飲食調理而安

一妊娠每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此是脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈凡治妊娠毋泥其月數但見某經症便用某藥爲善

一妊娠因怒吐血塊四日不止兩脇脹痛小便淋瀝此怒而血蓄於上部火炎而隨出也脇脹腹痛小便淋瀝肝經本病也用小柴胡合四物四劑而止却用六君子安胎飲調理而安

一 妊娠氣喘痰甚諸藥不應問治於余詢之云素不
帶下始於目下浮兩月餘其面亦然此氣虛有痰飲
也用六味丸料數劑而愈

凡婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲痛脹寒熱用
麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗散血氣如此何
脾胃虛弱飲食不消方中多用之一云麥芽最消腎
若氣血虛而乳汁自出者宜十全大補湯其子多不
育

小產

小產重於大產蓋大產如粟熟自脫小產如生採破

其皮殼斷自根蒂豈不重於大產但人輕忽致死者
多矣治法宜補形氣生新血去瘀血若未足月痛而
欲產芎歸補中湯倍加知母止之若產而血不止人
參黃芪湯補之若產而心腹痛當歸川芎湯主之胎
氣弱而小產者八珍湯固之若出血過多而發熱聖
愈湯汗不止急用獨參湯發熱煩躁肉瞤筋惕八珍
湯大渴面赤脉洪而虛當歸補血湯身熱面赤脉沉
而微四君薑附東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自
旺於陽分也晝安靜而夜發熱躁是陽氣下陷於陰
中也如晝夜俱發熱者是重陰陽無陰也當峻補其陰

王太僕云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來而
去晝見夜伏夜發晝止時節而動是無火也如大熱
而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動
時止是無水也若陽氣自旺者補中益氣湯陽氣陷
於陰者四物二連湯重陽無陰者四物湯無火者八
味丸無水者六味丸

治驗

一妊娠五月服剪紅丸而墮腹中脹痛服破血之劑
益甚以手按之益痛余曰此峻藥重傷脾胃受患用
八珍倍人參黃芪半夏乳香沒藥二劑而痛止數劑

而全愈

吳江庠友史萬湖仲子室年二十餘疫疾墮胎時咳
服清肺解表喘急不寐請治余以爲脾土虛不能生
肺金藥損益甚先與補中益氣加茯苓半夏五味炮
薑四剉漸愈往視之又與八珍加五味及十全大補
湯全愈

大兒婦張氏素怯弱嘉靖癸卯四月生女自乳中患
疥瘡年餘不愈遂致羸困甲辰五月遭先母大故以
姑病勉強代執喪禮旬月每欲眩仆一日感氣忽患
心脾高腫作疼手不可按而嘔吐不止六脉微細之

極余以爲脉雖虛而病形所實誤認諸痛不可補氣
乃用青皮香附吳茱等藥而後繼復患瘧且瘧胎又
投理氣行血之藥病去元氣轉脫再投參芪補劑不
應矣六脉如絲欲絕思非附子不能救非立翁莫能
投迎翁至診云皆理氣之劑損真之誤也連投參芪
歸朮附子薑桂六劑間用八味丸五日眠食漸甘六
脉全復翁云心脾疼痛時卽當服此等藥瘧亦不作
矣姑婦皆翁再造敢述奇功附於此門之尾以爲初
知藥性者之戒制生陳遜稽顙謹識

保產

妊娠欲產之時但覺腹內轉動卽當正身仰卧待兒
轉身向下時作痛試捏產母手中指中節或本節跳
動方與臨盆卽產矣若初覺不仰卧以待轉胞或未
產而水頻下此胞衣已破血水先乾必有逆生難產
之患若橫生者兒先露手臂令母正卧以手徐推兒
臂下體令其正直復以中指摩其肩勿令臍帶攀係
卽生逆生者兒先露足令母正卧以手徐推其足仍
推兒轉正卽生偏生者兒頭偏在一邊亦照前法徐
正其頭卽生或兒頭後骨偏在谷道傍徐推近上卽
生礙產者兒頭雖正但不能下盖因胎轉臍帶攀肩

所致用中指按兒兩肩理脫臍帶卽生坐產者兒將
欲生其母疲倦久坐椅褥抵其生路急用巾帶高懸
令母以手攀之輕輕屈足良久兒順卽生盤腸生者
臨產母腸先出此難於收上以草麻子四十九粒研
爛塗產母頭頂待腸收上急洗去設或爲風吹乾不
能收者以磨刀水少許溫熱拭潤其腸再用磁石前
湯服之卽收上磁石須陰陽家用有驗者俗以水噀
母面背驚而腸亦收之蓋驚則氣散恐反致他症戒
之若胎衣破而不得分娩者用保生無憂散以固其
血自然生息如血已耗損用八珍湯料一斤益母草

半斤水數碗煎熟不時飲之亦有得生者凡孕婦只
腹痛未產也若連腰痛甚者將產也蓋腎候於腰胞
係於腎故也華佗治橫逆產難用蛇脫二條蟬殼二
十八箇胎髮二丸各燒灰每服二錢酒調連進二服
卽卧片時兒卽順生如無此藥令產母仰面正卧以
小針刺兒手脚心三五次用鹽塗之手脚卽縮上待
兒身轉順卽生○若以蜀葵子四十九粒白滑石三
錢順流水煎服卽順生或用好京墨濃磨服之墨水
裹兒卽下○或敗筆頭一箇煨過以藕節自然汁溫
和下○或紫蘇葉當歸各三錢長流水煎服卽下