

周氏醫學叢書 第五十五冊



皮部論篇第五十六

從通義說起

黃帝問曰。余聞皮有分部。脈有經紀。筋有結絡。骨有度量。其所生病各異。別其分部。左右上下陰陽所在。病之始終。願聞其道。岐伯對曰。欲知皮部。以經脈爲紀者。諸經皆然。陽明之陽。名曰害。蜚上下同法。○緊○擒○皮○部○掣○起○全○篇手足同此。視其部中有浮絡者。皆陽明之絡也。其色多青。則痛。多黑則癥。黃赤則熱。多白則寒。五色皆見。則寒熱也。絡盛則入客於經。陽主外陰。主內少陽之陽。名曰樞持。上下同法。○句○法○雷○同○得○妙○是○微○後○語○遙○接○上○條○末○句視其部中有浮絡者。皆少陽之絡也。絡盛則入客於經。故在陽者主內。在陰者主出。以

滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關樞上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也上○下○鈎○連○有○致○又○遙○承○次○條○末○高○注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩○部○上○下○同○法○視○其○部○中○有○浮○絡○者○皆○心○主○之○絡○也○絡○盛○上○下○同○法○視○其○部○中○有○浮○絡○者○皆○心○主○之○絡○也○絡○盛○則○入○客○於○經○太○陰○之○陰○名○曰○關○蟄○上○下○同○法○視○其○部○中○有○浮○絡○者○皆○太○陰○之○絡○也○絡○盛○則○入○客○於○經○凡○十○筆○言○病○機○應○醒○振○筆○直○書○昂○頑○天○外○此○二○經○絡○脈○者○皮○之○部○也○是○故○百○病○之○始○生○也○必○先○於○皮○毛○邪○中○之○則○腠○理○開○開○則○入○客○於○絡○脈○留○而○不○去○

○南○振○○此○言

○病○形○○邪○在○氣○分○○句○句○如○長○劍○倚○天○○邪○入○筋○骨○○邪○入○筋○骨○

傳入於經留而不去。傳入於府廩於腸胃邪之始入於皮也。泝然起毫毛開腠理其入於絡也。則絡脈盛血分。邪在氣分。邪入肌膜。邪入筋骨。

筆走龍蛇。色變其入客於經也。則感虛乃陷下。其留於筋骨之

閒寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍膿破毛

勁峭。上文五光十色極見濃麗。此以淡筆收之。

直而敗。帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如。岐

伯曰皮者脈之部也。邪客於皮則腠理開。開則邪入

客於絡脈。絡脈滿則注於經脈。經脈滿則人舍於府藏也。故皮者有分部不與而生大病也。帝曰善。

帝意皮分十二部其生病亦有十二經之殊耶答言皮固有分部而其分淺不令人生大病故不能如分經剖析也。

筆勢豪邁有伏有應有提掇有橫插陽主外陰主

內故作未了語氣下面分在兩處遙接遂於極板之中涌現空明之象矣犀利不失之剽滑光明俊偉仍自沈靜肅穆豈秦漢諸子所能攀躋



南京中医药大学图书馆版权所有

經絡論篇第五十七

黃帝問曰夫絡脈之見也。其五色各異。青黃赤白黑。  
不同其故何也。岐伯對曰經有常色而絡無常變也。  
帝曰經之常色何如。岐伯曰心赤肺白肝青脾黃腎  
黑皆亦應其經脈之色也。帝曰絡之陰陽亦應其經。  
乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四  
時而行也。寒多則凝泣。凝泣則青黑。熱多則淖澤。  
澤則黃赤。此皆常色。謂之無病。吳鶴皋移此二句置  
隨四時而行也下於  
此皆二字無着但重讀常字對上文皆順矣五色具見者謂之寒  
熱。帝曰善。

醕厚整肅直而有曲體是短幅正宗



南京中医药大学

南京中医药大学图书馆版权所有

氣穴論篇第五十八

一起、擒、題、極、緊

黃帝問曰。余聞氣穴三百六十五以應一歲。未知其

所。願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰。窘乎哉問也。其非

聖帝孰能窮其道焉。因請溢○游衍以養度意盡言其處。帝捧手遂

巡而卻曰。夫子之開余道也。目未見其處耳未聞其

數而目以明耳以聰矣。岐伯曰。此所謂聖人易語。良

馬易御也。帝曰。余非聖人之易語也。世言真數開人

意。今余所訪問者真數。發蒙解惑。未足以論也。然余

願聞夫子溢志盡言其處。令解其意。請藏之金匱。不

敢復出。岐伯再拜而起曰。臣請言之。文意不屬確是背與心相控而

痛。所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也。下紀者關元也。背腎邪繫陰陽左右如此。其病前後痛濇腎脅痛而不得息。不得臥。上氣短。氣偏痛。脈滿起斜出尻脈絡腎脅支心貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎下。林億云此段疑藏文錯簡骨空論藏俞五十穴。府俞七十二穴。熱俞五十九穴。水俞五十七穴。頭上五行行五。五五二十五穴。中脣兩傍各五。凡十穴。大椎上兩傍各一。凡二穴。目瞳子浮白二穴。兩髀厭分中二穴。犢鼻二穴。耳中多所聞二穴。眉本二穴。完骨二穴。項中央一穴。枕骨二穴。上關二穴。大迎二穴。下關二穴。天柱二穴。巨

虛上下廉四穴。曲牙二穴。天突一穴。天府二穴。天牖

二穴。扶突二穴。天窓二穴。肩解二穴。關元一穴。委陽

二穴。肩貞二穴。瘡門一穴。齊一穴。胷俞十二穴。背俞

二穴。膺俞十二穴。分肉二穴。踝上橫二穴。陰陽蹻四

穴。水俞在諸分熱俞在氣穴。寒熱俞在兩骸厭中二

穴。大禁二十五。在天府下五寸。束一筆。凡三百六十五穴。鍼

之。所。由。行。也。帝。曰。余。已。知。氣。穴。之。處。遊。鍼。之。居。願。聞

孫絡谿谷亦有所應乎。岐伯曰。孫絡三百六十五穴。

會亦以應一歲。以溢奇邪。以通榮衛。榮衛稽留衛散。

榮溢氣竭。血著外爲發熱。內爲少氣。疾寫無息。以通

孫絡

功用

孫絡

效孫絡

孫絡

孫絡主病

孫絡治法

孫絡散

榮衛見而寫之。無問所會。帝曰。善。願聞谿谷之會也。

岐伯曰。肉之大會爲谷。肉之小會爲谿。肉分之間。谿谷之會。谿谷功用。以行榮衛。以會大氣邪。溢氣壅脈。熱肉敗榮衛。不行。必將爲膿。內銷骨髓。外破大臍。臍當是膿留於節腠。原作湊。一作溱。解者俱曲而難信。靈樞九鍼論曰。八風傷人。內舍於骨。解腰脊節腠理之間爲深痺也。仲景曰。腠者。三焦通會元真之處也。必將爲敗也。故以腠爲順。且彼處理字亦後人妄增。寒病。必將爲敗。

積寒留舍。榮衛不居。卷肉縮筋。肋肘不得伸。內爲骨。外爲不仁。命曰不足。大寒留於谿谷也。上條用順提此用倒煎補敘小○痺一筆收束木節六十五穴會。亦應一歲。其小痹淫溢循脈。往來微鍼。所及與法相同。帝乃辟左右而起。再拜曰。今日發蒙。

應起處

束全

篇

解惑藏之金匱。不敢復出。乃藏之金匱之室。署曰氣穴所在。岐伯曰。○補救血絡文體似散漫而益見寬博孫絡之脈別經者。其血盛而當寫者亦三百六十五脈。並注於絡。傳注十二絡脈。非獨十四絡脈也。內解寫於中者十脈。

後幅義精詞湛。與調經論守經隧之義相發明。故吾謂葉天士通絡之說爲百病不易之治法也。徐靈胎陳修園斥之何耶。



南京中医药大学图书馆版权所有



南京中医药大学图书馆版权所有

氣府論篇第五十九

○直○起○高○峯○屹○立○

足太陽脈氣所發者。七十八穴。兩眉頭各一入髮至項三寸半。林億云項當作頂半字衍也傍五相去三寸。其浮氣在皮中者。凡五行行五五五二十五。項中大筋兩傍各一風府兩傍各一俠背以下。至尻尾二十一節。十五閒各一。五藏之俞各五六府之俞各六委中以下。至足小指傍各六俞。足少陽脈氣所發者六十二穴。兩角上各二。直目上髮際內各五耳前角上各一耳前角下各一。銳髮下各一客主人各一耳後陷中各一下關各一。耳下牙車之後各一缺盆各一掖下三寸。

脅下至胠。八間各一髀樞中傍各一。林億云此穴在髀樞中也。傍各一者左右膝以下至足小指次指各六俞。足陽明脈氣所發者六十八穴。額顱髮際傍各三面。勦骨空各一大迎之骨空各一人。迎各一缺盆外骨空各一膺中骨間各一。俠鳩尾之外當乳下三寸。俠胃脈各五。俠齊廣三寸各三。下齊二寸俠之各三。氣街動脈各一。伏菟上各一三里以下至足中指各八俞。分之往也所在穴空手太陽脈氣所發者三十六穴。目內眞各一。目外各一。蹠骨下各一。耳郭上各一。耳中各一。巨骨穴各一。曲掖上骨穴各一。柱骨上陷者各一。上天

窓四寸各一肩解各一肩解下三寸各一肘以下至手小指本各六俞。手陽明脈氣所發者二十二穴。鼻空外廉項上各二大迎骨空各一柱骨之會各一骨之會各一肘以下至手大指次指本各六俞。手少陽脈氣所發者三十二穴。勦骨下各一眉後各一角上各一下完骨後各一項中足太陽之前各一俠扶突各一肩貞各一肩貞下三寸分間各一肘以下至手小指次指本各六俞。督脈氣所發者二十八穴。項中央二髮際後中八面中三大椎以下至尻尾及傍按及傍二字可疑或因會陽在尻尾之下而言之耶十五穴至骶下凡二十一

內經言之。第十一主  
節脊椎法也。任脈之氣所發者二十八穴。喉中央二。  
膺中骨陷中各一。鳩尾下三寸。胃脘五寸。胃脘以下。  
至橫骨六寸半一。林億云一字誤當是鳩尾下三穴每相間一寸半而得一穴也。  
誤愚按此條字有脫也。胃脘五穴每相間每一寸也。下至橫骨六穴相間每一寸也。  
腹脈法也。下陰別一目下各一下脣一斷交一衝脈氣所發者二十。  
二穴。俠鳩尾外各半寸。至齊寸一。謂兩傍相去各半寸上下相間一寸。  
一穴俠齊下傍各五分。至橫骨寸一。腹脈法也。足少陰舌下厥陰毛中急脈各一手少陰各一陰陽蹻各一手足諸魚際脈氣所發者。起者皆謂之魚肉。凡三百六十五穴也。