

專氏眼科審視瑤

部

傅氏眼科審視瑤函二方目

卷之四目錄

實熱生瘡症

加味四物湯

芎歸湯

搽藥二方

椒瘡症

歸芍紅花散

粟瘡症

除風清脾飲

胞生痰核症

防風散結湯

清胃湯

木疳症

羚羊角散

平肝清火湯

火疳症

洗心散

土疳症

清脾散

敷藥方

金疳症

瀉肺湯

水疳症

蠲毒飲

大腎漏症

燥濕湯

五花丸

小腎漏症

瀉濕湯

白薇丸

陰漏症

黃芪湯

陽漏症

保光散

補漏生肌散

小半黃丸

倒睫拳毛症

石膏羌活散

流氣飲

緊皮膏

五灰膏

起睡膏 夾眼法

皮急緊小症

神效黃芪湯 東垣撥雪湯

胞翻粘瞼症

排風散 龍膽丸

胞輪振跳症

當歸活血飲

胞虛如毬症

調脾清毒飲

兼胎症

保胎清火湯 簡易知母飲 天門冬飲子

芎蘇散 消風散 天冬飲子

爲產症

熟地黃湯 四物補肝散 四製香附丸

濁害清和症

穀精神湯 退翳散 望月丸 疎風湯

通竅散 胎兒丸 清解散 補元散

加味地黃丸 退雲散 固本犀角湯

附治小兒癰疹疳傷并暴赤疼痛翳膜諸方

消疳退雲飲 九味蘆薈丸 生熟地黃丸

鷄肝散

龍膽蘆薈丸

消疳散

天麻丸

寶鑑灸雀目疳眼法

升麻乾葛湯

車前子散

養肝丸

通頂散

輓輻轉關症

釣藤飲子

雙目睛通症

牛黃丸

附小兒目閉不開睛目直視目仰視目睛瞶動目斜

諸症驗方

碧霞丹

四味肥兒丸

九龍涎散

木胡清肝散

人參湯

生地黃散

瀉毒丸

和太師牛黃丸

傅氏眼科審視瑤函卷之四

林陵傳仁字允科纂輯

婿張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵訂正

公猷

掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁

籟全次

運氣原證

按內經運氣曰皆瘍有二一曰熱經云少陰司天之政三
之氣大火行寒氣時至民病目赤皆瘍治以寒劑是也
二曰燥經云歲金太過民病目赤皆瘍又云陽明司天
燥淫所勝民病目眦皆瘍治以溫劑是也

目瘍

內經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火火鬱內公致有斯疾蓋心主血而血熱生風燥甚則連相傳襲故火能生土血注陽明則肌肉風熱與血熱相搏發見皮膚其名不一有黃濃而白者土生金母歸子也始生微癢而熱輕腫痛爛為熱極血凝化水氣滯成膿甚至寒熱作而飲食減尤為慮宜宜泄風毒凉心火解胃熱按目瘡瘍皆因君火可令燥火熱邪所致宜溫宜涼隨症施治可也

實熱生瘡症

實熱生瘡症瘡生各有經汨如湯樣注瀉急且羞明脾或弦多潰胞中椒栗成瘡生於眥上心火熾盈盈臉外脾家燥唇邊亦土形肺熱形於鼻週身旺六經耳熱知腎燥滿面六陽蒸三焦炎項上下部六陰乘失治應須變傷睛目欠明

此症謂曰病生瘡之故輕重不等痛癢不同重則有堆積高厚紫血膿爛而腥臭者乃氣血不和火實之邪血分之熱尤重如瘀滯之症膏混水濁每每流於脾皆成瘡瘀血散而瘡自除勤勞濕熱之人每患脾皆成瘡別無痛腫症者亦輕而無妨若火盛瘡生惟重滯腫痛者又當急治恐濁氣沿於目內而病及於珠若先曰病後生瘡必是熱沿他症凡見瘡生當驗部分以別內因何源而來隨其輕重而治之宜服

加減四物湯

生地黃

苦參

蘇薄荷

川芎

黍粘子

連翹

天花粉 防風 赤芍藥 當歸 荆芥穗各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分食後服

芎歸湯

川芎 當歸 赤芍藥 防風 羌活各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓頻洗則血活風去

搽藥方治眼皮外滿臉生瘡潰爛疼痛

血竭 乳香 沒藥 輕粉 他僧各等分

右研為細末搽於瘡處

又方治眼胞上下或驗生瘡破流黃水蔭開者

青黛一分 黃栢末 潮腦 至粉各一錢 松香一分

右爲細末。用舊青布。捲藥在內。麻油濕透。燒灰。俟
滴於茶鍾內。蘸搽。

椒瘡症

血滯脾家火。胞上起熱瘡。泪多並赤腫。沙擦最難當。或疼
兼又癢甚。不便開張。可惡患頑者。全憑出血良。目睛惟仗
血。血損目無光。輕時須善逐。太重脾必傷。胞內紅癰癰風
熱是椒瘡。

此症生於胞內。紅而堅者是。目間沙擦難開。多泪而痛
人皆稱粟瘡。誤矣。夫粟瘡亦生在胞。但色黃軟。不易散
此症雖堅。却易散。俗皆以龍鬚燈心等物。出血取效。殊

不知目以血爲榮。血損而光華有衰弱之患。輕者只宜善治。至於癰癰連片。屹路高低不平。及血瘀滯者。不得已而導之。中病卽止。不可太過。過則血損。恐傷真水。難養神膏。犬槩用平治之法。退而復來。乃內有瘀滯。方可量病漸導。若初治不可輕爲開導。孟浪恐有損也。不如謹始爲妙。宜服

歸芍紅花散

治眼胞腫硬。
內生疣瘡。

當歸

大黃

梔子仁

黃芩

紅花

以上俱酒
洗微妙

赤芍藥

甘草

白芷

防風

生地黃

連翹等

右爲末。每服三錢。食鹽白水煎服。

粟瘡症

脾經多濕熱氣滯血行遲粟瘡胞內起粒粒似金珠細顆似膿來却軟散風清熱早醫治

此症生於兩胞之內細顆黃而軟者是今人皆稱椒瘡爲粟瘡者誤矣夫椒瘡紅而堅胞必腫硬睛必沙澀症尚易治若粟瘡一見目疼頭痛者必有變症粟瘡是風熱鬱於上焦極重但以散風清熱爲主二症雖皆生于胞內屬於血分椒瘡紅堅易散粟瘡黃軟不易散故治亦不同豈可槩論哉宜服

除風清脾飲

廣陳皮 連翹 防風 知母 玄明粉 黃芩

玄參 黃連 荆芥穗 大黃 桔梗 生地 各等分

右剉劑。白水二鍾煎至八分。去滓。食遠服。

目疣

此症或眼皮上下生出一小核是也。乃脾胃痰氣所致。上脰屬脾經。下脰屬胃經。若結成小核。紅而自破。不藥而愈。若堅白不破。久則如盃如拳而成癰矣。若初起小核時。卽先用細艾如粟米壯。灰患上。令患目者卧。目紫閉。以隔蒜片炙三四壯。外將膏藥貼之。又用紫背天葵子揀淨二兩。煮甜酒一壺半。皂角子二三粒。炮熟。研細。飲酒時。搽疣上。自消。

胞生痰核症

凡是胞生痰核。痰火結滯所成。皮外覺腫如豆。胞內堅實有形。或有不治自愈。或有至結爲癭。甚則流膿出血。治之

名不同名此火土之燥毋同外求情若能知劫治頃刻便清平。

此症乃胞外皮内生顆如豆堅而不疼。火重於痰者色紅紫乃痰因火滯而結此生於上胞者多屢有不治自愈有恣辛辣熱毒酒色斲喪之人久而變爲癰漏重疾者治亦不同若初起知劫治之法則頃刻而平復矣宜服

防風散結湯

玄參

錢一

前胡

赤芍藥

黃芩

桔梗

土貝母

防風

蒼朮

白芷

陳皮

天花粉

各八分

右劉劑白水二鍾煎至八公去滓食後熱服

清胃湯

治眼胞紅硬此陽明經積熱平黃飲酒過多而好食辛辣炙燂之味所致也

山梔仁

炒黑枳殼

蘇子

各六分

石膏

煨

川黃連

炒

陳皮

連翹

歸尾

荆芥穗

黃芩

防風

各八分

甘草

生二分

右劉劑白水二鍾煎至一鍾去滓熱服

水疳症

木疳多在風輪生碧綠青藍似豆形。如是昏沉應不痛。若然泪澀目多疼莫教變症侵眸子不散睡神便破睛

此症生於風輪者多其色藍綠青碧有虛實二症。虛者

大而昏花實者小而痛澀非比蟹睛因破而出乃白然