

御纂醫宗金鑑

竹部

卷四十七



御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣目錄

生育門

臨產

產室

擇收生婆

驚生

試胎弄胎

坐草

臨盆



交骨不開

開骨散

盤腸生

補中益氣湯

十全大補湯

草麻貼法

酥油潤法

難產

產後門

胞衣不下證治

奪命散

產門不開證治

十全大補湯

血暈證治

清魂散

佛手散

醋漆薰法

惡露不下證治

失笑散

聖愈湯

惡露不絕證治

加味十全大補湯

佛手散

頭疼證治

芎歸湯

八珍湯

心胃痛證治

大巖蜜湯

玉燭散

腹痛證治



失笑散

香桂散

異功散

少腹痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

五苓散

脇痛證治

延胡索散

四君子湯



南京中医药大学图书馆版权所有

八珍湯

腰痛證治

佛手散

加味六味地黃湯

偏身疼痛證治

趁通散

加味四物湯

腹中塊痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

筋攣證治

加味四物湯

八珍湯

傷食嘔吐證治

六君子湯

二陳湯

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

氣喘證治

參附煎

二味參蘇飲

浮腫證治

枳朮湯

小調中湯

小調經散

茯苓導水湯

發熱證治

加味四物湯

加味異功散

六君子湯

生化湯

四物湯

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯

參附湯

寒熱證治

柴胡四物湯

生化湯



南京中医药大学图书馆版权所有

更生散

自汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

參附湯

中風證治

十全大補湯

瘧病證治

加味八珍湯

瘵癰抽搐證治



加味八珍湯

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

八珍湯

二陳湯



御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣

生育門

臨產

妊娠臨產要安詳。腹內雖疼切莫慌。舒身仰臥容胎轉。靜待生時不用忙。

註

妊娠月足臨產。腹內如覺動轉疼痛。須要安詳。莫自慌亂。舒體仰臥。時時緩步。使兒身轉正。靜以待之。至其生育之時。自然順生。不用忙也。

產室



產室寒溫要適時。嚴寒酷熱總非宜。夏要清涼冬要煖。病者醫人俱要知。

註產室之內四時俱要寒溫適中。若太熱太寒均不相宜。夏月必須清涼。勿令炎熱。致產母中暑暈迷。倘有其事不妨少與涼水以解之。冬月必須溫煖。勿令寒冷。以致血凝難產。當多備火爐。使產母腰背下身就火烘之。此臨產之家及醫人皆當知之者也。

擇收生婆

臨產穩婆須預擇。老成歷練又精明。無故莫教使手法。寬心寧耐待時生。

註
臨產之家必用收生婆須預先擇老成歷練明白經事之
人無故切勿令其先使手法如試水探漿等事但囑令寬
心寧耐以待生時可也

驚生

人語喧譁產母驚心虛氣怯號驚生急須止靜休嘈雜產母心
安胎自寧

註

產房之內不可多人人多則語聲喧譁產母之心必驚驚
則心氣虛怯至產時多致困乏號曰驚生有如此者須急
急摒出只留服役一二人使寂靜而無嘈雜之聲則母心
始安安則其胎亦寧靜矣



南京中医药大学图书馆藏

試胎弄胎

月數未足腹中痛。痛定如常名試胎。臨月腹痛腰不痛。或作或止名弄胎。二者均非正產候。但須寧靜莫疑猜。

註

妊娠八九個月時或腹中痛痛定仍然如常者此名試胎。宜養血以安其胎。若月數已足腹痛或作或止腰不痛者此名弄胎。不宜輕動。二者均非正產之時。切勿躁擾疑惑。惟宜寧靜以待其時。

坐草

坐草須知要及時。兒身未順且遲遲。若教產母用力早。逼胎不

正悔難追。

註凡產婦坐草最要及時不可太早若兒身未順寧可遲遲
寬心以待倘坐草太早非正產之時妄使產母用力在
通胎不正遂至橫倒者有之雖悔無及矣
臨盆

兒身轉順頂當門胞漿已破腹腰疼中指跳動穀道挺臨盆用
力送兒生

註凡兒之生自有其時時至則兒身轉順頭頂正當產門胞
漿大來腰重腹痛穀道挺逆產母中指中節或本節跳動
此方爲正產之時方可臨盆用力送兒自順生矣

交骨不開