

瘍醫大全目錄

卷二十

胸膈臍腹部

甘疽門主論


胸發門主論

肺疽門主論

臍中疽門主論

井疽門主論

心漏門主論



北京中医药大学图书馆藏书

赤膈類傷寒門主論

小兒龜胸門主論

脾發疽門主論

胸前蜂窩發門主論

枯筋箭門主論

乳癰門主論

附方

乳頭陷下門主方

乳頭破裂門主論

附方

乳衄門主論



新乡医学院图书馆版权所有

乳法自流不禁門主論附方

乳疳門主論

乳痞門主論附方

乳巖門主論附方

乳少門主論附方

乳汁閉塞脹痛門主方

回乳門主方

斷乳門主方

腕疽門主論



血亂瘡門主論

傳心疽門主論

脇痛門主論 附方

脇疽門主論 附方

內發丹毒門主論

俠熒疽門主論

骨美瘡門主論

黃瓜癰門主論

腰帶癰門主論 附方



幽癰門主論

中腕疽門主論

赫癰門主論

小兒臍汁不乾門主論

附方

小兒臍風門主論

臍突門主論

附方

爛臍門主論

臍中出血門主論

臍上疽門主論



南京中醫藥大學圖書館藏

癰癰門主論

癰漏門主論

肚皮青黑門主方

肚癰門主論
附方

小腹癰門主論

緩疽門主論



附方
中醫藥大學圖書館版權所有

瘍醫大全卷二十

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

胸膈臍腹部

自胸膈起至乳房臍腹脇肋止凡一切癰疽疔毒皆
彙於此部中以便檢閱參治

增錢之栢東陽
男
棉熨用和
全校



癰疽大全



癰疽之類中以外疔最為難治

癰疽之類中以外疔最為難治

癰疽之類中以外疔最為難治

癰疽之類中以外疔最為難治

癰疽之類中以外疔最為難治

癰疽之類中以外疔最為難治

癰疽大全卷二十



南京中醫藥大學圖書館藏

甘疽



甘疽門主論

靈樞云甘疽發於膺

膺胸兩傍高起亦謂之臆

色青其狀如穀實

瓜藪常苦寒熱急治之去其寒熱不急治十日死

死後出膿

心法曰此疽生於乳上肉高聳處屬肺經中府穴

下無論左右皆由憂思氣結而成



胸發門主論

甲斗垣曰胸發發於玉堂

穴在紫宮下一寸六分又名玉英

臚中

元兒穴在玉堂下一寸六分兩乳間

中庭

穴在臚中下一寸六分

鳩尾

穴在臚中下一寸六分

言其骨垂下如鳩形故名臚前蔽骨下五

等穴

人無蔽骨者從岐骨之際下行一寸是也

皆任脉之絡名陰脉之海乃人身之子午也急

內托防毒歸心傷膜者死

啟玄

汪省之曰中庭疽在乳之中央任脉之經

理例

薛立齋曰胸發生於正胸堂去結喉三寸與心窩不

遠乃手足六經交會之所其患最凶喪人性命宜

速治若三四日失治則皮開肉裂甚可畏也若使
長大百不一救宜用牛黃熊膽研細香油調塗四
邊弦上以免開花如痛用乳香沒藥爲末鋪粗紙
內外以青布片捲好蘸清油點著在瘡四圍照之
痛自止矣內服清熱護心祛毒鎮心湯劑若開
穿穴神仙莫救

寒穴脈山其味

鹹自血分內聚散其氣也

內聚散其氣也

散其氣也

散其氣也

散其氣也



肺疽




北京中医药大学图书馆藏

肺疽門主論

申斗垣曰肺疽卽天火瘡乃任脉之經當胸而生在
紫宮玉堂之穴十日可刺膿水黃白色者可治如
無膿漸大傍攻上硬下虛自破流水不絕咳唾引
痛者死

啟立

腫中疽



北京中医药大学图书馆藏书