

雜病篇

寒_下暑濕燥火

東醫寶鑑

卷三
上
下



東醫寶鑑雜病篇卷之三上

東醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也。熱傷寒汗不解，脈沉者，蒼朮白虎湯主之。吐汗下後口乾舌

燥，脈洪大，人參白虎湯主之。凡得病五六日而渴欲飲水不能多者，不當與之。何者？以腹中熱尚少，不能消故也。至七八日大渴欲飲水，惟當少與之，常令不足，勿極意也。言能飲一斗，只與五升。若腹滿，小便不利，若喘，若噦者，不可與之。若小渴咽乾者，少少嚥潤之，令胃氣和，則愈。熱。渴欲飲水，水入即吐，名曰水逆。五苓散主之。厥陰病，渴欲飲水者，少少與之，愈。人。熱在表，則不渴，熱

入裏則渴耗奪津液而然也然有渴必有煩者腎主水熱深則水竭而渴肝太挾心火以生煩故厥陰六七日飲水少而小便少者謂之消渴渴欲水爲欲愈者傳經已盡也脉浮而渴屬太陽宜白虎湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬少陰宜猪苓湯凡渴欲飲水常令不足爲善經云若還不飲非其治強飲須教別病生鬻○渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒也翀○陰盛隔陽之症口燥渴而漱水不嚥蓄血之證亦漱水不欲嚥凡

五苓散

治太陽證內裏煩渴而小便不利澤瀉二錢半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分右

爲末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服。傷寒汗後亡津但渴欲飲水者邪在裡也然上焦虛躁或飲水不散而反吐出爲水逆證或水雖多而小便不利者皆裡熱未實不能消水故耳五苓散

的藥也

竹葉石膏湯

治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渴并差後虛煩等證石膏四兩人參三錢

麥門冬一錢半夏一錢甘草七分右剉作一貼入竹葉七片粳米百粒水煎入姜汁二匙服

傷寒潮熱

潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發

者是謂發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者乃為潮熱也陽明之為病胃家熱也胃實則

譫語。潮熱者似潮水之有信一日一發謂之

潮必日晡而作陽明旺於未中故耳諸承氣湯選

用下或潮於寅卯者屬少陽或於巳午者屬太陽

為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之。吐下後

不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘直視脉弦者生脉濇者死



傷寒發狂

發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌乘衣

而走踰垣上屋不食不臥非大吐下不止表裏俱

熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂

言譫語宜辰砂五苓散呶。如狂者但睡中忽起

行錯言妄語非若發狂莫能制也呶。陽毒發狂

宜陽毒升麻湯陽毒梔子湯。發狂宜用妙

香丸。熒觀三白飲活龍散破棺湯水漬法火劫法

。喜忘如狂蓄血證也。凡發狂見陽證

陽脉者順見陰證陰脉舌捲囊縮者死

三白飲

治傷寒熱病熱極狂走雞子青一箇白蜜一大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

活龍散

治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗研取汁入姜汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和

徐徐灌盡漸次涼快若熱熾則加片腦尤妙名曰地龍水

破棺湯

治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事人屎乾者燒存性水漬飲汁一二盞卽避或

細研如麴新汲水調下三錢亦可俗名野人乾水靛

水漬法

見上陽毒下

火劫法

治發狂炭火一盆置病人之前將醋一碗急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

水喫面亦可

傷寒譫語鄭聲

實則譫語虛則鄭聲譫語者爲亂語無次第數數更端也鄭聲者爲鄭重

頻煩也只將一句舊言重疊頻言之也。陽明病胃實則譫語。大小便利手足冷脉微細者必鄭聲宜用白通湯大便和小便赤手足溫脉洪數者必譫語宜用調胃承氣湯。譫語有實有



虛實則可下虛不可為實者胃實有燥屎可下之
虛者腸胃自利也難治。傷寒大熱呻吟錯語
不得眠黃連解毒湯主之。晝則明了夜則譫語
如見鬼乃婦人熱入血室證也。傷寒發熱譫語
語宜柴胡
連翹湯醫

黃連解毒湯

治傷寒大熱煩燥不得眠或差後飲酒
復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔

子各一錢二分半右
剉作一貼水煎服

柴胡連翹湯

治傷寒發熱譫語呻吟睡臥不得柴胡
黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蒌仁梔子仁

連翹黃連黃柏甘草各八分右
剉作一貼入姜三片水煎服

傷寒結胃

傷寒若脈浮緊下之必結胃。病發於
陽而反下之熱入因作結胃。傷寒表



未解醫反下之隔內拒痛手不可近一云心下滿而硬痛此爲結胃宜大陷胃湯神。若按心下硬痛手不可近燥渴譫語大便實脉沉實有力爲大結胃急以大陷胃湯加枳殼桔梗下之反加煩燥者死醫。小結胃者正在心下按之則痛脉浮滑宜小陷胃湯醫。寒實結胃無熱證者宜三物白散小陷胃湯醫。熱實結胃及寒熱結胃活人書不拘寒熱但用陷胃湯不差用枳實理中丸應手而愈綱。但結胃無大熱者此爲水結在胃脇但頭汗出名曰水結胃小半夏湯加茯苓主之飭覲。熱實結胃宜用大陷胃丸綱結胃宜用灸法熨法未經下而胃滿非結胃也只以小柴胡合小陷胃加枳殼桔梗一服如神醫

大陷胃湯

治大結胃大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分右剉分二貼每取一貼先煎大黃至六

分納硝再煎一二沸去滓納甘遂末攪服得快利止後服𩇛

小陷胷湯

治小結胷半夏製五錢黃連二錢半瓜蒌大者四分之一右剉作一貼水二盞先煎

瓜蒌至一盞乃入分半夏黃連煎至半去滓溫服未利再服利下黃涎便安𩇛。一方加枳實黃芩

桔梗尤效𩇛。瓜蒌惟剉其殼勿剉其子剉其子者非也𩇛

三物白散

治寒實結胷桔梗貝母各三錢巴豆去皮心熬研如脂二錢右爲末和物白湯和服

半錢弱人減半或吐或利不利進熱粥一碗利不止進冷粥一碗𩇛

大陷胷湯

治熱實結胷大黃五錢葶藶子炒杏仁炒各三錢芒硝二錢半甘遂二錢右爲末蜜

丸彈子大每大丸水一盞煎六分溫服未利再服𩇛

灸法

詳見胃部

熨法

詳見胃部

傷寒藏結

病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胃也何為藏結答曰如

結胃狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉細小沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治。病人胃中

素有痞連在臍傍引入小腹入陰筋者此名藏結死。歌曰飲食如常時下利更加舌上白胎時

連臍痛引陰筋者藏結元來死不醫。狀如結胃飲食如故時時下利而舌上白胎。病時素有

痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡加生薑以和

表炙關元以回陽解陰結危哉。藏結與結胃相似皆下後邪氣入裏與陽相結結在胃者為結

胃與陰相結結在藏者爲藏結惟其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或單寒不熱其人反靜飲食

如常時時下利舌上白胎脇助臍腹引入陰筋俱痛者丹田有熱胃中有寒所以難治

傷寒痞氣

病發於陰而反下之因作痞。傷寒嘔而發熱者若心下滿而不痛此爲痞半夏瀉心

湯主之胃虛氣逆者亦主之。心下痞硬按之濡其脉關上浮者三黃瀉心湯主之凡結胃與痞

關脉須沉若關脉浮者宜此湯。心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之。後下利日數

十行穀不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃結熱乃胃中虛客氣上逆故也甘草瀉心湯主之

。汗解後胃不和心下痞硬脇下有水氣腹中雷鳴下利者生姜瀉心湯主之。太陽病外證未

除而數下之遂下利不止心下痞硬表裏不解桂枝人參湯主之。痞氣通用桔梗枳殼湯

。痞氣通用桔梗枳殼湯

。痞氣通用桔梗枳殼湯

。痞氣通用桔梗枳殼湯

。痞氣通用桔梗枳殼湯

。痞氣通用桔梗枳殼湯

。痞氣通用桔梗枳殼湯

半夏瀉心湯

半夏製二錢黃芩人參甘草各一錢半乾姜一錢黃連五分右剉作一貼入姜

三片棗二枚

水煎服服

三黃瀉心湯

大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分

溫再

服服

附子瀉心湯

大黃黃連黃芩各二錢剉附子炮一錢別煮作汁右取白沸湯一盞入二味漬

之良久去滓納附

子汁分溫再服服

甘草瀉心湯

甘草二錢黃芩干姜各一錢半半夏製人參各一錢黃連五分右剉作一貼入

大棗三枚

水煎服服

生薑瀉心湯

生薑半夏各二錢人參干姜各一錢半黃連甘草各一錢黃芩五分右剉作一

貼入棗三枚
水煎服

桂枝人參湯

桂枝另剉甘草炙各一錢八分白朮人參干姜各一錢半右剉作一貼水二盞

煎至一盞入桂枝煮取
七分去滓溫服日二劑

傷寒筋惕肉瞤

動氣在左而發汗則筋惕肉瞤。傷寒筋惕身瞤發汗太過所致也古人以

真武湯主之然真武湯能止其汗而不能定其瞤
瞤者動也蓋汗多則傷血血虛無以榮筋筋愈急
而四體百骸俱爲之瞤動宜以四物湯去地黃加
人參半夏茯苓甘草作劑以五靈脂爲佐入生薑
烏梅煎服自有神效此專主
生血生血乃所以收汗也

傷寒除中證

厥而下利反能食者曰除中不治。○厥而利反能食曰除中其死也可立待之。○厥

○邪在表則能食也邪在裏則不能食今傷寒厥深下利脉遲當不能食而反能食者名曰除中。○之胃氣既除豈可再服。○厥利當不能食今反能食恐爲除中試食以索餅發熱者除中也不發熱者非除中知胃氣尚在必愈也。○

傷寒血證

大陽病六七日表證因在脉微而沉反不結胃其人如狂者以熱在下焦小腹當滿小便

自利者下血乃愈抵當湯主之。○太陽證身黃發狂小腹硬滿自利者血證諦也宜抵當湯。○傷寒小腹滿應小便不利今反利者爲血也當下之宜抵當丸。○太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者自愈但小腹急結者宜攻之宜桃仁承氣湯。○衄忌發汗者爲無脉或脉微故也

若脉浮緊身疼惡寒發熱則汗之可也宜麻黃湯
桂枝湯助汗○若脉微不可汗則犀角地黃湯生
之防觀龜門○少陰病強發汗血出九竅是名下
厥上竭不治○太陽病脉浮緊發熱無汗而身
者自愈也○傷寒頭痛發熱口乾口鼻血出午
後昏沉耳聾脇痛俗名下血汗病也犀角地黃湯
合小柴胡湯主之

抵當湯

治一切瘀血結胃譫語漱水等證水蛭炒
虫炒去足翅桃仁畱尖各十枚大黃蒸三錢

右剉作一貼
水煎服

抵當丸

治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證
但小腹滿而尿利者宜用此緩以下之水蛭

虫各七個桃仁六箇大黃三錢右爲末蜜和分
作二丸水一盞煎一丸至七分頓服未效再服

桃仁承氣湯

治血結膀胱小腹結急便黑譫語漱水宜此攻之大黃三錢桂心芒硝各二錢

甘草二錢桃仁畱尖十枚右剉作一貼水煎入芒硝溫服以瘀血盡下為度

傷寒自利

傷寒陰證身痛脉沉大便自利或嘔或咳宜玄武湯方見○傷寒陽症身熱脉數煩渴引

飲大便利宜柴苓湯○益元散

佳勑○太陰證自利宜理中湯

柴苓湯

治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉一錢三分白朮猪苓赤茯苓各七分半半夏

七分黃芩人參甘草各六分桂心三分

右剉作一貼入姜三片水煎溫服

傷寒胃腹痛

傷寒腹痛中脘痛太陰也臍腹痛少陰也小腹痛厥陰也○心胃硬痛手不可近

為結胃若未經下者非結胃也乃邪氣填塞胃中只以小柴胡加枳梗治之如未效小柴胡合小陷

胃加枳枯一服如神○若心脹滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳枯○若小腹硬小便利則為蓄血之證桃仁承氣湯下之若小便利則利則為尿澁之證五苓散利之若小腹遶臍硬痛小便澀大便秘實者有燥屎也大承氣湯下之○若心下痞滿而硬者宜瀉心湯下之

傷寒吐蛔

傷寒有吐蛔者雖有大熱忌下涼藥犯之必死蓋胃中有寒則蛔不安其所而上隔大肉

之兆也急用理中湯○見加烏梅二箇紅椒十粒煎服待蛔定却以小柴胡湯退熱○傷寒吐蛔者手足冷胃虛空也○黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脉躁疾

陰陽交證

黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脉躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何岐伯曰病

名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨

