

雜病

卷中
二至六編



內科雜病綜古篇目之三

瘡證 附寒熱似瘡及單寒單熱症 共十二方

常山散

辰砂丹

溫脾散

異功散

人參柴胡飲子

露薑煎

露薑飲

清脾飲

四苓散

四獸湯

清中驅瘧飲

鱉甲飲子

痢證 共二十七方

藏用丸

養脾丸

大黃丸

黃芩芍藥湯

潔古芍藥湯

柯子散

香連丸

芍藥蘗皮丸

柯子皮散

固腸丸

人參敗毒散

四七湯

木香化滯湯

香砂枳朮丸

香砂異功散

感應丸

倉廩湯

駐車丸

大斷下丸

氣痢丸

連理丸

治中湯

戊己丸

蒼朮地榆湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

真人養藏湯

四神丸

獨參湯

泄瀉 共二十三方

升陽除溼湯

養胃湯

溫脾湯 一名厚樸湯

乾薑丸

黃耆建中湯

白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯

蒼朮防風湯

清六丸

大分清飲

調中散

胃風湯

痛瀉要方

五味子丸

訶子丸

四柱飲

六柱飲

固腸丸

實脾固腸丸

荳蔻固腸丸

椒附丸

漿水散

訶梨勒丸



內科雜病綜古全書

長沙鄭喬園守謙編述 弟 顏昇 家 吳 全校字

第二篇 瘧痢

第一章 瘧症

附寒熱似瘧及單寒單熱各症

瘧子久矣也有根也

〔病源〕

〔火克金：視本經〕〔水克火〕

夫瘧瘧者。夏傷於暑也。其病秋則寒甚。冬則寒輕。春則惡風。夏則多汗。蓄作有時。以瘧之始發。先起於毫末。伸欠乃作。寒慄鼓頤。腰脊痛。寒去則外內皆熱。頭痛而渴欲飲。此陰陽上下交爭。虛實更作。陰陽相移也。陽並於陰。則陰實陽虛。陽明虛則寒慄鼓頤。巨陽虛則腰背頭項痛。三陽俱虛。陰氣勝。勝則骨寒而痛。寒生於內。故中外皆寒。陽盛則外熱。陰盛則內熱。內外皆熱。則喘而渴欲飲。此得之夏傷於暑。熱氣盛。藏之於皮膚之間。腸胃之外。此榮氣之所舍。令汗出空疏。腠理開。因得秋氣。汗出遇風。乃得之。及浴水氣舍皮膚之內。與衛氣並居。衛氣者。晝日行陽。此氣得陽如外出。得陰如內薄。是以日作。其間日而作者。謂其氣之舍寫。內薄於陰。陽氣獨發。陽邪內



着。陰與陽爭不得出。是以間日而作。瘧候第三條

瘧先寒而後熱。此由夏傷於暑。汗大出。腠理開。遇淒清之水。寒藏於皮膚。秋傷於風。則病盛矣。夫寒者陰氣也。風者陽氣也。先傷於寒。後傷於風。故先寒後熱。先傷於風。後傷於寒。故先熱後寒。亦以時作。名曰溫瘧。夫病瘧六七日。但見熱者。溫瘧也。

溫瘧候

夫瘧者。皆生於風。風者陽氣也。陽主熱。故衛氣每至風府。則腠理開。開則邪入。先傷於風。故發熱而後寒慄。風瘧候

瘧瘧者。肺系有熱。中氣實而不外泄。用力。腠理開。風寒舍於皮膚之間而發。發則陽氣盛。氣不及陰。故但熱不寒。令人消燂肌肉。命曰瘧瘧。陰氣先絕。陽氣獨發。則少氣煩惋。手足熱而嘔也。瘧瘧候

陰陽相並。陽虛則陰勝。陰勝則寒。寒發於內而并於外。所以內外俱寒。故病發但戰慄而鼓頤頤也。寒瘧候

痰實瘧者。謂患人胸膈先有停痰結實。因成瘧病。則令人心下脹滿氣逆煩嘔也。實痰瘧候

生於嶺南。帶山瘴之氣者。其狀發寒熱。休作有時。皆由感溪源嶺嶂溼毒氣故也。其病重

於傷暑之瘧。山瘴瘧候

戴人

夫富貴膏粱之人病瘧。宜以大柴胡湯下之。次服白虎湯。桂苓甘露飲之類。或服小柴胡湯亦可。如不愈。復以常山散吐後。服涼膈散。大忌熱麵及羊肉雞豬魚兔等物。如食之瘧即復作。白帶子瘧瘧。瘧皮癢。瘧外之疾。瘧內年時可食。

貧賤藁葬之人病瘧。以飲食疏糲。衣服寒薄。勞力動作。不可與膏粱之人同法而治。臨發日。可用溫脾散治之。如不愈。用辰砂丹治之則愈矣。服藥訖。宜以長流水煎白虎湯五苓散服之。不宜飲熱燥。以瘧疾是夏傷暑伏熱之故也。儒門事親四卷

河間

夏傷於暑。溫熱閉藏。不得發泄於外。邪氣內行。至秋而發為瘧。初不知何經受病。隨其

動而取之。有中三陽者。有中三陰者。大抵經中邪氣。其症各殊。故內經曰。五藏皆有瘧。其治各別。在太陽經者。謂之風瘧。治法汗之。在陽明經者。謂之熱瘧。治法下之。

太陽風瘧(汗)

明陽熱瘧(下)

少陽風熱瘧(和)

三陰陰瘧(流)

傷瘧(老瘧)重者

瘧



瘧如少陽者以柴

半表半裡三邪

又寒又熱也故又

曰瘧歸肝膽

寒瘧、溫瘧

瘧之傳變陽氣

入於陰則入藏

九藏瘧症治

內科新編

。在少陽經者。謂之風熱瘧。治法和之。此三陽受病者。謂之暴瘧。發在夏至後處暑前。此乃傷之淺者。近而暴也。在陰經則不分三經。總謂之溫瘧。按溫字恐係溼字之誤當從太陰經治之。其病發在處暑後冬至前。此乃傷之重者。遠而為瘧瘧。瘧者老也。故謂之瘧瘧。

保命集

夫寒者陰氣也。風者陽氣也。先傷寒而後傷風。故先寒而後熱。名曰寒瘧。先傷風而後傷寒。故先熱而後寒。名曰溫瘧。熱為有餘。寒為不足。陰勝則寒。陽勝則熱。故瘧者陰陽風寒虛實邪氣不常之所作也。宜明論方

東垣

瘧之為病。以暑舍於榮衛之間。得秋之風寒所傷而後發。亦有不因於此而得之者。邪並於陽則發熱。邪並於陰則發寒。並則病作。離則病止。在氣則發早。在血則發晏。淺則日作。深則間日作。先寒後熱。謂之寒瘧。先熱後寒。謂之溫瘧。二者當治少陽也。渴者燥勝。不渴者溼勝也。

素問五藏瘧。心瘧煩心。欲得清水。桂枝黃芩湯。肝瘧色蒼蒼然太息。四逆湯通脈四逆



六經癰症治

湯。脾癰令人寒。腹中痛。熱則腸中鳴。鳴已汗出。小建中湯（桂枝加芍藥甘草湯）。肺癰令

人心寒。寒甚則熱。熱則善驚。如有所見者。桂枝加芍藥湯。（善治欬神）腎癰令人洒淅腰脊痛。

大便難。手寒。桂枝加當歸芍藥湯。（善治三焦）

素問六經癰。足太陽經癰。腰痛頭重。寒從背起。先寒後熱。汗出難已。羌活加生地（柴

胡加桂枝湯。足陽明經癰。先寒甚。久乃熱。熱去汗出。喜日月光火。氣乃快。桂枝

白虎黃芩芍加桂湯。足太陰經癰。不樂。好太息。不食。多寒熱汗出。病至則善嘔吐

已乃衰。小建中湯異功散。足少陽經癰。身體解俯。寒熱不甚。惡見人。惕惕然。

熱多則汗出。小柴胡湯。足厥陰經癰。腰痛。少腹滿。小便利如癰。數大便。恐懼

氣不足。腹中悒悒。四物玄胡苦揀附子湯。足少陰經癰。令人悶。嘔吐甚。熱多寒

少。欲閉戶牖而處。其病難已。小柴胡半夏湯。（此事難知（係王好古錄其師東垣語）

丹溪

瘧疾有風暑。食痰。老瘧。瘧母。大法風暑當發汗。惡飲食者。必自飲食上得之。

內傷挾外邪同發。內必有痰。二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服。老瘧病係風暑入陰分

。用血藥引出陽分則散。瘧母必用毒藥消之。行氣消堅為主。(改多手補)

有汗(後)要無汗。扶正為主。帶散。小柴胡加桂或白虎加桂。無汗要有汗。散邪為主。帶補。

。桂枝加黃芪知母石膏或人參柴胡飲子。心法

嘉言

夫人身四體安然。外邪得以入而瘧之。每伏藏於半表半裏。入與陰爭則寒。出與陽爭則熱。

。半表半裏者少陽也。謂少陽而兼他經則有之。謂他經全不涉少陽。則不成其為瘧矣。(指正瘧言)

所以仲景曰。瘧脉多弦。弦數者熱。弦遲者寒。弦小緊者下之瘧。弦遲者可溫之。弦緊

者可發汗鍼灸也。浮大者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息止之。謂以梨汁蔗漿生津止渴而消息其熱也。只此

七言。而少陽一經。汗吐下和溫之法具備。其他瘧(瘧)而欲嘔但熱不寒(溫瘧)溫瘧有二三內經言先熱後

寒疹其脈如平有似(牡瘧)瘧母(瘧久不瘥結為癥瘕盤結於少陽所主之脇肋名曰瘧母)四症。要不外少陽求治耳。醫門法律

瘧症四時皆有。而發於夏秋者居多。因當時中上氣虛。水穀停聚。化為痰飲。瘧疾內伏

於胸脅。風暑外至。着於募原。已任編云藏府相接處有虛界之募原其中復有剛柔筋脈夏日毛竅疎通。或不即病。至秋氣

斂縮。表邪不能發越。故進退不已。新涼之陰欲入暑陽從內拒之暑陽久鬱欲泄而出往來寒熱。勢衰

瘧脈



瘧疾之由也。時氣之變。以感。此。是。其。由。也。和。之。法。並。在。包。前。後。推。之。令。其。汗。出。則。愈。

則止。又經曰。衛氣日行於陽。夜行於陰。瘧邪得陽則外出。得陰則內。薄故衛氣之行與邪氣相值則病作。衛氣相離則病亦休矣。人身榮衛晝行陽。脊與背也。夜行陰。

胸與腹也。行至病所。塞而不通。乃作寒戰。或為溫瘧。則先發熱後惡寒。寒輕於熱。經曰。陽虛則惡寒。陰虛則發熱。又陰氣上入於陽。則惡寒。陽氣下陷於陰。則發熱。他

病也。寒已而內外皆熱。或陽氣獨發為瘧。瘧或但寒不熱。為牝瘧。故瘧有陰陽之分。先寒後熱者。先傷於寒而後感風。先熱後寒者。先傷於風而後感寒。寒病屬陰而患深。風則屬陽而病淺。淺者邪出三陽。隨衛氣則

旦作而日日轉蚤。深者邪舍三陰。不能隨衛氣並出。故間日或二三日一作。而日日轉遲。經曰。邪客風府。循脊而下

與衛氣一日夜會於風府。日下一節。故其作晏。其出風府。日下一節。二十五日下至骶骨。二十六日入於脊骨。注於伏膂。其氣上行。九日出缺盆。其氣益高。故作日乃益早。按循節而下之。邪稍遲而入陰。故晏。二十六日行脊已盡。復自後而前。循脊上行。無關節之阻。故速而漸早。

證治大法。宜分三陰三陽。如傷寒六經法。及五藏六府所屬。各見本藏府症。不可拘定少陽一經。諸書指瘧屬少陽者為正。

瘧以少陽為人身半表半裏。陰陽樞紐之界。瘧邪寒熱間作。陰陽同病。故宜以少陽為主也。究竟他經皆有寒熱。且油膜外通肌表。內近藏府。為內外交界之地。亦如少陽之陰陽表裏各居其半。時瘧諸邪從口鼻吸入者。應以三焦分治。其病之淺深。即可以營衛分論。半表半裏之說。尤不得拘於一經。均須從陰分提出陽分。用柴胡治瘧。即是此意。又六淫致瘧。各隨六淫所入

輕重治之。復有痰瘧。食瘧。勞瘧。疫瘧。瘴瘧。鬼瘧等名。無非正虛邪盛之故。均得以陽虛惡寒。陰虛發熱。二者偏勝審測之。古人謂瘧瘧多熱。牝瘧多寒。即以陰陽分之也。瘧邪併於表陽盛陰虛。

陰虛生內熱。陽盛生外熱。故內外皆熱。牝瘧邪併於裏。則陰盛陽虛。陽虛生外寒。陰盛生內寒。故中外皆寒。大抵寒者專理氣分。熱者調氣而兼顧其血分。病久

則陰虛生內熱。陽盛生外熱。故內外皆熱。牝瘧邪併於裏。則陰盛陽虛。陽虛生外寒。陰盛生內寒。故中外皆寒。大抵寒者專理氣分。熱者調氣而兼顧其血分。病久

則陰虛生內熱。陽盛生外熱。故內外皆熱。牝瘧邪併於裏。則陰盛陽虛。陽虛生外寒。陰盛生內寒。故中外皆寒。大抵寒者專理氣分。熱者調氣而兼顧其血分。病久

則陰虛生內熱。陽盛生外熱。故內外皆熱。牝瘧邪併於裏。則陰盛陽虛。陽虛生外寒。陰盛生內寒。故中外皆寒。大抵寒者專理氣分。熱者調氣而兼顧其血分。病久

則陰虛生內熱。陽盛生外熱。故內外皆熱。牝瘧邪併於裏。則陰盛陽虛。陽虛生外寒。陰盛生內寒。故中外皆寒。大抵寒者專理氣分。熱者調氣而兼顧其血分。病久

汗邪在肌表宜發之
吐邪在腸胃吐之
下邪在腸胃泄之

內科雜論

瘧病

結成瘧母。必與疏肝。

邪入肝絡挾瘀血痰涎結塊於腸腋故宜通降

其有瘧邪內陷為痢者。當肝脾並治。兼升提和解。

以清暑溼之邪。此又法中之變也。總言始終治法。無汗以散邪為主。有汗以扶正為主。邪瘧及新發者。可酌用汗吐下三法。虛瘧及久病者。各從其所偏而補救之。勿過呆滯。若正虛而邪滯者。宜一補一發。治實症之深入陰分者。必先升後汗。即病人素稱虛弱。亦先宜用發散以祛客邪。然後扶養胃氣。其他痰食氣積。則先消導。然後緩調其元。此一定之法也。

又通治諸實瘧活套。初起宜散邪。露姜煎。往來寒熱。小柴胡湯。寒多者。柴胡湯加桂枝。寒少熱多者。清脾飲。溼盛者。平胃散。或四苓散。痰多者。二陳湯。兼治痰食。四獸湯。溼熱兩盛。清中驅瘧飲。熱瘧宜白虎湯五汁飲。熱結成痞者。瀉心湯小陷胸等加減。瘧母宜鱉甲煎丸。鱉甲飲子加歸甲桃仁。小兒胎瘧。不能服藥者。用黃丹五錢生礬三錢胡椒二錢半麝香少許共研末以醋調敷手心。男左女右。發汗而愈。凡瘧將發與正發之時。不可服藥。治亦無效。所謂避其銳氣也。當於未發兩時之先而藥之。

〔彙證〕

經錄大要凡前篇已述明者茲不贅

三陽經瘧、太陽腰背頭項俱痛。先寒後熱。熱止汗出。

陽明日痛鼻乾舌燥。寒甚乃熱。熱甚而汗。喜見光火。

少陽口苦脅痛。寒熱往來。

三陰經瘧、少陰寒少熱多。嘔逆口渴。腰痛脊強。少陰為水火之藏（命火腎水）

太陰腸滿不渴。嘔水惡食。厥陰頭痛脅胛少腹滿。小便數而不利。

五藏瘧、肺瘧背寒心寒或咳。（女子易）心瘧煩渴神昏。（生肌散）肝脾腎瘧多寒少熱。症已見前。

六府瘧、六府惟膀胱胆胃各有經症。已見前條。其有屬於本府內症者。則胃津胆汁枯竭

之患。內虛為多。宜與養陰也。

六淫瘧、風瘧感風。（神效散）有寒熱之別。寒瘧感寒。有內外之別。其內病氣虛而寒者亦曰牝

瘧。暑瘧兼受暑溼。宜分三焦。溼瘧專受溼熱或寒溼。偏熱偏濕。（胃）均宜照吳氏溫

病書中所載治之。燥火則併於風與溼熱也。其外感於熱者。亦曰溫瘧。（黃連）血虛內熱者

即曰痺瘧。

痰瘧、陽衰溼盛。土敗痰生。或見痞唾迷厥之證。



食瘧。飲冷食生。饑飽不常。滿悶腹痛。一名胃瘧。邪在膈上。可用吐法。在中消導之。。身症也

勞瘧。小勞便發。氣虛多汗。此證寒熱模糊。或似瘧非瘧。宜益氣補中。

疫瘧。瘧傳染。因天時而發。瘧瘧濁蒸。因地氣而病。均見迷悶寒熱之症。宜與芳

香辟邪。

鬼瘧。陽虛而陰氣襲之。客忤寒熱。寐夢不祥。多生恐怖。或多夜發。俗以符咒壓邪。

究非其治。宜平胃散加桃仁雄黃。通中陽以逐絡中邪氣也。

〔列方〕

大小柴胡湯 白虎湯 五苓散 四逆湯 小建中湯

瀉心湯 陷胸等方均見傷寒書 四物湯 見一卷中風

桂枝甘露飲 見一卷暑症 五汁飲 見二卷燥症 二陳湯 見一卷眩暈

平胃散 見一卷瘧痢厥 涼膈散 見二卷火症

常山散 子和



常山 二兩

甘草 二兩半

爲末、水煎、空心服、

辰砂丹 子和

信一錢

雄黑豆 六十個、或二兩、

爲末、硃砂衣、端午日合、不令鷄犬婦人見、每服一丸、

溫脾散 子和

紫河車 菴豆 各一兩

甘草 五錢

砒一錢另研

右爲細末、後入砒、研勻、每服半錢、新水一盞調煎、如隔日發、待臨臥服、頻日發者、只夜深服、忌葷酒魚兔、

異功散 錢氏

四君子湯加陳皮、

人參柴胡飲子 丹溪錄用子和方

人參 柴胡 黃芩 甘草 大黃 當歸 芍藥 各等分爲末、每三錢水煎、加姜三片、喻嘉言

謂此方於小柴胡去半夏、加大黃歸芍、大柴胡去半夏、只實、加入參當歸、於和法中、略施攻裏之法、深中肯綮、



露薑煎 澹寮中露姜煎只生姜四兩露一宿取露解煩暑之意然治寒瘧不如用吳氏溫病瘧症中之露姜飲為完善茲特錄之

露薑飲

法夏 草果 青皮 生姜汁 各等分露一宿服此吳氏溫瘧中方較露姜煎只一味者為直切病情也

清脾飲 嚴用和

青皮 厚樸 醋炒 柴胡 黃芩 半夏 姜製 茯苓 白朮 土炒 甘草 炙 草果 加姜煎分兩酌用一方加檳榔大渴加麥冬知母瘧不止加酒炒常山一錢烏梅二箇虛瘧忌用

四苓散 仲景

即五苓散除桂

四獸湯 易簡 治食瘧消痰

半夏 人參 茯苓 白朮 橘紅 草果 生姜 烏梅 甘草 大棗 各等分

右即六君子湯加草果烏梅如痰多者宜去甘草大棗服法以鹽少許淹食頃溼紙厚裹懷火煨香



每四錢煎服

清中驅癰飲 和濟局方

柴胡 黃芩 枳殼 厚樸 青皮 陳皮 白朮 法夏 山查炒 草果 生姜各等分 水煎

鼈甲飲子 濟生

鼈甲 黃耆 白朮 檳榔 厚樸 川芎 酒芍 陳皮 烏梅 草果 炙草 各等分 每服

四錢姜棗同煎

鼈甲煎丸 金匱

附方

鼈甲 十二枚炙 烏扇 三分燒 黃芩 三分 柴胡 六分 鼠婦 三分熬 乾姜 三分 大黃 三分

芍藥 五分 桂枝 三分 葶藶 一分熬 石韋 三分去毛 厚樸 三分 丹皮 五分 瞿麥 二分

紫葢 三分 半夏 一分 人參 一分 麋蟲 五分熬 阿膠 三分熬 蜂窩 四分炙 赤硝 十二分

蜣螂 六分熬 桃仁 二分

爲末取煨竈下灰一斗清酒一斛五斗浸灰俟酒盡一半煮鼈甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁納諸藥煎爲丸如梧子大空心服七丸日三服

東垣所引各方多見傷寒中其引經藥均照本方下所載加入故不另錄丹溪方中加味亦如之

附寒熱似瘧及單寒單熱症

(一) 寒熱往來。或先寒後熱。或先熱後寒。多在肌膚之間。半表半裏之際。蓋內陰陰虛生

外陽。陽虛生互相勝復也。又晝熱夜靜者。為虛陽偏盛於陽分。晝靜夜熱者。是陽氣

下陷於陰中。

(一) 寒熱交作。仲景云。發熱惡寒者發於陽。無熱惡寒者發於陰。蓋營傷則寒。衛傷則熱

。或由外感。或本身營衛不和。皆致病如此也。

(一) 寒熱表裏內外之別。有表症而身寒熱者為外感。無表症而自有寒熱者為內傷。外感惡

寒。雖近火不除。(本此標度)內傷惡寒。稍近溫即止。熱在外。寒在內。則身熱反欲近衣。寒在

外。熱在內。則身大寒反不欲近衣也。

(一) 發熱外因。傷寒。鬱遏食積。手足心熱中溫暑。灼傷肺秋燥。有寒熱兩種溫潤各溼熱。陽傷而

分每多下

(一) 發熱內因。氣鬱。氣鬱於血血鬱。瘀血骨蒸陽虛外越。真元內竭陰盛格陽陰虛內躁。水津不足夜

勞熱等症汗出面赤脈數而軟分或寅卯時

