

傷寒心悟

中集



中
卷
五

傷寒心悟集

中

雲間楓
涇楊
福增
三辰
編



門人

珠唐又寅頌克公參
溪莊惟鳳舜儀抄正

珠夏傳平治臣校字

蔣運雷一聲公校

太陽病條辨

太陽病頭痛項強主藥桂枝麻黃

第一百一十章

四節。論桂枝湯能調和營衛。

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自

出陰陽衛陽也

晝晝惡寒

晝晝惡寒也

淅淅惡風

淅淅惡風寒貌淅形翕

翕發熱或甚

鼻鳴乾嘔者

鼻鳴風邪在

乾嘔邪欲出

桂枝湯主之

桂枝湯主之



太陽病發熱汗出者此為營弱衛強故使汗出欲救

邪風者宜桂枝湯汗出因邪風者桂枝湯主之

病嘗自汗出者此為營氣和營氣和者外不諧不即和

以衛氣不共營氣和諧故爾以營行脉中衛行脉外

復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯經云營行脉中衛行脉外是相離而

相濟今有離而無濟故假桂枝湯復發其汗蓋桂枝湯本開合之劑調和營衛方也

病人藏無他病時發熱一曰二自汗出而不愈者此

衛氣不和也風邪先去其時發汗則愈服宜桂枝湯

第一百二十二章

太陽病外證未解身熱脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲解外者

宜桂枝湯身熱未解設不大便五六日亦不可下之必陽邪入裏故云下之為逆

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却

與桂枝湯則愈風邪深結非湯液所及必佐針刺乃愈

傷寒汗不出熱結於經風府在項中上髮際一寸主中風傷寒頭痛項急煩熱狂走

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法



若不上衝者不可與之其氣上衝者以其人正氣充

而從表解可與桂枝湯

不上衝

雖經上

誤下者其邪仍欲上出

裏隨證治之

上衝

如嘔惡氣上衝胸類

邪已入

其邪仍欲上出

太陽病先發汗不解而復下之

脈浮者不愈

下安得

用

愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外

當須解外則愈宜桂枝湯

傷寒發汗解半日許復煩

脈浮數者

可更發汗

宜桂

枝湯

傷寒煩熱

脈浮數者

是作汗而

發汗

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便

煩熱

因發汗未透故可更發汗

是作汗而

發汗

發汗

清者。知不在裏。仍在表也。當須發汗。若頭痛者。必衄。
 宜桂枝湯。宜桂枝湯。宜桂枝湯。宜桂枝湯。宜桂枝湯。
 與承氣湯。與承氣湯。與承氣湯。與承氣湯。與承氣湯。
 陽本經頭痛。陽本經頭痛。陽本經頭痛。陽本經頭痛。陽本經頭痛。
 劇者。以太陽經熱太。劇者。以太陽經熱太。劇者。以太陽經熱太。劇者。以太陽經熱太。劇者。以太陽經熱太。
 重。必血溢鼻衄也。重。必血溢鼻衄也。重。必血溢鼻衄也。重。必血溢鼻衄也。重。必血溢鼻衄也。

第一百十三章。六節。論太陽病變局。隨證施治。

傷寒。大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可
 攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞
 宜大黃黃連瀉心湯。發汗。指麻黃湯。言大下後。復發
 汗。是倒行逆施。心下痞。而惡寒。

先解表後攻
痞此是緊要

傷寒陽脉瀉陰脉注法當腹中急痛先與小建中湯

不差者與小柴胡湯主之陽脉主陰脉有作寸脉大脈

乘脾先與小建中湯和心脾解胸腹之寒痛不差
與小柴胡湯脾中肝鬱肝脾不和則腹痛自止矣

發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其營

衛以通津液後自愈亡陽譫語是心陽散失未可誤

心陽小柴胡和胃氣故服後便愈

太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此



為壞病。桂枝不中與也。觀其脉證，知犯何逆，隨證治之。
 太陽病，三日未發汗，理當不解，今已發汗，仍不
 解，若吐，亦不解，下亦不解，若溫針，亦不解，此為不
 壞病。壞病者，敗也，是真藏氣敗，非關醫誤。雖太陽外證，未解，水則利之，畜中與也。觀其脉證，知犯何逆，隨證治之。正虛病實，則疏補之，故曰隨證治之。
 桂枝本為解肌，若其人脉浮緊，發熱，汗不出者，不可與之。當須識此，勿令誤也。桂枝湯內有白芍，為太陽若脉浮緩，發熱，無汗者，當用桂枝。枝湯，獸熱，稀粥，資胃陰，以作汗。
 若酒客病，不可與桂枝，得之則嘔，以酒客不喜甘故。

也。桂枝湯內有甘草。為酒客病戒。甘草滿中。胸滿者忌之。嘔家不喜甘。亦忌之。

第一百十四章

六節論麻黃湯發汗須知脈浮緊者

太陽病。脈浮緊。無汗發熱。身疼痛。八九日不解。表證

仍在此。當發其汗。服藥已微除。其人發煩。目瞑劇者

必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。麻

湯主之。義在此。當發其汗。句下。服麻黃湯。當解微除

而不解者。以其人陽氣太重。表鬱不能作汗。以致發

煩。目瞑劇者。血隨熱沸。衄乃解矣。

傷寒。脈浮緊。不發汗。因致衄者。麻黃湯主之。發熱身



無汗自出者愈不發汗言未曾服過發汗藥熱無從
浮緊身疼痛表未解也可與麻黃湯仍發熱無汗脈
衄者愈言衄後熱退脈靜此之謂紅汗自

太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也

滿脇痛者陽與小柴胡湯脈但浮者太陽與麻黃湯

太陽與陽明合病喘而胸滿者喘太陽胸不可下宜

麻黃湯主之

脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯麻黃湯正條見太

不書脈本條但書脈不書證二條當

合參方合麻黃湯脈麻黃湯證矣



脉浮而数者。可發汗。宜麻黃湯。脉傷寒必浮。化熱。鬱表。數無汗。

紫較數之有力。正合傷寒化熱。鬱表。無汗之脉也。

第一百十五章。二節。論青龍。大小。主治不同。

傷寒。脉浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大

青龍湯主之。而無少陰證。無嗜臥下利。口燥舌乾。

傷寒。心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。水喘氣之微。服

湯已。指小青龍渴者。此寒氣欲解也。水之陽者。寒小。青龍湯

主之。此句義在發熱。不渴。句下。

第一百十六章。三節。論太陽。病。陽邪內陷。



太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而

渴胃燥渴結津氣不行日晡所小有潮熱從心上至少腹硬滿

而痛不可近者可下手近不大陷胸湯主之

但結胸無大熱者移外熱此為水結在胸脇也水與熱結但

頭汗出者水熱上蒸大陷胸湯主之其脉浮大者不可下

下之則死結胸證悉具煩躁者死下利者亦死

太陽病身黃脉沉結少腹硬小便不利者為無血也

小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之鮮見太



畜血條

第一百一十七章

四節論太陽病。小便不利而消渴。五苓散證。

太陽病。寸緩關浮。尺弱。

有陽本虛。

其人發熱。汗出。

惡寒。

惡寒不嘔。

但心下痞。

但心下痞者。此以醫下之也。

惡寒。表未解。不嘔。裏氣和。

但心下痞。不硬不痛。

如

其不下者。病人不惡寒而渴者。此

轉屬陽明也。

如未下過。但熱而渴。此太陽已傳陽明。扼點白虎湯證。

小便數者。大便必

硬。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水者。少少與之。

但以法救之。渴者與五苓散。

若因水消渴。故與五苓。

太陽病。發汗後。惡寒者。虛也。無陽也。身大熱。反欲得近衣者。可下也。身大熱。反欲得近衣者。可下也。



本以下之。故心下痞。與瀉心湯痞不解。其人渴而口

燥煩小便不利者五苓散主之

痞而渴燥煩津氣不利用五苓全在小便不利

明病自執煩者是太陽病胸間積水膀胱有熱身重

中風發熱六七日不解而煩有表裏證表太陽外證

渴欲飲水水入則吐者名曰水逆胸中不能容水五苓散

主之多飲煖水汗出愈五苓表裏兩治能令水氣可

沸湯能助藥力

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之即所謂有表裏證是也



第一百八章 三節論心下悸與心亂

傷寒厥而心下悸者水停宜先治水當服茯苓甘草湯

却治其厥不爾水漬入胃必作利也

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身

瞤動振振欲擗地者直武湯主之心下悸頭眩身瞤動

安位陽氣虛浮無依著故用真武湯鎮伏腎水莫定坎陽

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼宜禹餘糧丸
汗出而身熱者風也當用桂枝湯不當用麻黃湯
重發汗汗乃心之液過汗心腎大傷必恍惚心亂



小便後陰疼。禹餘糧石脂丸。本論無方。疑即是赤石脂禹
餘糧湯作丸。禹餘糧石脂血分重劑。本走下焦。陰分可
愈。恍惚心亂。小便後陰疼。

第一百二十九章。陽併病論。太陽傳經及太陽少

傷寒一日太陽受之。脉若靜者為不傳。脉靜是不正氣

若煩躁。脉數急者為傳也。已煩躁。脉數急。正氣也。二三日

陽明少陽證不見者為不傳也。少陽明身熱不得卧

太陽病。頭痛至七八日以上。自愈者。以行其經盡故

也。巨陽若欲作再經者。如日疼。鼻乾。身熱。足陽明使

