

背癰疽瘡

肺癰

乳癰

癰疽

胃癰

腹癰

腦項疽

腸癰

多骨疽

懸癰

瘰癧

便癰

癰疽

下疳瘡

腎癰

腰疽

囊癰

附骨疽

肩癰

脚跟瘡

腿癰
附腿腫

徽瘡
附結毒漏闌

色診

尸鑿

附鐵驗

死枕

附金瘡

漏闌

附金瘡

漏



京中医药大学图书馆版权所有

名醫類案 酒

名醫類案卷第十

新都篁南江瓘集

後學

錢塘魏之秀玉橫
仁和沈烺敷曾重校

欽

鮑廷博以文

仁和余集蓉裳

背癰疽瘡

宋戶部尙書沈詵爲人仁厚一兵卒患背疽乞假親爲合藥治之時旱蝗當致齋圜邱猶丁寧料理藥內用酒恐市酤不中用自取酒入藥服之卽愈其法用瓜蔞子一枚乳香沒藥各一錢甘草三錢用醇酒九盞臨服嚼沒藥一塊飲此酒極妙

葷航紀談



北京中医药大学图书馆版权所有

羅謙甫治一人年踰六旬冬至後數日疽發背五七日腫勢
約七寸許痛甚瘍醫曰膿已成可開發矣病者恐不從
日醫曰不開恐生變症遂以燔針開之膿泄痛減以開遲
之故迨二日變症果生覺重如負石熱如燔火痛楚倍常
六脈沉數按之有力此膏梁積熱之變也邪氣酷熱固宜
以寒藥治之時月嚴寒復有用寒遠寒之戒乃思內經云
有假者反之雖違其時從證可也秀按脈實症實必用涼解舍時從症夫復何疑

急作清涼飲子加川黃連一兩五錢作一服服之利下兩
行痛減七分翌日復進前藥其證悉除月餘平復

京師人司仲父患背瘡若負火炭晝夜呼叫司仲泣於途遇

道人曰子何憂之深也子當求不耕之地遇野人糞爲蟲鳥所殘卽以杖去其糞取其下土篩而敷之乃如其言用之立愈父曰豈以冰著吾背耶吾五臟俱寒矣

房州虞候張進本北方人因送郡守還逢道人飲之酒得其治癰疽方文錄曹子病背瘡醫不能療聞進有此方索之進元無手訣但以成藥敷之旬日而愈一兒五歲鬚邊生瘡繼又發于腦後症候可憂亦以敷進凡所用皆一種不過三夕二患皆平其方但擇阿膠透徹者一兩水半升煎令消然後入虢丹一兩慢火再熬數數攪勻俟三五沸取出攤令極冷貯磁餅中用時以毛掃布瘡四面而露其

取出攤令極冷貯磁餅中用時以毛掃布瘡四面而露其

口如瘡未成則遍塗腫處良久自消切勿犯手更無他法
一切惡瘡皆可敷不特癰疽也

類說

虞奕侍郎背中發小瘡不悟只以藥調補數日不疼不癢又
不滋蔓疑之呼外醫灸二百壯已無及此公平生不服藥
一年來唯覺時時手脚心熱疾作不早治又誤服補藥何
可久也蓋發背無補法諺云背無好瘡但發于中正者爲

真發背

泊宅編

揚州名醫楊吉老其術甚著有一士人狀若有疾厭厭不聊
莫能名其爲何苦往謁之楊曰君熱症已極氣血消鍛且
盡自此三年當以疽死不可爲也士人不樂而退聞茅山

觀中一道士醫術通神但不肯以技自名未必爲人致力
士人心計交切乃衣童僕之衣詣山拜之願執役左右道
士喜畱寘弟子中誨以誦經日夕祇事願旨如意經兩月
餘覺其與常隸別呼叩所從來始再拜謝過以實告之道
士笑曰世豈有醫不得的病當爲子脈之又笑曰汝便可
下山吾亦無藥與汝但日日買好梨啖一顆如生梨已盡
則取乾者泡湯飲之仍食其滓此疾自當平士人歸謹如
其戒經一歲復往揚州楊醫見之驚其顏貌腴澤脈息和
平謂之曰君必遇異人不然何以至此士人以告楊立具
衣冠焚香望茅山設拜蓋自咎其術之未至也

類編

程明佑治槐兒胡嫗年六十疽發背大如盂頭如蜂窠嘔逆
咽不下瘍醫藥之毒雖殺而胃寒泄程曰病必分陰陽虛
實胃傷於寒令人嘔逆溫補則榮衛充而氣血周貫則毒
隨膿出而肌肉漸生依方投藥四五劑咽遂下嘔止已癰
潰體漸平

陳斗嵩治王主政福建人臂患一癰痛甚發咳逆十餘日水
穀不下脈伏如絕醫皆不治陳視之曰此寒涼過甚中氣
下陷以四珍加薑桂三進而病如失癰亦漸愈

丹溪治一人背癰徑尺穴深而黑急作參芪歸木膏飲之三
日畧以艾蒿湯洗之氣息奄奄然可飲食每日作多肉餽

飪大碗與之。盡藥膏五觔。餽飪三十碗。瘡漸合肉與餽飪補氣之有益者也。

一老人背發疽。徑尺已與五香十宣散數十貼。嘔逆不睡。素有淋病。急以參芪歸朮膏。以牛膝湯入竹瀝飲之。淋止。思食。盡藥四觔。膿自湧出而愈。

一人發背癰疽。得內托十宣多矣。見膿。嘔。逆。發熱。發熱決非如燐火

又用嘉禾散加丁香。時天熱。脈洪數有力。此潰瘍尤所忌。然形氣實。只與參膏竹瀝飲之。盡藥十五六觔。竹百餘竿而安。後不戒口味。夏月醉坐水池中。經年餘。左脇旁生軟塊。二年後成疽。自見脈症。嘔逆如前。仍服參膏等而安。若

與十宣其能然乎

一婦因得子遲。服神仙聚寶丹。背生癰甚危。脈散大而濶。
以加減四物湯百餘貼補其陰血。幸其質厚易于收救。
一人形實色黑。背生紅腫。近髀骨下痛甚。脈浮數而洪緊。正
冬月與麻黃桂枝湯加酒栢生附子瓜蔞子甘草人參羌
活青皮黃芪半夏生薑六貼而消。

一男子年五十餘。形實色黑。背生紅腫。及胛骨下痛甚。脈浮
數而洪緊。食亦嘔秀按與前案同
只多此三字 正冬月與麻黃桂枝湯
加酒黃柏生附子瓜蔞子甘草節羌活青皮人參黃芩半
夏生薑六貼而消。此亦內托之法也。

周評事觀患背癰瘡口久不合召瘍醫徐廷禮療治恒以托
裏十宣二散與服不效徐謂周曰更請盛用美來共事料
理則可否則吾技窮矣既而盛至按服用藥率與徐類但
多加人參五錢附子稍行功耳服後兩足俱緩自下而上
謂其子曰今之藥何神哉頓覺神爽快服之旬日而宿口
平復俞子容曰國初吾吳中老醫多見其用附子往往治
病如庖丁解牛近醫者多棄而不用何耶近日則以附子爲常服之品所
謂過猶不及

一人患發背腸胃可窺百藥不差一醫教以楸葉膏敷其外
又用雲母膏作小丸子服盡四兩不累日雲母透出膚外

與楸葉膏相黏著瘡口遂平功亦奇矣其方立秋日太陽未升之時採楸葉熬爲膏敷瘡瘍一切惡瘡腫毒立愈按秀此方簡而神癒醫罕用何也謂之楸葉膏云葛常之韻語陽秋

南史曰薛伯宗善徙癰公孫太患發背伯宗爲氣封之徙置齋前柳樹上明日而癰消樹邊倏起一瘡如拳大稍稍長二十餘日瘡大膿潰爛出黃赤汁升餘樹爲之痿損此祝由法一方士嘗貨藥淮西值兵變竄入深山遇老姥年二百許歲自謂金亡避兵來此元完顏氏之醫姥也傳以背瘡方用鮮射干一味每用三錢研細溫酒調服乾者爲末每服一小錢許酒下在上卽微吐在下卽微利功效如神仍用膏



藥收口又傳壽星散治惡瘡痛莫當者。繙之不痛不痛者知痛大天南星一味爲末。養生主論。

古朴翁治一人患背癰。有醫者已爲驅熱拔毒。痛腫已熾。告技窮翁診之。曰此易易耳。無用藥也。遂煎醋一碗。入鹽少許。以紙數重漬塌腫上。再以銅斗盛火熨之。不數易而病如失。

汪石山治一老人患背癰。請汪診視脈洪緩而濡。癰腫如碗。皮肉不變。按之不甚痛。微發寒熱。乃語之曰。若在髓。脾經絡交錯。皮薄骨高之處。則難矣。今腫去。胛骨下掌許。乃太陽經分。尙可治。遂用黃芪五錢。當歸。羌活。甘草。節各一錢。

先令以被蓋。煖藥熟。熱服。令微汗。寢熟。腫消一暉。五服遂安。

薛已治進士張德宏。背疽微腫。微赤。飲食少。思用托裏藥。膿成而潰。再用大補湯之類。肉生而歟。忽寒熱作嘔。患處復腫。其脈浮大。按之若無形。氣殊倦。薛謂之曰。此胃氣虛憊。非瘡毒也。彼云侵晨登廁。觸穢始作。仍用補藥而歟。立齋名重
一時所治俱膏梁富貴之家故每以溫補取效。若執此法以治背疽。是癡人說夢。

一大背患疽年餘。瘡口甚小。色黯陷下。形氣怯弱。脈浮緩。而濇。此氣血虛寒也。用十全大補加附子少許。數劑而元氣漸復。卻去附子。又三十餘劑全愈。

一婦年五十餘四月初背當心生疽如粟大三日漸大根盤
五寸許不腫痛不寒熱薛診其脈微而沉曰脈病而形不
病者忌也實則痛虛則癢陰症陽症之所由分也不發不
治潰而不歛亦不治乃與大補陽氣之劑色白而黯瘡勢
如故至十二日薛復診其脈沉瘡勢不起神疲食減小便
淋漓乃與大補氣血加薑桂二劑瘡亦不起十五日因怒
嘔瀉並作復大補藥一劑瘡仍不起薛畱藥二劑而去病
者昏憒不服或勸之省悟依方連進七劑十六日瘡起而
潰色紅而淡膿亦如之十九日薛至喜曰瘡已踰險處但
元氣消鑠尚可憂連與大補二十餘劑五月十一日病者

因勞自汗。口乾舌強。太陽髮際腦頂俱脹。復延薛至診之。
曰。此氣血俱虛。肝膽火上炎。用補中益氣湯加山梔芍藥。
頓愈。但內熱少睡。手足發熱。不時霍熱。用逍遙散加山梔。
熱退。復用歸脾湯。瘡乃愈。計瘡發及歛四十二日。

內翰楊臯湖孟夏患背疽。服尅伐之劑。兼旬漫腫堅硬重如
負石。隔蒜灸五十餘壯。背遂輕快。先服尅伐又灸則毒盡矣且無壯熱故溫補而愈。乃以六君子加砂仁二劑。涎沫湧出。飲食愈少。此脾虛

陽氣脫陷。又用溫補。反嘔不食。仍用藥作大劑。加附子一兩。
桂又不應。遂以參芪各一觔。歸朮陳皮各半觔。附子一兩。
煎膏服。三日而盡流涎。頓止。腐肉頓潰。飲食頓進。再用薑

桂等藥托裏健脾腐脫而瘡愈此等治法非
明眼不能

儒者顧大有年幾六旬仲冬背疽初起入房患處黑死五寸
許黯暈尺餘漫腫堅硬背如負石發熱作渴小便頻數兩
耳重聽揚手露體神思昏憤脈沉而細右手爲甚以脈爲主症屬假陽
症便秘二十七日計進飲食百餘碗腹內如常衆欲通
之薛曰所喜者此耳急用大劑六君子加薑附肉桂三劑
瘡始緩痛自後空心用前藥午後以六味丸料加參芪歸
术五劑復用活命飲二劑看他先溫補後解毒針出黑血甚多瘀膿
少許背卽輕軟仍用前藥便亦通利薛他往四日神思復
昏瘡仍黑陷飲食不進皆以爲殞薛以參芪歸术各一兩

炮附子五錢。薑桂各三錢。服之卽索飲食并鴨子一枚。自後日進前藥二劑。肉腐膿潰而愈。

少叅史南湖之內夏患疽不起。發脈大而無力。發熱作渴。自汗盜汗。用參芪大補之劑益加手足逆冷。大便不實。喘促時嘔脈微細。按之如無。惟太衝不絕。太衝乃肝俞在足大指本節後二寸半或一寸半。初大而無力用補而反見虛症并見細脈所謂真虛若投涼解之劑脈必愈。大搏指此中玄機識者有幾。仍以參芪歸朮茯苓陳皮計觔許加附子五錢煎膏作二服。諸症頓退。脈息頓復。翌日瘡起而潰。前藥仍用四劑。後日用托裏藥調理兩月而愈。

操江都憲伍松月背瘡愈後。大熱誤爲實火。用苦寒藥一錘。