

衛生家寶產科備要卷第七

胎孕方

人參白朮散治婦人經候不來身如病而無病脈滑大而六部俱勻必有孕也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作他疾治之

白朮壹兩

去蘆切焙

人參半兩

去蘆切焙

丁香

油者剉碎懷乾

甘草

炙剉

各壹分

右為末每服叁錢水壹盞生薑叁片同煎柒分盞去滓溫服食前嘗驗之清晨意味佳自午後漸惡者是有孕無疑也

千金半夏茯苓湯治妊娠惡阻病其證心中憤悶虛煩吐噦惡聞食氣頭眩四肢百節煩疼沉重多卧少起惡寒汗出疲極瘦悴

半夏

湯泡七遍

茯苓

去皮剉碎

熟乾地黄

水略洗熬乾剉碎慢火焙

各壹兩

式錢

橘皮去白

細辛去葉

人參去蘆切

白芍藥

判

旋覆花淨

芎藭洗

桔梗去蘆

甘草炙各

右拾壹味為麤末每服肆大錢水壹盞半生薑伍片煎至柒分去滓微熱服

方有隨病加減及相繼合服茯苓圓並見千金本方

枳殼散妊娠至五月以後能順氣瘦胎易產

枳殼捌兩去穰麤炒秤

甘草肆兩炙秤碎

右為細末湯點式錢空心晚食前日兩服入月參服

陳逍遙水酒散能治妊娠百疾安養胎氣自伍陸箇月以後常服

至產時草蓐之間痛當減半

當歸洗去蘆須切片子焙

槐角擇淨炒香

枳殼去穰麤炒

川芎洗判

貝母去心薑汁製壹宿焙乾

右伍味等分為細末每服式錢水酒各半盞同煎至柒分食空

時服臨月日進兩叁服

人 檳榔散治妊娠常若膏腹脹滿兩脇妨悶飲食不下四肢無力頻

服能滑胎益氣

檳榔 剉碎

赤茯苓 去皮剉

前胡 去蘆 各壹兩

人參 去蘆切片

子焙

白朮 去蘆切片子焙

芎各半兩

陳皮 去白

枳殼

去穢炒

各叁分

甘草壹分 炙剉

右玖味為細末每服式錢水壹盞薑叁片棗子式箇煎至柒分盞

溫服日兩服

人 治胎不穩坐卧不得安方

木賊 去節剉

川芎 洗剉

右式味等分為細末每服肆錢水壹盞入金銀同煎至陸分盞去

滓空腹溫服日叁服取效



治妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍方

縮砂不以多少熨斗中慢火炒令熟透去皮取仁

右為細末每服式錢熱酒調下須臾腹中胎動處覺極熱即胎已

安

治胎動若胎已死即下未死即安及治血下心腹滿者如湯沃雪

方即用聖功川芎湯用大劑酒水各半煎連參服取効本方在後

千金蟹爪湯治妊娠閃撲僵仆失據胎動轉上搶心甚者血從口

出逆不得息或注下血壹斗胎死不出母氣欲絕服此母即安血亦

止當產者立下未產者胎再安

蟹爪半盞

以多為佳

甘草

炙剉

桂

去皮剉不見火

各壹兩

阿膠壹兩

剉碎用蚌蚶炒炮起篩去蚌粉用

右以東流水拾盞煮前參味至伍盞去滓入阿膠再煮至膠洋盡

頓服為佳不能者分減服一時辰間取盡劑已不能飲者幹開口灌之

又方治胎動及難產子死腹中若妊兩子壹子已死壹子尚生服之能令死者出生者安與前千金蟹爪湯方同唯不用桂耳
葱白湯治妊娠傷寒頭疼發熱不可同常法治之用此藥最穩

大葱白拾莖

去青連鬚用或小青
加至式叁拾莖切碎

生薑貳兩

切碎

右用水貳碗煮至壹碗去滓分兩叁服熱服之取效快

白朮散治妊娠傷寒

白朮

去蘆切
片子焙

黃芩

剉碎

右等分剉用新瓦上炒香為細末每服叁錢水壹盞生薑叁片棗子壹枚同煎至陸分盞熱服唯四肢逆冷陰證見者未可服

治妊娠傷寒大熱甚胎不安者方

阿膠壹兩

洗剉碎以蛤粉末同炒
泡起篩去粉候冷入碾

右為細末每服式錢竹瀝調下卒無竹瀝用小交竹葉同煎湯調亦可

治妊娠傷寒大熱令胎不落方

竈底黃土為末

右用新水調塗臍下周迴伍陸寸乾即復塗頻頻為之熱退乃止方或用酒及泔清調皆可

治妊娠小便卒不通方

裏茶弱葉壹兩

燒灰研

滑石半兩

研細

右同研勻每服壹式錢用臈茶清調入生油式叁點服只沸湯調亦得

又方

赤連珠甘遂

產前方
右為末每服壹字至半錢湯調下

如喫了藥且不得服有甘草藥半日或壹日緣二藥相反故也

榆皮滑胎散妊娠入月宜服之多往往坐蓐不覺胎下如未入月

不可先服

榆白皮貳兩

切焙

右為細末每服貳錢煎糯米飲調下空心食前服

墨神散催生及治橫逆生服之即順

百草霜

右為細末每服貳錢用米醋童子小便各少許調成稀膏沸湯侵

至陸分盞溫服

催生桂散有三五日不能產者只壹服再服神驗

官桂

去皮曬乾不得見火

右為細末每服貳錢沸湯或童子小便調下

治難產或橫倒生或胎死不出母氣欲絕方



醫藥大學圖書館藏

半夏

湯泡洗
遍焙乾

白斂

右等分為細末每服式錢酒調下不能酒者湯調小難壹服橫生
式服倒生叁服胎死肆服加瞿麥壹倍尤良

又方治應干難產胎衣不下只叁服

以蛇皮燒過或以銚子炒微黑

右研細入麝香少許用熟湯調通口服之每服壹錢

又方

車前子

不以
多少

右為細末用熟湯或小便調服式錢

又方

雲母粉半兩

右以酒調式錢即產不順者即順下

易產方

當歸壹兩半

去蘆須
切片焙

桑寄生半兩

揀淨

川芎壹兩

剉碎



南京中醫藥大學圖書館

右為麤末每服肆錢水酒各半盞煎至陸分去滓通口服不計時

小琥珀散安胎氣調血脈應是產前產後血氣諸疾俱能療治神

効

川芎陸兩

揀顆顆如核
桃肉者生剉

川當歸去尖梢蘆頭淨肆兩

好酒浸壹宿燉火炙令
黃色不得焦候令切細

桑寄生式兩

右焙乾搗羅為末每服式錢水捌分盞煎至陸分卻入好酒式分

更煎叁兩沸溫服孕婦臨月空心壹服至卧蓐時胎滑易生惡物

亦少新血便生臟腑自然不痛

下死胎方

朴消壹兩

右為末每服式錢溫童子小便調下嘗因產試之極驗

下鬼胎方婦人稱孕坐產乃不下有經三五日者乃鬼胎也

蜀椒式兩

去目
微炒

葱式握

桃頭枝拾肆枚

右用水壹斗煮熟乘熱傾盆器中令婦人坐上薰蒸之當自散

治草蓐或產後血暈悶絕兼治魘死卒死溺死縊死等謂之五絕
卒中風牙關緊氣不通用之亦驗

生半夏壹兩

右為細末用壹豆許蘆管吹入鼻竅中即甦

產後方

牛膝湯治胞衣不出令胞自爛

牛膝

酒浸壹宿控乾切碎焙乾

瞿麥

剉

各壹兩

滑石貳兩

槌碎

當歸叁分

去蘆須切片焙

通草壹兩半

切

葵子貳合半

右陸味用水玖盞煎取叁盞分作叁肆服

當歸建中湯治產後虛羸不足腹中病痛吸吸短氣或小腹拘急

痛引腰背不能飲食凡產後壹月內服叁肆劑為善令人丁壯古方

云產前安胎四物湯產後補益建中湯者謂此也



南京中醫藥大學圖書館

當歸貳兩

剉去蘆秤

官桂壹兩半

剉去皮秤

白芍藥叁兩

甘草壹兩

炙

右為麤末每服肆錢水壹盞半生薑伍片棗貳箇同煎柒分盞去滓入錫少許再煎微熱服空心食前日叁服如喜嘔人不用入錫

聖功川芎湯治產後血虛迷悶旋運耳鳴不省人事膏膈不快惡心嘔逆化惡血生好血尤治血崩血噤亦治頭疼發熱如傷寒證者治病甚多此產家之要藥也

大芎半兩

當歸壹分

去蘆

右式味細剉作壹劑用水壹盞半好酒壹盞同煎至壹盞半分式服如新產血未定及平常飲酒少人但只用水式盞煎兩箇陸分盞卻將童子小便添成兩箇捌分盞服之

琥珀黑神散治產婦十八惡證凡臨產宜進壹式服能安神順胎

產後雖無疾禁日內亦日進壹式服能去諸疾壓驚若偶被驚恐或變證當連服取效

琥珀

別研如麵細

辰砂

別研各式錢

麝香

別研

好墨

燒邊研

白殭蚕

炒

各壹錢

當歸末

鯉魚鱗灰

百草霜

白附子末

黑衣

即竈額上倒掛黑塵無即以蠶衣燒灰代

各叁錢

右拾味研勻每服式平錢炒生薑酒和童子小便調湯盪溫服如產後崩中狀似雞用寒熱閉悶或產後四肢浮腫及寒熱當先服此散次服通宣圓

通宣圓

巴豆壹拾伍粒去心膜生絹袋盛於臘灰汁中煮拾沸取出用紙厚裹壓於重物下出油研成霜卻取黑散叁錢匕無灰酒調成稀膏入甕器中於鐺內重湯煮令稠入巴豆霜和令可圓

右圓如菜豆大每服伍圓熟水下

有村婦用毒藥落胎不能下子爛於腹中臍穿時出小骨病極

朱子東遂用此圖下枯骨一具而愈此圖頗難用須審之

八味黑神散治產後百疾唯瀉而加喘者本方不治凡產後雖無

疾日進式服能調血順氣去諸疾服七日止

當歸

去蘆頭酒浸焙乾

白芍藥

剉

乾薑

炮烈剉

桂

去皮不見火剉

熟乾地黄

剉焙

蒲黃

紙觀銚炒香用

甘草

炙剉

各半兩

黑豆壹兩

炒

右為細末每服式錢溫酒米飲童子小便任意調服之

烏金散治產後胞衣不下或惡露不快敗血衝心血運狂語不省

人事心煩躁渴臍腹疼痛嘔吐發熱增寒腫滿或攻皮膚刺痛凡產

後半月內雖無疾宜日服之有疾加進

黑豆肆兩

淨擇

黃連半兩

去須剉碎

生薑肆兩

切作錢子

當歸

去蘆頭麤切

蓬莪茂

剉各壹兩

椶皮式兩

撕開

右先下生薑黑豆炒直候薑將乾次下黃連當歸同炒更候豆心透紫色即以椶皮點火入藥鑊中與所炒藥同燃至椶皮成燼即傾淨地上盆覆之少頃取為細末每服式錢童子小便調下

劉寄奴飲治產後惡露不快敗血上攻心胸煩躁大渴悶亂眼黑旋運或見鬼神臍腹痛嘔噦惡心不進飲食

劉寄奴式兩

擇去梗草秤

當歸壹兩

去蘆頭切焙

甘草式錢

對

右為麤末每服式錢水壹盞半生薑朮片煎至朮分盞去滓熱服

凡治血暈藥須乘閑煎下以備急用

當歸一味散治產後諸疾調養血氣

王子亨指迷論言產後不必服他藥唯此壹散足矣

當歸叁兩

去蘆須切片焙

右為細末每服式錢童子小便或酒調下日叁服從產下便服之

荊芥一味散治血噤中風等疾取効為快無疾服之能順氣益血

清神

荊芥穗

曬乾不見火

右為細末每服式錢童子小便調下七日後沸湯調以當飲茶其佳

秤槌酒治產後疾最多尤治兒枕不散作痛

鐵秤槌燒通赤

右淬壹升醇酒中候酒再溫可飲飲之調當歸末服尤効

豆淋紫酒治產後中風身痙直或如角弓反張

黑豆揀緊小者淨篩壹升炒令煙出以好酒叁升浸即漉出豆

不用

右每服壹小盞能飲者加之

產婦忽患寒熱如傷寒時氣狀切不可用麻黃藥發其汗以亡津



南京中醫藥大學圖書館藏

液多故也宜服四物湯加桂服之

四物湯方在後

治產後傷寒惡露不行腹脹煩悶欲死方

朴消

生

大黃

生

右等分為細末每服貳錢取桃仁去皮尖及雙仁者碎之濃煎湯調下以通為度樊彥取妻熱病小產後惡露為熱所搏不行苦腹脹煩悶枯竭舌上如生針刺鑿以朴消煎湯令漱口得稍潤用大黃煑醋調服壹大錢得通快而愈與此略同

傷寒產後惡露為熱搏不行煩悶脹喘狂言宜服抵當湯及桃仁承氣湯龐安常用之驗指迷論亦云

龐論云若服之十病十瘥

桂心牡礪湯產後頭疼身體壯熱兼治腹內急痛

桂心壹兩半

略去皮不見火

牡礪

燒通赤

白芍藥

剉碎

熟乾地黄

焙切

各式兩半

黃芩壹兩

剉碎

右件剉如麻豆每服抄肆伍大錢水壹盞半煎至柒分盡去滓溫

服

增損柴胡湯治產後虛羸發熱飲食不進少腹脹等疾

柴胡

去苗水洗過
控乾剉焙

人參

去蘆切
片子焙

半夏

湯泡七遍
切片子

甘草

炙

白芍藥

剉

陳皮

去白

芎

洗剉

右柒味等分為麤末每服肆伍錢水壹盞半生薑伍片棗式箇煎至柒分盡去滓溫服日兩叁服不拘時

人參散治產後虛羸脾胃怯弱四肢無力不思飲食心腹氣脹

人參

去蘆切
片子焙

黃耆

剉碎用蜜湯拌銚
內慢火炒次微焙

草豆蔻

略煨去
皮剉

附子

炮裂去皮
臍切片子

厚朴

剉去麤皮薑製一宿
次日取出曬焙乾

各半兩

白朮

去蘆切
片子焙

當歸

洗去蘆須
切片子焙

木香

剉懷
乾

川芎

洗
剉

