

初熱證治

海小兒癰疹初發未能辨認，而但求所出之由，因內
 因外及不因外內隨其所傷，如法服餌，防其變故，抑
 其盛氣，比之他證尤不可緩。或發或瀉，或解其肌，或
 化其毒，求其所起之由，涼而清肺，調其臟腑，平其飲
 食，謹其禁忌，嚴其養攝，適其寒溫，將理有法，俾盡其
 道，使出無不快之經，成無不癒之潰。既愈之後，不致
 遊毒流汗，虛腠日疾，膜弱不寧，癰瘤喉閉，噎腫潮熱
 汗泄，此治癰之大略也。所出之癰，即痘也。心為癰之癰。又云外
 者，外治內者，內治中，外皆示其癰自出，至於惡寒者

發之表大熱者奪之渴者清之若便秘結者下之小便不通者利之驚者安之泄者分之可以執一爲哉大抵傷寒同治隨經用藥最爲高論假令五日已裏諸病與癰疹不能辨別者不可疑作癰疹必須發之但各從其所傷應見治之皆不妨癰出若強發之其變不可勝數矣如外傷升麻湯主之內傷枳實丸主之大便與者枳木丸主之若傷冷者溫之神應丸惡寒者發之宜防風蒼朮湯表大熱者奪之此表者通言三陽也夫陽盛者氣必上行言奪者治之不令上行也是知無三陽表證有三陽裏證

染於有形也此言表總三陽之名也

渴者清之大

渴者白虎湯

暑月用之

小渴者涼膈散

涼膈散去硝黃加甘桔者穩

大便秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲

子選用察其在氣在血必內實能食而秘者可用但

當微微潤之

小便不通者利之導赤散八正散之

類當求上下二焦何經而用之

驚者安之涼驚丸

重者瀉之瀉青丸

泄者分之寒則異功散四君子

湯熱則澤瀉茯苓湯

呂凡瘡欲出而未出因發搖

者是外感風寒之邪而內發心熱也宜王氏惺惺散

或人參葛根湯木香參蘇飲

凡瘡欲出未出而吐

利者是中焦停寒或夾宿食也宜四君子湯加砂仁
陳皮或和中散如夾宿食者用紫霜丸 張治痘全
在發熱之初看其熱勢微甚微者固不必治甚者當
解則解當汗則汗當下則下使毒氣得以發洩則後
去不能爲害痘亦稀少平順矣此不治則熱毒漸盛
難以解救大抵此際熱甚非汗則表不解非下則裏
不解然藥味之輕重當隨病勢之微甚而用之
痘證少具痘未發與升麻湯參伍錢帶熱服之待其
身表溫和痘證已顯止藥如其身涼痘證未出只時
時與甘桔湯寬胸膈利咽喉 大便酸臭不消化畏

食或吐乃內傷飲食宜枳朮丸傷冷食飲神應丸

如見傷食又見痘證先與不犯大黃巴豆藥尅化過

再與升麻湯如食重傷前藥不能過再與犯大黃巴

豆藥過之

此須分證之表裏虛實而斟酌之先裏後

虛而尅化藥又重傷之若無便秘裏實之證其可遽用大黃巴豆下之乎

凡初發疑似

但肌表熱而無內傷證者宜用辛涼之劑調之以四

物解肌湯主之

或云凡發熱疑似之間宜用人參

敗毒散一劑以發之是與不是一發便明大抵瘡疹

只要發盡不使留伏於中也

凡發表宜保嬰丹加

薑蔥煎湯化下一也或升麻葛根湯去升麻加蘇葉

薑蔥二也或羌活散加製砂薑蔥三也此可行之於
已發熱之時未發熱之前不可行也既見紅點之後
亦不可行恐表虛故也如或行之只宜參蘇飲調保
嬰丹厚蓋取汗 凡初發表要審天時如時大寒則
腠理閉密氣血凝滯防其發泄得遲有毒氣壅遏之
變以辛熱之藥發之宜桂枝葛根湯五積散去乾薑
主之如時大熱則腠理開張氣血淖澤防其發洩太
急有潰爛之變以辛涼之藥解之宜升麻葛根湯雙
解散主之如不寒不熱天氣溫和只人參敗毒散其
作

翁小兒出痘凡裏有大熱當利小便使心火有

所引導雖不用涼藥其熱自去矣導赤散主之若裏
有小熱不宜利小便當解毒若小熱利小便反泄腎
氣宜犀角地黃湯消毒飲 萬或曰痘瘡發熱何以
能預識其輕重而解之耶曰凡發熱乍進乍退氣色
明瑩精神如常大小便調能食不渴目清唇潤此毒
輕也痘必稀疏縱出多亦自易發易靨如壯熱不減
氣色慘暗精神昏悶大便或秘或瀉不能食目赤唇
焦此毒甚也痘必稠密宜預解之其出疎者防其有
伏未可便許爲疎但看熱減渴止精神爽快清便自
調能食更無他苦是真疎且輕也 或曰旣識其候

知痘稠密何以解之曰諸瘡皆屬於心心之華在面如初發熱青筋現露目中淚出此毒發於肝肝木生心火從後來者爲實邪肝爲水泡風火相扇必作癢癢宜先解肝之毒面赤如錦額上紅筋露現譫妄多驚此毒發於心心火自旺爲正邪君主不明必有陷伏不治口乾唇焦面黃而燥此毒發於脾心火生脾土從前來者爲虛邪脾爲癰心爲疹必有夾癰夾疹又脾主肌肉爲火所灼必作潰爛宜先解心脾之毒面色眊白鼻中乾燥或流清涕或衄出此毒發於肺心火刑肺金乘其虛勝爲微邪宜略解肺之毒面色

黑氣如煙浮目中見鬼頭熱足冷此毒發於腎腎水
尅心火爲賊邪必成黑陷不治

瘡疹發熱熱氣微者其毒必少痘出自疎易發易靨
不須服藥熱氣甚者其毒必多痘出自密難發難靨
且多他變宜預解之宜連翹升麻湯或如聖湯竝合
代天宣化丸主之 或有熱微痘出反密者其人必
口燥渴唇焦烈小便赤少大便秘身雖不大熱却蒸
蒸然此毒深熱亦深故表不大熱而裏熱也宜急解
之 若煩渴引飲大熱如炙頭痛如破或自汗或無
汗宜白虎湯主之甚者石膏用至半觔溽暑之時有

此症尤宜用之 或有熱甚痘出反疎者其人必不

渴唇潤目中無赤脉大小便調身雖大熱但熇熇然

此毒淺熱亦淺故表熱裏氣和也只以升麻葛根湯

乍涼乍熱瘡疹常候若遍身如火晝夜不休此心

火亢甚脾土益燥爲失其常宜消詳表裏證候以施

治也如口燥渴目赤唇焦大小便不利此表裏俱熱

也雙解散或連翹升麻湯或黃連解毒湯煩躁送下

七物升麻丸四方俱本條如咽喉痛甘桔湯加牛蒡子或

射干鼠粘子湯俱咽喉加桔梗使咽喉爽快胸膈開豁

失今不治他日咽喉閉塞水入則噎穀入則嘔暴

失音悔之無及

如初發熱時時惡寒身振振搖動如瘧之狀其人衛氣素虛榮血亦弱不能逼毒快出使毒邪留連於經絡之中欲出不出與正相爭故振振者火之象也以柴葛桂枝湯加黃耆主之瘡出卽愈不可錯認作寒戰妄投陳氏辛熱之劑以誤人也

治時

古人養生或治病者常順四時之氣謂之勿伐天和如春夏養陽秋冬養陰飲食起居各有攸宜凡瘡疹發熱之時其初發表解肌四時各有主方春用羌活湯痘發夏用五苓散驚秋用參蘇飲冬用五積散四

時通用人參敗毒散又如春肝旺風木主事調養之

法宜四物湯失血加防風黃芩木香青皮羌活以折

風木之勝又以四君子湯不能食加白芍藥桂心以補

脾之受制相間服之夏心旺熱火主事宜黃連解毒

湯煩躁加麥門冬五味子以補肺之不足秋肺旺燥

金主事宜瀉白散肺合甘桔湯咽喉加牛蒡子馬兜

苓以散肺中之邪又以四物湯去川芎加天麥門冬

天花粉以潤其燥冬腎旺寒水主事宜五積散以散

表之寒理中湯泄利加黃耆炙木香丁香以勝裏之

寒此四時之治法也如天有暴風連日不止恐有風

邪桂枝葛根湯夏月盛暑或_{非時之熱}人參白虎湯

渴冬月嚴寒或{非時之寒}四君子湯加桂枝生薑久

雨濕盛五苓散加蒼朮此四候者必瘡變色有異證

可依其法治之苟無他候不可妄治也惟謹惟慎遠

風寒毋令大熱毋令大寒但常和煖更常服蟬退膏

蓋此膏能禦風邪辟惡氣透肌快癰疹也房室之中

常燒辟穢香禁忌勿得間斷

凡初發熱二三日間有驚搐者以導赤散心羌活湯

_{痘發熱}辰砂散本條主之大便秘者三黃丸發熱微利

之小便澀少者導赤散渴甚者葛根解毒湯痘渴腹

中痛者桂枝大黃湯痘腹痛腰痛者人參敗毒散本條

自利者黃芩湯痘泄利吐利者黃芩加半夏湯痘吐利如

脾胃素弱自利清白者理中湯痘泄利或四君子湯

不能食肉豆蔻丸痘泄利合而服之餘詳各門

發表升麻湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛足冷脉

數發熱肢體煩疼及瘡疹疑貳之間並宜服之或

未經解利而瘡毒已發又云證候未全或未明者

但可與解散之也又云患瘡疹大便自如常者亦

可服升麻湯盖用升麻其性苦寒無毒主解百毒

殺鬼邪辟瘟瘴蟲毒中惡腹痛咽喉口瘡皆毒也

瘡痘亦毒故也其次用葛根性平治消渴大熱解
肌發表出汗開腠理治頭痛升麻葛根二藥皆治
伏熱毒動心恍惚驚悸煩躁大抵瘡疹是蘊熱毒
葛根解熱升麻去毒也病熱而藥性微寒冷熱相
攻則芍藥治時行寒熱又活血痺使瘡痘易出也
又利小便瘡疹有大熱者則利小便也次有甘草
調和之況新書言瘡疹渴燥甚者亦用炙草散主
之四者解毒治熱調榮衛爲治瘡疹之要藥也爲
其疑貳之間非瘡疹伏熱而發熱者有傷寒傷風
傷食驚悸兼患瘡疹而稟氣怯者皆發虛熱而非

實熱若服之是瘡疹者則毒減而愈他證者反以爲害不能盡述其由但有壯熱而面青目白睛不黃赤大便不秘小便清者皆不可服裏無蘊熱故也此藥治未發瘡疹之前瘡疹已愈之後服之消毒故也非正出時服

升麻

葛根

芍藥

甘草

等分

右爲麤末每服二錢水一盞同煎至半盞去滓溫服不拘時候亦可爲細末湯調服身心煩熱卽溫服寒多卽熱服

海藏云升麻葛根湯太陽陽明之藥

陳文中云

身熱腹痛者身熱泄瀉者身熱驚悸者身熱汗出者身熱足冷者俱不宜服升麻葛根湯

張巽之

云凡痘見癰點忌葛根湯恐發得表虛也

萬氏

曰古人謂但見紅點便不可服升麻葛根湯恐發得表虛也此蓋爲痘疎毒少者言後人不達立言之旨遽謂凡出痘子纔見紅點真不可服殊不知升麻葛根湯四味乃發表解毒疎通血氣升降陰陽之劑痘出太密正宜常服以解之令陷者升之燥者潤之鬱者疎之過者平之陰精不衰而陽毒