

素問病機
三

素問病機氣宜保命集卷下

河間處士

劉完素守真述

明新安

吳勉學師古

校

欬嗽論第二十一

此釋咳嗽二字之義其實治病則不拘乎此也

經言秋傷於濕指秋肅暑白露三節而言也蓋此三節正屬陰濕土主四氣再交秋分節燥令當至不至濕乃橫行而不退位木不得金令則燥金無權木宜于畏動而制土土受木剋而濕

論曰欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽是無聲而有痰脾濕動而為痰也欬嗽謂有痰而有聲蓋因傷於肺氣動於脾濕欬而為嗽也脾濕者秋傷於濕積于脾也故內經曰秋傷於濕冬必欬嗽太抵素秋之氣宜清湏反動之氣必上衝而為欬甚則動于脾

乃積于脾矣夫燥金豈終不至哉五行之理始于不及者則終于太過勝之于前者必有以復于後迨秋深交冬而退之傷積於脾者不利於收藏之令發動而為咳嗽焉蓋脾氣不伸者肺氣必不利此秋傷于濕冬生咳嗽之旨也且其間木因金令不至而剋脾者至是而金復母權言變為寒濕而後便不利氣心痛或前便後不利或小腹滿脹諸作矣若喻氏秋傷于燥之論乃至而太過之義也

論心脾肺腎而不

言肝何也意所謂風痰即肝經之痰乎風氣通於肝也此河間以脾經而不更提及

濕發而為痰焉是知脾無留濕雖傷肺氣而不為痰

也有痰寒少而熱多故欬嗽者非專主于肺而為病

以肺主皮毛而司于外故風寒先能傷之也內經曰

五臟六府皆能令人欬非獨肺也各以其時主之而

受病焉非其時各傳而與之也所病不等寒暑燥濕

風火六氣皆令人欬唯濕病痰飲入胃留之而不行

止入于肺則為欬嗽假令濕在于心經胃之熱痰濕

在脾經胃之風痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂

之寒痰所治不同宜隨證而治之若欬而無痰者以

辛甘潤其肺故欬嗽者治痰為先治痰者下氣為上

此句餘有未盡然要

白米丸豈非治脾氣本臟濕滯乎故學不可後死也

肝非其相疎夾雜則其秘密隱也
現其後之方白
木丸顯些治脾家
本職之濕痰天麻
丸顯些肝家之風
痰則胃不在以在
脾為濕痰主肝為
風痰分別明言也
寒嘔小青龙為神
方若不發寒熱無表
症者方中麻辛可去

是以南星半夏勝其痰而欬嗽自愈枳殼陳皮利其
氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微下之少利為
度痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂
之熱痰嗽小柴胡四兩加石膏一兩知母半兩用之
冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龙加杏仁服之然
此為大例更當隨證隨時加減之量其虛實此治法
之大體也

蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯

燒生薑糊桃

此者皆治無痰而嗽者當以辛甘潤其肺故也如但
使青陳皮藥皆當去白本草云陳皮味辛理上氣

凡治痰喘
氣多急
不細故欲
用小青龍
治哮喘氣
急者必愛
細審其久
久而肺
也

脉弦面青多怒
皆肝病也 是殆風
濕入于肝經而為
痰也 論中云濕者脾經
濕之風痰也 非至論
此方與下四頁天麻
丸同惟多寒水石
一味列位中所遺
治熱也

去痰氣滯塞青皮味苦理下氣二味俱用散三焦
之氣也故聖濟云陳皮去痰穢不除即生痰麻黃

發汗節不去而止汗

治風痰熱咳嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺秘澀心

多燥怒水煮金丸

88

南星

半夏

天麻

雄黃

白麵

寒水石

右為細末滴水為丸每服五七十丸至百丸煎漿

水沸下藥煮令沸浮為度漉出淡漿水浸另用生薑

湯下或通聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆

可用也

小黃丸治熱痰欬嗽脉洪面赤煩熱心痛唇口乾燥
多喜笑宜小黃丸

⊗

南星

洗湯

半夏

洗各一兩

黃芩

一兩半

右爲細末生薑汁浸蒸餅爲桐子大每服五十丸
至七十丸食後薑湯下及小柴胡湯中加半夏亦

可

白朮丸治痰濕欬嗽脉緩面黃支體沉重嗜臥不收
腹脹而食不消化宜白朮丸

⊗

南星

半夏

俱湯洗各一兩

白朮

一兩半

小黃丸

白朮丸

玉粉丸

將水黃金花丸小
黃丸白木丸玉粉
丸四方合參其
用藥出入最是
開發智慧三要
也

右為細末糊為丸桐子大每服五七十丸生薑湯

下及局方中防已丸亦可用

下第五頁亦有玉粉丸無南星有草烏

玉粉丸治氣痰欬嗽脉澁面白上喘氣促洒淅惡寒

愁不樂宜服之

8

南星

半夏

俱洗各一兩

官桂

去皮一兩

右為細末薄糊為丸如桐子大每服五七十丸生

薑湯下食後及局方中防已丸亦可玉粉丸加減

在後心下否者加枳實伍錢身熱甚者加薑蓮五錢

體重者加茯苓一兩氣上逆者加苦亭薤五錢有甜若兩種氣

促者加人參桔梗各五錢浮腫者加郁李仁杏仁

各伍錢大便秘者加大黃五錢

震玉散治痰熱而喘痰湧如泉

寒水石

石膏 各等分

右為細末煎人參湯調下三錢食後服

治痰干縉湯

金匱以味皂夾丸治逆上氣時時滿坐不得眠是肺氣逆也此干縉湯
亦是治肺氣不通如水上之塵其上竅吸而不下也皂角辛散而開結通肺氣于大腸且性
去垢膩則其能除痰可知生半身斜治凡死肉絕而藥並用峻厲已極者酌保肺之液于皮也

半夏 生末 一兩

大皂角 去皮子 半兩剉

右同於絹袋中盛之用水三升生薑七大片同煎

至一半以手操洗之取清汁分作三服食後併服

二服効

防風丸治痰嗽胃中氣不清利者 枳朮丸亦妙

雙玉散 治痰干縉湯 防風丸 天麻丸 利濕丸

讀上第二頁水
廣金花丸則彼
此兩方用藥治病
之義可並知矣

防風

半兩
易治勞
風証

枳殼

半兩
去
穢炒

白朮

一兩

右細末燒餅爲丸每服五七十丸生薑湯下

天麻丸

治頭暈頭風痰積于肝胃兩經之方也

天麻

一兩

半夏

南星

各一兩

雄黃

少許

右以白麵二兩滴水爲丸如桐子大每服五十丸
至百丸煎淡水令沸下藥煮十餘沸漉出食前生

薑湯下

利鬲丸

主膏中不利痰嗽喘促利脾胃壅滯調秘瀉

藏推陳致新消進飲食治利鬲氣之勝藥也

木香

一錢

檳榔

一錢

人參

三錢

當歸

二錢

藿香 一錢

大黃 一兩

厚朴 三兩

枳實 一兩

甘草 三錢

觀方用藥分兩大黃枳朴獨重症固為實然已稍涉重故以參歸安其氣其非新病近病可知故以九劑緩攻潔古東垣治腸胃宿結而用九正此意也

石為細末滴水和丸如桐子大每服三五丸食

後諸飲皆下

欬氣丸 治久嗽痰喘肺氣浮腫

此方全在人參一味不然便不成方矣其綿茂二味亦深妙久嗽血氣亦虛

青皮

去二味並用散三焦之氣也見上第

陳皮

去

檳榔

赤名木香散

木香

杏仁

去皮

郁李仁

去皮

茯苓

二味並用清肺

澤瀉

當歸

茂

茂音述苦氣溫消痰通經氣心痛

馬兜零

苦亭藤

已上各

人參

久嗽則肺虛矣金賴此味保肺氣獨御

防已

各五錢

牽牛

取頭末一兩

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧子大每服一二

去正傷之弊斯為制

三兩

三兩

欬氣丸

玉粉丸

和亮湯

二五

肺病也古方人參清肺湯人參定喘湯人參瀉肺湯皆此意也
亦名半夏散見本卷瘡瘍內世貞治少陰口瘡者絕不出是風寒過絕陽氣不使也
○本卷第三系又有玉粉丸每草烏有南星

十丸加至五七十丸生薑湯下食後服

玉粉丸

少陰直脈受寒逆治痰結咽喉不利

語音不出

寒客會厭而不能發聲少陰直脈終于會厭也

半夏

洗五錢

草烏

炒

桂

一字

一字當占金匱婦人內治灸燔之厚朴半夏湯全氣

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一

丸至夜含化多歲不愈者亦効

枳殼湯治久痰胃膈不利者多上焦發熱

88

枳殼

麩炒去穰三兩

桔梗

三兩

黃芩

一兩半

右同剉每日早用二兩半水三盞煎至一盞勻作

三服午時一服申時一服臨臥時一服二日七兩

半藥盡服生半夏湯

生半夏湯

半夏

不以多少先七遍切作片子

右每服秤三錢水一盞半入生薑五大片同煎至

一盞和滓食後服一日三三服服三日畢再服枳

朮丸盡其痰為度論曰先消胸中氣後去膈上痰

再服枳朮丸謂首尾合盡消其氣謂令痰不復作

也

清鎮丸治熱嗽

此方見病機卷中四頁治上焦吐頭痛有汗脈弦

小柴胡湯內加人參一倍

青黛

半兩

右為細末麵糊丸如桐子大每服五十丸生薑湯

下

半夏丸治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒

已吐加檳榔三錢

半夏痰吐
洗切

雄黃研三錢

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服三十

丸生薑湯下小兒丸如黍米大

白木散治夏暑大熱或醉飲冷痰濕不止膈不利

8

白木

茯苓

半夏

黃芩上黃芩治熱等分

右為麁末每服五錢至七錢水二盞入生薑十片

煎至一盞去滓調陳皮末一錢神麴末一錢食後服

此方考占上三頁小
黃丸白木丸方合
泰而白木丸又當
此要之白木散白木
湯地方合泰庶幾
治病用藥之理從
此有悟而學進

此陰血虛而相火熾
刮燥津液變而為
痰者也不可瀉火但
宜養陰以配火蓋此
火實非有餘之邪熱

法曰大熱大飲蓋酒味熱而引飲冷冷與熱凝於胸
中不散而成濕故痰作矣甚者宜吐之吐後服五苓
甘露勝濕去痰之劑

白朮湯治痰潮上如湧泉久不可治者

白朮

白茯苓

半夏

等分

右為末每服半兩病大者一兩水二盞生薑七片
煎至一盞取清調神麴末二錢頓服之病甚者下
玉壺丸一百丸大効永除根

天門冬丸治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲

面目浮腫

此血氣浮
白朮湯 天門冬丸

丹溪論痰嗽有云
陰虛火炎灼肺為
咳宜補水以制相火
其痰自除河間列
此方于末正教後
人育陰除痰之法
也

8

天門冬十四去心 麥門冬去心 生地黃三斤取汁

右二味為末膏子和丸如梧子大每服五十丸煎
逍遙散送逍遙散中去甘草加人參或服王氏博
濟方中人參荊芥散亦可如面腫不已經日面腫
曰風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡飲子
去大黃故論曰治藏者治其俞治府者治其合浮
腫者治其經治俞者治其土也治合者亦治其土
也如兵家圍魏救趙之法也

虛損論第二十二 此篇當與室以倫卷十二同系

論曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛

感熱則損陰此下損也當以純陰靜藥填腎滋肝為主下文金剛牛膝煨腎三方却不可用蓋下焦陰虛陽盛則薑巴故蘇桂桂防風草薤皆是溫燥驅寒去風滲濕之藥下焦不將愈虛而愈熱乎若學者者功夫到家自然能辨之矣此非河間之誤其立方未嘗與虛所引之難經相違且填補之法易祛邪之法難知其難則易可不必言矣

則陰盛損自上而下治之宜以辛甘淡過于胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以苦酸鹹過于脾則不可治也自上而損者一損于肺皮聚而毛落二損損于心血脉虛少不能榮于藏府婦人月水不通三損損于胃飲食不為肌膚自下而損者一損于腎骨痿不能起于床二損損于肝筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消尅論曰心肺損而色蔽腎肝損而形痿穀不能化而脾損感此病者皆損之病也漸漬之深皆虛勞之疾也四君子湯治肺損而皮聚毛落益氣可也

素問 虛損論 四君子湯 八物湯 十全散

以甘草易芫黃者
治上損于肺之法
見矣老當不刊
凡用芫黃方道
能于此等推求則
漸臻謹嚴精當
之地位矣

8

白朮

人參

黃耆

茯苓

各等分

右爲麤末每服五六錢七錢水一盞煎至七分去滓食遠溫服

八物湯治心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水愆期宜益氣和血

白朮

人參

黃耆

茯苓

川芎

熟地黃

當歸

芍藥

各等分

右麤末服五七錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

全散治心肺損及胃飲食不爲肌膚宜益氣和血