

醫林繩墨大全卷之二

明

錢塘方

穀著

江寧周京輯

松江陳

熙

重刊

氣

內經曰人以氣爲本一息不運則機緘窮一毫不續則窮壤判陰陽之所以升降者氣也血脉之所以流行者氣也腑臟之所以相生相養者亦氣也盛則盈衰則虛順則平逆則病此氣之所以爲然也是則氣也者人身之根本也然而氣也者又人身疾病之所由也子和云諸痛皆生於氣諸病皆因於氣誠哉斯言也丹溪曰是



南京中医药大学图书馆版权所有

醫林繩墨大全卷之二

明

錢塘方

穀著

江寧周京輯

松江陳

熙重

氣

內經曰人以氣爲本一息不運則機緘窮一毫不續則窮壤判陰陽之所以升降者氣也血脉之所以流行者氣也腑臟之所以相生相養者亦氣也盛則盈衰則虛順則平逆則病此氣之所以爲然也是則氣也者人身之根本也然而氣也者又人身疾病之所由也子和云諸痛皆生於氣諸病皆因於氣誠哉斯言也丹溪曰是



氣滯則痰
生氣鬱則
火結所以
有此等之
病態

氣也導引血脉升降三焦周流四體而爲生生之元若
血液稽留則爲積爲聚爲腫爲毒爲瘡瘍膿潰若
腑臟溢於經絡膠於咽膈則爲嘔爲噎爲關爲格爲脹
滿爲淋瀝癰閉疼痛但局方治氣率用香熱辛燥之藥
不分乎寒熱表裏虛實真大失乎軒岐先師之旨矣吾
今專爲發之本經曰寒則當溫○熱則當清○虛則當補○實
則當瀉○在表者當發散○在裏者當分利○此治病之法而
要皆卽治氣之法也○卽謂氣病當動作之初非辛溫之
劑不可散然要知又非苦寒之劑不可平○必辛溫之中

濟以苦寒之味而後用當而治效如喜動心火也。氣也。
黃連犀角主焉。怒動肝火也。氣也。黃連青皮主焉。悲動
肺火也。氣也。黃芩山梔主焉。恐動腎火也。氣也。黃柏知
母主焉。思動脾火也。氣也。黃連山藥主焉。驚動膽火也。
氣也。黃連膽星主焉。食動胃火也。氣也。黃連山查主焉。
又如秘結而動大腸之火也。亦氣也。黃連枳實主焉。溺
澁而動小腸之火也。亦氣也。山梔木通主焉。凡此者皆
治氣病之因於火者則然。若氣病之不因於火者又豈
可少補瀉溫清表利之調濟也哉。是以欲破滯氣須用

枳殼焉。欲開鬱氣。須用陳皮焉。欲行痞滿氣。須用枳實焉。欲解腹脹氣。須用青皮焉。又考三稜蓬朮能破結氣者焉。香附烏藥能行血氣者焉。木香砂仁能和中氣者焉。蒼朮厚樸能理脾氣者焉。肉桂茴香能溫腎氣者焉。杏仁桑皮能瀉肺氣者焉。生地門冬能養心氣者焉。白朮茯苓能健胃氣者焉。紫蘇麻黃能散表氣者焉。乾薑吳萸能溫中氣者焉。人參黃芪能補虛氣者焉。芒硝大黃能通結氣者焉。此皆治氣之神藥也。而一以二陳爲主。各審其宜。加減用之。則治之自無不應手而驗者也。

又俗云氣無補法以其痞滿壅塞似難於補不思正氣
虛而不能運行邪氣着而不能外出於斯時也其何以
乎經云氣虛不補何由而行是氣虛之人必用參芪以
補之者也若用參芪而不去病氣反急滿不順此乃邪
經正位必死之兆也脉經曰下手脉沉便知是氣沉極
則伏瀦弱難治其或沉滑氣兼痰飲沉緊痛盛痛極又
伏濡細則濕濕伏又見瀦者味之

愚按內經曰根於內者命曰神機根於外者命曰氣力
蓋機無神不動力無氣不生氣也者天地萬物之所由



其者也如善養者自臟腑和榮衛行一身可無疾病之憂非惟無病且可延生若戕賊者臟腑不和榮衛不

治法主意氣莫貴於善養鬱莫貴於善開

氣主方

二陳湯 見中風

加減藥詳本証

按肺主氣凡氣事皆肺病也治分寒熱

氣虛 四君子湯

熱者人參 加沙參 黃芩 芍藥
寒者加黃耆 玉桂 芍藥 甘草 加減

氣實 導白散

熱者黃芩 芍藥 甘草 加減
寒者加生薑 芍藥 甘草 加減



血

經曰嘔吐咯衄。氣脉虛洪。火載血上。錯經妄行。溺血便血。病同所因。又曰心主血。肝藏血。脾裹血。脾無所裹。則肝無所藏。心無所主也。又曰目得血而能視。足得血而能步。掌得血而能握。指得血而能攝。此脾有所裹。肝有所藏。心有所主也。又曰心主血。肝納血。肺主氣。腎絢氣。夫人身之血氣精神之所依附者。並行不悖。循環無端。庶成生生不息之運用也。苟或暴喜傷心。則氣緩而心不主血。故肝無所受。暴怒傷肝。則氣逆而肝不納血。故



北京中医药大学图书馆版权所有

血無所依又有房勞太過鬱怒相加以致陰火沸騰而
血從火起錯經妄行是以從肺而溢於鼻者爲衄血從
胃而逆於口者爲嘔血從腎而出於唾者爲咯血從
而來於肺者爲欬血又謂痰涎血出於脾暴怒血出於
肝嘔吐血出於胃房勞血出於腎憂思血出於心勞力
血出於三焦悲喜血出於心包絡淋止血出於小腸溺
帶血出於膀胱腸風痔漏血出於大腸若謂留結於腸
胃之間而成積者爲血痢留積於胞絡之中而成塊者
爲血瘕留積於經絡之中而不行者爲瘀血留滯於肌

川芎上升
改去之

肉之間而作痛者爲腫毒此皆血之爲病也丹溪曰
從下流者爲順則易治血從上溢者爲逆則難治
云口鼻出血是皆陽盛陰虛蓋因有升而無降也東垣
曰血從氣上越出上竅法當補陰以抑陽使其氣降則
血歸於經大抵用治之法俱宜四物爲主當去川芎熟
地用生地玄參天花粉童便爲要然後佐以各經瀉火
之藥如因於心火者加黃連因於肺火者加山梔因於
腎火者加知母因於脾火者加黃連甘草因於肝火者
加黃連羚羊角因於小腸火者加木通山梔因於大腸

久則宜溫

火者加條芩枳殼此治諸血奔逆之大法也大率血之
妄行不可正治一於寒涼之藥血雖稍止有傷胃氣
惟治血不下抑且鬱遏火邪而不出致使譫妄發狂
爲送死之道故丹溪曰吐血久而不愈者乃服涼藥過
多也當用溫補健理脾胃使脾和而能裹血則症自可
也用四物湯去川芎加人參白朮炒黑乾薑之劑戴氏
亦云凡血久不愈者因病久而體弱宜用溫劑是知溫
劑乃養血之根本也

愚按血者依附氣之所行也氣行則血行氣止則血止

虛者亦
補氣

周於身而循環無端者氣也呼吸間往來相統相承者
血也氣與血附之而不移陰與陽合之而既濟否
離其血則氣出而不返有爲大脫之症血離其氣則
瘀積而不流有爲癰疽潰爛之症此吾人橐籥之間貴
得陰陽之升降以成氣血之流行也設若陰不升而陽
不降因以致血或溢於上或散於下遇此病者總當先
於氣而平之蓋血爲氣之子氣不妄動則血自歸於經
也次於血而和之蓋氣爲血之母血不妄行自附氣而
周流無滯也治血之法不外於此

治法主意血由氣所依氣由血所附治血之症必先治氣

氣

血主方

○四物湯見中風

加減藥詳本症

附效方

蘇子降氣湯 虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛并吐

血 蘇子炒研半夏湯泡各前胡去芦甘草炙厚

樸 薑製陳皮去白各當歸錢半一沉香七分水

二鍾生薑三片煎一鍾服虛寒者加桂五分黃芪

一錢

養正丹 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身

羸及婦人血海久冷 水銀 黑錫水去淨研與

硫黃 硃砂一兩各 右用黑蓋一隻火上鎔黑

鉛成汁次下水銀以柳條攪欠硃砂攪令不見星

子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有酸

以醋酒之候令取出研細煮糯米糊丸菜豆大每



服三十九鹽湯棗湯任下

人參飲子

治脾胃虛弱氣促氣虛精神短少

吐血

人參

錢五

五味子

錢一

黃芪

去芦

麥冬

去心

白芍藥

當歸身

錢半

甘草

錢一

右

在

服水

二鍾

煎八分

食遠服

不得者

人參

錢

在

團參丸

治吐血

咳嗽服

涼藥

不得者

人參

錢

在

芪

飛羅麩

各一百合

五錢

右為

細末

滴水

和

丸如

桐子大

每服三五

十九丸

用

茅根湯

下食

遠服

百花膏

治咳嗽

血

欬冬花

百合

等分

各

右

為末

蜜丸如

龍眼大

每服一

九

臨臥

嚼薑湯

下

五味子

黃芪散

治因嗽

咯血

成勞

眼

睛疼

四肢困

倦脚

膝無力

黃芪

麥門冬

熟地黃

各二

人參

三錢

各半

甘草

白芍藥

五

味子

錢

各二

人參

右為

粗末

每服四

錢水

一鍾

半煎

七分

日三服

劫勞散

治肺痿

痰嗽

痰中有

紅線

盜汗

發熱

熱過

即冷

飲食

戒少

白芍藥

六兩

黃芪

甘草

人

參

當歸

半夏

白茯苓

熟地黃

五

味子

人

阿膠

炒各

每服三

錢水

一鍾

半生薑

二片

棗三



枚煎九分無時溫服日三

喻化丸

治咳嗽血

香附

童便北杏仁

皮炙

山梔仁

炒青黛

海粉

瓜蒌仁

訶子肉

兜鈴

右為細末

入白礬砂少許煉蜜少加

為丸每

喻化

一丸白湯下

白芨枇杷丸

治咯血

白芨

一兩

枇杷葉

蜜去

節

錢各五

右為細末另以阿膠五錢到如豆大

粉炒成珠生

地黃自然汁調之

火上頓化

又前件

為丸如龍眼

大每服一丸

喻化

白芨蓮鬚散

白芨一兩

蓮花鬚

銓色側栢葉

沙

參錢各五

右為細末入藕節汁地黃汁磨京墨

黑調藥二錢

如稀糊服



燥

內經曰枯涸乾勁皺揭皆屬於燥乃陽明大腸太陰肺之症也夫金爲水源而受燥熱竭絕於上則津液不能

榮養百脉或患大病後多服尅伐之藥或汗下重亡津

液或因養生誤服金石之劑或恣用酒麪熾燂偏助火

邪致使真陰有損血液耗散在外則皮膚皴揭在內則

腸胃乾涸在上則口燥咽乾煩渴不已在下則閉結不

便腹中作脹故脉見洪數結代治法宜壯水之至以制

陽光則金無所尅而得其肅清之令養脾之精以滋肺

治法彙註
燥脉澁而
緊或浮而
弦或細而



瀉或耗而
虛大都因
血虛有少
變為燥病
易曰燥萬
物莫熯乎
火是也

液則金有所資而起其生化之源。惟以養血滋陰清熱
潤燥施治。斯獲全功矣。況七情所起火自内生。不急探
本內而消渴外而疽癰。從此決矣。故古人定有生津
露飲。生血潤燥飲。通幽湯。潤腸丸。當歸潤燥丸。皆治燥
之良方也。若其氣之實者。即與以承氣通泄。亦可而年
高之人。惟宜與以當歸地黃桃仁黃芩之劑也。
愚按燥之一症。有口舌乾燥而亡津液者。此內熱之甚。
水不能勝火也。宜當清熱降火。如知母。門冬之屬。有皮
膚痛癢而乾燥者。此因血虛生風。血不能勝氣也。宜當