

諸症辨疑

二



〔京〕新登字 027 號

責任編輯 徐岩春

封面題簽 王榮安

攝 影 孫一星

主 編 謝 奕 王 德 衣 謝 景 華
副 主 編 陸 國 強 宋 占 傑 金 立 強 振 華

百 餘 問 題 選 錄
諸 症 辨 疑
醫 學 金 鑑
藥 材 圖 志
本 草 綱 目
醫 學 金 鑑
醫 學 金 鑑
醫 學 金 鑑

五 卷
四 卷
八 卷
十 八 卷
六 卷
六 卷

中國中醫研究院圖書館藏善本
諸症辨疑 明 吳 球 撰
中醫古籍出版社出版
新華書店北京發行所發行
北京大兴韓營古籍印刷廠印刷
一九九四年三月第一版
一九九四年三月第一次印刷
ISBN 7-80013-490-3/R·487
定價 11.00 元



中國中醫研究院圖書館藏善本已出版書目

衛生家寶湯方	六卷	南宋	朱端章撰
簡易普及良方	六卷	明	彭用光撰
本草單方	十九卷	明	繆希雍撰
藥性通考	八卷	清	劉漢基撰
醫學金針	四卷	清	潘 爵撰
諸症辨疑	四卷	明	吳 球撰
百病問對辨疑	五卷	明	張 昶撰

主 編 胡國臣
 編 委 王樹芬 朱占瑞 金 立 嚴康維
 審 訂 傅景華



新刊校訛大字諸症辨疑三卷

○失血

血為榮氣為衛上下循環走不息也世人失於調理者或勞傷或
六慾飲酒墜墮積熱三焦榮血妄行所以血出諸竅經分漣吐咯
衄溺血謂之五臟六腑心肺脾胃大腸風者是也經云火載血
得熱妄行得冷凝滯得黑則止今人每用止血涼劑者多矣予思
失血外邪積熱妄行者多用涼劑其間隨情妄用喜怒憂鬱勞佚
內傷誤投前劑豈不鬱而愈鬱以致積血於胸滿而隔痛之患哉
是知人身之血賴氣升降氣升則升氣降則降氣逆則逆氣和則
和氣濁則亂如此失血豈不皆由氣濁遇熱妄行之所致歟故治
水者必以提防治血者莫先清氣上清則血和氣濁則血亂斯言

信矣大凡失血當先辨其血出何經當用此經清氣之藥飲後凉血審其虛實調治庶無悞矣

犀角地黄湯

犀角 赤芍藥 牡丹皮 生地黃 澤瀉各一錢

每服四五錢煎服隨後加減法

心經咯血氣熱入麥門冬○血熱加黃連○肺經氣熱加石膏

○涼血加枯黃芩○腎經線血清氣加知母○涼血加黃柏

脾經延血清氣加白芍藥○涼血加生地黃

胃經吐血清氣加粉葛○涼血加大黃

大腸下血清氣加連翹○涼血堅實加黃芩

小腸氣熱溺血加赤茯苓○涼血加木通山枝子

三焦經壅血清氣加連翹○涼血加地骨皮



膀胱經淋血清氣加滑石琥珀

○涼血加黃芩

心胞絡清氣加麥門冬

○涼血加牡丹皮

瘀血死血以藕汁茅根桃仁韭汁紅花之類散血行血以川芎升
麻大黃之類涼血清血犀角薄荷生地黃玄參黃連黃芩麥門冬
止血蒲黃大薊京墨花蕊石樗根諸墨灰

茯苓補心湯

治去血過多面少顏色咳嗽紅痰往來寒熱

方出虛損門

一少年患吐血來如湧泉諸藥弗効虛羸瘦削病甚懸革一日請
予脉之沉弦細濡其脉為順血積而又來寒而又積予疑血不歸
源故也嘗聞血導血歸未嘗用此遂生意用病者吐出之血以瓦
器盛之待凝用銅鍋內炒血黑色以紙盛放在泥地上許久出火
再烘後用毫鉢細研為末每服五分以麥門冬去心煎湯調下進

二三服其血遂止而血導血歸之說果然矣後頗服扶苓補心湯數十貼以杜將來保養半年其人形氣如舊吁如此之証去血之多病者羸魚諸藥弗効衆人皆稱其死服此仍復形氣如初故如人身之血不可量也先賢有言天下有是病必有是藥今後諸症病脉相應醫者用藥不可不通變矣

嘗治諸虛吐衄咯血藥中每入童便半合其効甚速或單用以童湯頓服無不應効蓋洩溺降火滋陰又能消瘀血止吐衄諸血先賢有言凡諸失血服寒速十無一生服洩者百無一死言信矣童便一名洩溺一名輪迴一名還元湯但取年十二歲以下無慾者童子絕其烹炮鹹味冷其繁淨多與米飲湯水以助水道既絕厚味况喫湯水之多溺下無力亦當與其淡內凡溺下却以磁器盛之少頃每一鐘少入生姜自然汁二三

攪勻徐七服之日進二三次如天寒却以重湯溫服此但以飲食相遠為妙

生熟地黃湯

治吐衄過多心中煩虛燥執等証

生地黃

熟地黃

麥門冬

去心

天門冬

去皮心

黃芪

地骨皮

白芍藥

黃芩

甘草

各半分

右剉為藥末每服一兩水二盞煎七分食遠溫服如脉微身涼惡風加桂三四分吐血者多有此証

方治鼻衄神効

以車前草即蝦蟆衣採取一握洗淨放石相內搗細用絹布包之絞出自然汁但半茶碗為率却入好白蜜二茶匙用熱水重湯溫熱冷病人徐七呷下日服二次病者亦要養性

龍腦雞蘇丸

消煩渴涼上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽重血

鼻血吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸口苦並宜治之

柴胡二兩 麥門冬二兩去心 黃耆一兩炙

真阿膠二兩蛤粉炒 生地黄末六兩 蒲黃微炒

雞蘇葉四兩即龍腦薄荷 甘草炙一兩五錢 人參二兩

木通三兩同柴胡割斷半升煎湯浸一二宿汁後入膏

右除別研藥後入外並搗羅為之末將白蜜二斤煉一二沸然後下生地黄末不住手撓下木通柴胡汁慢熬之入諸藥和為丸如棗豆大每服三四十丸麥門冬煎湯送下

水灰散 治鼻衄出血不止

山梔子 白芷 不以多少燒存性為末吹入鼻中其血即止

凉荣湯

治吐衄諸血

知母炒

川柏

白芍藥

麥門冬去心

蒲黃

甘草

生地黃

川歸尾

偏栢葉炒各等分

右各製炒每服八錢白水煎服

枳連丸

治腸胃閉悶下血積熱藏毒

川黃連

四兩炒

枳殼陳者四兩炒

右為極細末水糊為丸如梧桐子大每服六七十丸清茶下

三消

二消者心肺脾胃火動而消也心肺消渴脾胃消中善飢腎水消濁經云水涸火炎大熱所致由是而為之消渴消中消腎治法宜抑火養陰今世俗皆為寒涼瀉火之藥服之愈劇故消渴之証實熱者少虛熱者多不足之症而作有餘者悞矣蓋人之水火得其

平血氣得其養何消之有其間攝養失宜則使水火偏勝血少氣虛津液枯竭三焦猛烈以致龍雷之火必起三消之患作焉如此數端安可槩用瀉火一法而治三消之病耶愚按上消於心移熱於肺引飲大渴中消於脾移熱於胃多食尿黃下消於腎移熱於膀胱小便渾濁色如膏脂傳染既久腸胃合消五臟乾燥以致瘦削四肢精神怠倦治療之法故上消火盛製金煩渴引飲宜用蓮花飲主之次以生草四物湯中消脾胃渴飲食多以白虎湯主之次以生血養脾下消於腎小便渾濁宜蓮子知母川柏芡實麥門冬四物主之消在五臟飢色消瘦以生津散主之若以脾腎經氣虛心經血少若用寒涼之劑過多下陷清氣渴熱轉生遂生脹病亦危矣凡三消務在養脾生火降火滋陰血生火降陰陽則病可除矣

蓮鬚飲

甘草 炙五分

知母 蜜水煎一斗

蓮花鬚 五分

川蓮

瓜蒌根 七分

五味子 十粒

人參 五分

葛根 七分

茯苓 一斗

生地黄 酒洗一斗

竹葉 十片

水二鐘姜一片煎服

四物湯

川芎 八分

當歸身 一斗

生地黄 薄酒洗一斗

知母 一

白芍藥 小紙包煨一錢

麥門冬 一斗去心

川蓮 八分

烏梅肉 五分

天花粉 七分

薄荷

石連肉

川柏 蜜水

甘草 炙各五分

水二鐘煎服

又方



寒水石 一两末 甘草炙 一钱末 家蔘粉 一两末

麥門冬 煎湯調下

白虎湯 出傷寒門 加人蔘

枇杷葉散 治消渴胸滿心煩津液大少

枇杷葉 去毛水洗二葉 麥門冬 去心一升 五味子 去核

五分 瓜蒌實 生地黄 人蔘 去苗芦各七分 茯神 去木

粉葛 家種者各一升 知母 去毛 甘草炙 已上各七分

右作一服水二鐘 竹葉十四片入烏梅一箇去內仁煎七分去

滓食遠溫服不拘時候

治宋子英消中得効錄

嘗治一老者年逾七十素有痰火過思鬱結因得消中之患晝夜飲食無度時時常進則可若少頃飲食則勞得不已每服寒中



無寸効人皆以七十翁患消中脫者鮮矣一曰因延予至家診脈
右手寸關弦滑左手寸關弦右尺脉浮大肺燥結子疑之此大
腸移熱與胃火內消故善食而不發渴也斷曰消中善食而飢肉
削消脉虛無力者不治此痰火內消飢色如故法宜可治遂用白
虎湯倍入石膏服之胃火漸平飲食漸減次以坎離丸養血四物
湯調理二月其患遂愈

一方治消中煩渴單以寒水石研極細末每服二錢以灯心草煎
湯調下

秘冊 生血為主摠治三消

黃連 天花粉 二味為末 藕汁 人乳汁 生地黃汁

佐以姜蜜和二末為膏每次一指面大放舌上徐徐白湯送下

噎膈



噎膈者喜怒憂鬱內傷脾肺肝木盛旺痰火上升津液枯涸傳化失宜故有噎膈凡得患者必先吞酸吐酸作痛之始今世俗治療每以胃脘停飲寒痰遂以香砂丁桂燥熱之劑愈投愈劇殊不知此等之症金無土養氣虛血少火旺痰多鬱久吞酸噎膈且如世俗造醋必以熟飯入釀飯之遂成酸醋人有痰火於胃水谷入胃遂吞酸心豈不是痰火釀成吞酸吐酸之患若作以寒痰治必誤矣治法宜養血生津清痰降火潤氣補脾抑肝開鬱治宜枳木二陳湯降火以酒炒蒼朮連清以竹瀝姜汁開鬱以神曲香附潤氣以麻仁杏子生津以物烏梅潤炒加之白蜜其間倘服燥熱過多津液枯竭腸胃燥結食罷者及尿如羊屎者不治縱有良藥十無一生務在戒性安情吾觀張幾峯云噎是神思間病准內觀曰此一言妙在其中矣胡不可知

三

枳實炒 白朮炒五分 半夏炮 茯苓名一錢 甘草

紅陳皮炮 晒乾五分

清煮加作瀝姜汁共五茶匙

無火姜汁炒川連五分 開鬱加香附米 童便炒

神曲炒 橘葉 青皮各五分

已上二味抑肝使氣○嘔吐入藿香砂仁○潤氣杏仁麻子炒

津少血虛加川歸生地黃各五分酒洗

蘇青丸 專治痰氣噎膈

蘇合香丸真白丸子各等分 研勻却以生薑自然汁加入

爛研為丸如梧桐子大每服十五丸或加至升五丸淡姜湯下

清氣化痰丸 專治停飲食不運化吞酸噎膈方見痰氣門



瓜蒌實丸

治下元氣虛上於腔膈痞痛悶閉

瓜蒌仁

別所

枳殼

去穢麩炒

半夏湯洗七次

桔梗

炒各一兩

右為細末姜汁打糊為丸如棗豆大每服五十丸食後姜湯下

橘杏麻仁丸

治噎膈大便秘結

橘皮

三兩炙

杏仁

去皮尖三兩

麻仁

去殼三兩

郁李仁

去殼五錢

右除陳皮為末三仁俱搗成膏用棗仁去核以石柏內三味搗

和丸如梧桐子大每服五六十丸煎枳實湯送下食前服

阿魏撞氣丸

方出氣門治冷氣噎膈作痛嘔吐酸水

○積聚

人身陰陽順臟腑和則無積聚之患矣或因氣躰虛弱或因飲食

