

傷寒論注卷六

吳縣王 丙樸莊著

元和陸懋修九芝校

傷寒宜忌第四

十五章懋修案王叔和重集諸可與不可刪却故知是非自在人心正不必謂叔和之語為定可從也

忌發汗一 陽虛忌發汗無待言矣此篇皆指陽邪可

汗而津液素虧者亦當知所忌也

少陰病脈細沈數病在裏忌發其汗

解見少陰篇

脈浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脈遲者忌發其汗何以知然此為榮氣不足血氣微少故也

傷寒論注卷六

吳縣王 丙樸莊著

元和陸懋修九芝校

傷寒宜忌第四

十五章懋修案王叔和重集諸可與不可刪却故知是非自在人心正不必謂叔和之語為定可從也

忌發汗一

陽虛忌發汗無待言矣此篇皆指陽邪可

汗而津液素虧者亦當知所忌也

少陰病脈細沈數病在裏忌發其汗

解見少陰篇

脈浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脈遲者忌發

其汗何以知然此為榮氣不足血氣微少故也

寸部浮取而緊則近於數尺脈沈按而遲則與數反一脈而兩異何也衛行脈外與邪相搏故緊榮行脈中不能協衛以勝邪故沈按而遲榮氣之虛已見發其汗則榮更虛矣許學士法先與建中數日後尺脈應乃汗之

少陰病脈微忌發其汗無陽故也

脈微一作脈濡而微弱

忌下疑缺大字蓋少陰原有麻附甘草微發汗之方但不可大發耳

咽中閉塞忌發其汗即吐血氣微絕手足逆冷

懋修案叔

和脈經手足逆冷下有欲得踰臥不能自溫句

此即小青龍噎證及瓜蒂證之氣衝咽喉者寒飲上逆病

在氣分汗之轉動其血陰陽氣不相順接矣

厥忌發其汗發其汗即聲亂咽嘶舌萎

一作厥脈緊懋修案脈經舌痿下有穀不

得前四字

厥在手足以陰陽之不順接也然經絡之支脈聯貫處尙能借別經以相通誤汗則併經脈之自裏上行者亦不相續矣所以四逆散純用緩調法亂改其常也嘶聲不揚也萎柔而不仁也

太陽病發熱惡寒寒多熱少脈微弱則無陽也忌復發其汗

見太陽篇一作熱多寒少懋修案脈經作熱多寒少

咽喉乾燥者忌發其汗

此指少陰之熱邪言之

亡血家忌攻其表汗出則寒慄而振

亡血家指平素血寒人也攻表指桂枝湯言啜粥取汗即
攻表法慄內寒也振外戰也金匱云血不足則胸中冷強
責其汗益傷其胸中之陽矣

衄家忌攻其表汗出必額上促急

一作額上陷脈促急懋修案脈經作汗出必額陷脈

上促急而緊直視而不能响不得眠

衄家常鼻衄者也太陽陽明之脈皆行於額衄家血從上
溢陽經已傷汗之則筋脈拘急經曰陽氣者精則養神柔
則養筋不宜攻表重傷其陽也

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼

懋修案脈經陰疼下有可與禹餘糧

字九

目前若有所見為恍意中若有所失為惚汗者心之液心失養則神亂小腸為心之府心藏虛則氣隨小便以下陷而陰疼矣

淋家忌發其汗發其汗必便血其妻刊誤淵並命淋是腎虛而膀胱熱者辛溫發汗則助膀胱之熱必引胞中之血從小便而出也

瘡家雖身疼痛忌攻其表汗出則瘡

懋修案千金瘡作瘡下全

此指身有瘍者癰膿方潰後雖患傷寒宜和表不宜發汗

汗出則寒溼氣從潰孔入與破傷風無異必變瘧也

冬時忌發其汗發其汗必吐利口中爛生瘡

冬時傷寒祇麻桂兩法忌用大青龍發汗因方內重用石

膏恐裏寒而吐利也格陽於上則口爛生瘡矣

欬而小便利若失小便者忌攻其表汗則厥逆冷

懋修案干金連上作

一條

欬屬肺小便利與失小便皆肺虛也汗則肺陽愈衰故卽

桂枝湯亦不可用也

太陽病發其汗因致瘧

見太陽篇

宜發汗二

懋修案脫大法春夏宜發汗一條

凡發汗欲令手足皆周絜絜一時間益佳不欲流離

言手足則周身皆在其中絜絜二字着手足上說言一時

間者不欲汗之遽收且不欲其過此一時之外也流離者

汗太多也太多恐病之不除或轉生他病也

若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也

懋修案干

金併上
作一條

邪不解自當重發其汗然恐汗多陽亡宜鄭重也

凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

謂一劑每分三服中病宜止後服是也

凡云宜發汗而無湯者丸散亦可用然不如湯藥也

本論中發汗無用丸散者此條疑後人所增

凡浮脈者病在外宜發其汗
懋修案脈經云屬桂枝湯證一云麻黃湯

病屬外感脈浮主表汗之無疑

太陽病脈浮而數者宜發其汗
懋修案第一條脈經云屬桂枝湯 ○太陽中

風陽浮而陰濡陽浮者熱自發陰濡者汗自出啻啻惡寒淅

淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔桂枝湯主之 ○太陽頭痛發熱

身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘麻黃湯主之 ○太陽

中風脈浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁
懋修案脈經煩躁下

有頭痛 大青龍主之
以上並見太陽篇 陽明病脈浮虛者宜發其汗

懋修案大青龍湯下有脈微弱汗出惡風不可服服之則厥筋惕肉瞤此為逆也數語 ○陽明病其脈



遲汗出多而微惡寒者表為未解宜發其汗

解見陽明篇

○太陰

病脈浮宜發其汗

解見太陰篇懋修案太陰病條下有太陽

此脫應補

又案汗自出桂枝無汗而喘麻黃不汗出而煩躁大青龍此為三級階升非三綱鼎立也

○少陰

病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗

見少陰篇

忌吐三○病在胸中宜吐此定法也若吐非其時則傷

中矣況諸虛證耶

太陽病惡寒而發熱今自汗出反不惡寒而發熱關上脈細

而數此吐之過也

懋修案脈經又云若得病一二日腹中飢口不能食三四日吐之不喜糜粥欲冷食

朝食暮吐此吐之所致也此為小逆又云太陽病當惡寒今吐之反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也

初見太陽為病之始不在胸而驟吐之中氣必大傷

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲若膈上有寒飲乾嘔忌吐當溫之

解見少陰篇

諸四逆病厥忌吐虛家亦然
龐安常曰諸四逆脈微弱虛細雖中滿不可吐宜橘皮湯枳實散之類又曰虛家當吐而不敢吐亦宜枳實散壓氣毒痰水入胃乃可微下若強吐之氣築心卽死

宜吐四

大法春宜吐

此爲伏寒變溫者言之病由內發順春氣之升而吐之則邪達矣

凡服吐湯中病便止不必盡劑也

如瓜蒂散及諸梔豉湯服法

病如桂枝證其頭項不强痛寸口脈浮胸中痞堅上撞咽喉

不得息此為有寒宜吐之

千金作內有久痰解見太陽篇懣修案今按東瀛倣北宋本作此為

有寒宜吐之無內有久痰字

病胸中諸實

一作寒

鬱鬱而痛

懣修案脈經云病胸上諸實胸中鬱鬱而痛千金同

不能

食欲使人按之而反有涎唾

懣修案脈經涎作濁

下利日十餘行其脈

反遲寸口微滑此宜吐之吐之利即止

此飲食生冷所傷非外感故但云病也實者寒氣之實鬱

痛諸證皆實象也下利者胸中屬肺肺病則收令失而大

腸不固也證實脈遲遲為在藏病乘於肺也寸口微滑痰飲無疑下利之本在肺吐之利斯止矣

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐宜吐之

解見少陰篇病者手足逆冷脈乍緊懋修案緊一作急邪結在胸中懋修案邪

結一作客氣心下滿而煩飢不能食病在胸中宜吐之解見厥陰篇

宿食在上管宜吐之

上管即上脘也宿食在此猶未消化故可吐若在中脘即

不可吐矣

忌下五

咽中閉塞忌下下之則上輕下重水漿不下

懋修案脈經又云臥則欲蹠身

體急痛復下
利日十數行

水飲上逆誤下而注於腹則上輕下重矣中氣大傷水漿

所以不下也

諸外實忌下下之皆發微熱亡脈則厥

懋修案千金併上作一條又案脈經又

云當臍握熱

外實者惡寒無汗脈浮緊者也其熱必重妄下則陷於裏

變為微熱陷之深而至無脈則入厥陰矣

諸虛忌下下之則渴引水易愈惡水者劇

虛家津液素虧下之更傷其陰故渴飲水者陽氣猶旺可

滋陰以和陽惡水則但喜熱湯為陰陽兩虛病變必重

脈數者忌下下之必煩利不止

脈數者陽虛也下之則愈鬱而煩矣邪陷故利不止

尺中弱濇者復忌下

見少陰篇

脈浮大醫反下之此為大逆

懋修案脈經脈浮大下有應發其汗一句

浮大是太陽陽明表證之脈誤下為大逆者惡其變作結

胸也

太陽證不罷忌下下之逆○結胸證其脈浮大忌下下之即

死○太陽與陽明合病喘而胸滿者忌下

並見太陽篇

太陽與少陽合病心下痞堅項頸強而眩忌下

太少合病熱必不輕有因痞堅而誤下者不知痞堅只在



心下並未入胃且有項頸強眩證此豈可下耶

凡四逆病厥者忌下虛家亦然

詳厥陰篇

病欲吐者忌下

凡病欲吐者當和之無用下之理

病有外證未解忌下下之為逆

懋修案脈經云太陽病有外證未解

少陰病始得之手足寒脈弦遲此胸中實忌下

解見前懋修案脈經云少

陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐千金同又案影宋本作少陰病食入即吐心中溫溫欲吐復不能吐

然後接始得之句

傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者忌下

見厥陰篇懋修案脈經云下之

亡血則死千金同

宜下六

大法秋宜下

此見難經之溼溫本於伏寒而發於長夏者秋尚有之順
秋令之降而用下與溼邪宜下法亦符

凡宜下以湯勝丸散 凡服湯下中病即止不必盡三服

陽明病發熱汗出者急下之

見陽明篇懋修案脈經作汗多者急下之屬大柴胡湯

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之

懋修案脈經屬承氣湯

○少

陰病五六日腹滿不大便者急下之

懋修案脈經屬承氣湯

○少陰病

下利清水色青者心下必痛口乾者宜下之

並詳少陰本篇懋修案脈經屬

大柴胡湯
承氣湯