

聖濟總錄

吳錫瑄著

口齒門

口齒統論

論曰足太陰脾之經其氣通於口足陽明胃之經手陽明大腸之經其脉並夾於口故其府藏風邪濕熱發於經脈則於是有所口吻之疾牙齒者骨之所終髓之所養也又手陽明之支脉入於齒故骨髓之氣不足與夫陽明之脉虛不能有所滋養則於是又有牙齒之疾牙齒之疾其候甚多治療之法固不得略也養生方云雞鳴時常叩齒三十六下食畢令啄齒皆宜長行之令齒不蠹蟲又云早朝未起漱口中玉泉令滿口嚥之啄齒二七過去蟲而牢齒十全又曰每旦以鹽一捻內口中以緩水揩漱及叩齒百遍為之不絕不過五日即牢密若此之類皆爾易可行行之有効不可忽也

口瘡

論曰口瘡者由心脾有熱氣衝上焦熏熾口舌故作瘡也又有胃氣弱穀氣少虛陽上發而為口瘡者不可執一而論當求所受之本也治熱毒發動口瘡心煩躁玄參煎方

生玄參汁

生葛汁

各參銀兩

水石末

寒水石末

石膏末

滑石末

磁石

煅醋淬茶末各半斤

升麻

牛黃末

羚羊角粉

犀角粉

甘草

剉各半斤

芒消

研細

升麻

右一十三味除銀玄參生葛芒消牛黃外並麌搗篩以水三斗煎銀寒水  
石石膏滑石磁石以汁二斗去滓別以水五盞煎升麻羚羊犀角甘草至二  
盞去滓與玄參并生葛汁一處都和再煎如稀餳然後下芒消攪勻傾入瓷器  
中盛却入牛黃末再攪取勻停冷黃黑色每取兩大匙入蜜一合和勻分四  
服熱湯調下不拘時候

治口瘡槐枝煎方

槐枝

二三月採好者剉

桑枝

剉

柳枝

宿浸次日入鍋文武火煎約水半斗參味以水伍斗隔

得壹斗去滓再入鍋

鎔煎至伍升入後藥

細辛

去苗葉

本土

芒草各半

麝香研

壹分

胡桐淚

升麻

兩

桑枝各半

麝香研

壹分

右一十味將後七味搗羅為末入前藥汁內更煎如餳臨卧淨漱口以藥半

匙傳痛處有涎即吐之臨卧再用

治口爛生瘡水漿不下當歸膏方

當歸

兩

射干

附子

去皮臍切

附子各半兩

切

白蜜

肆

豬脂

伍

升麻

切

右六味除蜜脂外並剉先煎脂化去滓入諸剉藥慢火煎候附子色黃又去滓入蜜更煎如膏以瓷器盛每服如杏核大含之日三五度嚥津不妨治口瘡及喉閼吹喉朴消散方

朴消

消石

膽礬

白礬

芒消

伍味皆枯乾

寒水石

燒

白僵蠶

炒者

甘草根

青黛

研各等分

右九味搗研為細散和勻每用少許摻瘡上遇喉閼用筆管吹一字在喉中立破

治口瘡并咽喉塞黃連膏方

黃連

去須剉

豬脂

壹斤

白蜜

肆

羊髓

研

貳

右四味先以慢火煎豬脂取油去滓入黃連又煎令黑色下羊髓髓化以綿濾去滓入蜜更煎數沸成膏瓷合盛候冷每含如棗大日三五度嚥津不妨治口瘡多年不差風熱上攻薔薇膏方

薔薇根

郁李根

水楊皮

牛蒡根

並細切壹斤

蒼耳殼

露蜂房

碎擣參故升

生地黃切

升麻

當歸洗切各

地骨皮

白芷

石膽

研各半兩

熟銅粉研

麝香

研各一錢分

右一十四味先以前六味細切水二斗煎至五升葛布絞去滓次入地黃升  
麻當歸地骨皮白芷再煎至二升綿濾去滓慢火又煎成膏乘熱下後三味  
研藥攏令勻瓷器盛每含如彈丸大吐津

治口瘡積年不差丹砂膏方

丹砂

研各一分

豬脂

蜜

各半兩

杏人

湯浸去皮尖雙人研參茶粒

臘粉

白礬

胡粉

研各一分

麝香

研各一分

生地黃

切焙半兩

右九味搗研七味為末先煎脂蜜令化去滓次下諸藥更煎十餘沸以綿濾  
去滓更煎待膏就瓷合盛每用如杏人大綿裹含吐津

治久患口瘡不任食物雞舌杏丸方

雞舌杏

未研各一分

松脂

研各一分

胡椒

為末參茶粒半兩

細辛

參茶粒半兩

右四味用蘇木濃煎汁和藥丸如梧桐子大每以緩水研一丸塗瘡上

治口瘡久不差燒肝散方

茵陳蒿

犀角屑

石斛

根去

白术

芷胡

去苗半兩

芍藥

紫參

桔梗炒

防風炒

桂皮

吳茱萸

湯浸  
搗培炒

人參

白蘆萬各一錢分

右一十三味搗羅為散每服五錢匕以白羊肝五兩細切去筋膜入葱白三莖細擘相和濕紙三五重裹慢火煨熟空腹頓服米湯下

治口瘡經年歇發飲食艱難薔薇根散方

薔薇根

對壹

蜀椒

去目并閉口炒

出汗肆拾玖粒

右二味搗羅為散以漿水二盞煎五七沸去滓熱含冷吐

治牙疼口瘡積年不差蟾酥丸方

蟾酥

壹片水浸令軟

麝香

研少許

右二味細研丸如粟米大以綿裹一丸於病處咬之有涎即吐

治口瘡久不差方

薔薇根

壹握

右一味剉用水一升煎至半升候冷含稍稍嚥之冬用根夏用莖葉又宜同角蒿灰塗有涎吐之

治元藏虛冷上攻口瘡巴戟散方

巴戟天去心壹兩

白芷半

高良薑錢匕末壹

右三味搗為細散用豬腰子二隻去筋膜每隻入藥散一錢匕用濕紙裹  
煨熟乘熱去紙以口吸熱氣有涎即吐候冷細嚼服之

治口瘡杏人丸方

杏人

湯浸去皮去核人拾粒

蛇牀子

燒灰

白芷

燒灰

膩粉各壹分

右四味研杏人如膏和三味為丸如雞頭實大每細嚼五丸不得嚥津吐涎  
出立効

治口瘡甘草煎方

甘草

炙末兩

豬膏

肆

白蜜

兩

黃連

去須參

未壹兩

右四味先煎脂令沸去滓下蜜并藥等慢火熬成煎每服一匙頭含嚥津以  
差為度

治口瘡白礬煎方

白礬

末壹兩

鉛丹

研各

附子

去皮臍生

為末

屋下大媒

各半

右四味搗研為末入白蜜三兩煎為煎入竹筒盛飯上炊一次每用少許含  
吐涎出効

治口瘡黃藥煎方

黃藥末壹  
兩

硫黃分研壹  
兩

黃連末壹  
兩

麻油半斤

亂髮洗去臘  
兩

右五味先將油煎髮銷然後下黃藥等末重煎待凝成煎每含如杏人大吐津不得嚥

治口瘡疼痛石膽煎方

石膽半錢燒蜜合

蟾酥研半

黃藥末壹錢  
七分

右四味先於鑄中慢火煎蜜次下藥末煎如錫每含如杏核大吐津不得嚥

治口瘡杏人煎方

杏人研皮尖雙人  
研蜜末

胡粉研

鉛丹壹分研各

右三味用蜜五合調和用竹筒盛蒸一次久旋含之吐津不得嚥

治口瘡麝香散方

麝香研壹

胡黃連壹錢

檳榔生剉

右三味擣研為細散旋傳之

治口瘡滑石散方

滑石

膽礬各壹  
兩

右二味擣研為散每用一錢匕以綿裹含吐津

治口瘡疼痛生薑煎方

生薑

取汁  
壹盞

白沙蜜

參  
兩

右二味同煎十餘沸用瓷器盛時時以熟水調一匙頭含嚥之

治口瘡柳花散方

黃蘖

壹錢

澱花

半錢

右二味為散臨卧乾摻誤嚥亦不妨

治口瘡麝香散方

麝香

計

人中白

錢

右二味研細綿裹如菉豆大含之嚥津

治口瘡二物散方

白僵蠶

黃連

分等

右二味為末臨卧摻口內

治口瘡諸藥不效碧玉散方

膽礬

半兩

鍋子內燒通

赤地上出大毒

通

右一味細研每取少許傅瘡上有清涎吐之

治口瘡附子塗脚方

附子壹枚生  
為末

右一味以薑汁和勻攤脚心

治口瘡薑荷根湯方

薑荷根兩

右一味細剉分為三分每分以水二盞煎三五沸去滓熱含冷吐

治口瘡升麻含汁方

升麻不拘多少

右一味含一塊嚥津

治口瘡齊苑煎方

齊苑參拾

右一味以薄綿裹酒煮二十沸許取出每含一枚良久嚼嚥之日三五度

治口瘡豆豉散方

豆豉肆兩

右一味擣羅為散每用綿裹一錢匕含之日五七次

治口瘡乾蟾散方

乾蟾一枚

右一味擣研為散綿裹半錢匕含吐津

治口瘡胡粉膏方

胡粉炒研

右一味以牛酥調如膏每含如杏人大嚥津

治口瘡馬牙消散方

馬牙消研末

右一味每含一錢匕嚥津日三五度

治口瘡檳榔散方

檳榔剉

右一味為散每取半錢匕塗舌及脣上

治口瘡桑汁塗方

桑條汁合

右一味早晨塗口舌上

治口瘡蒲黃散方

蒲黃

壹兩

右一味每用一錢匕傅口舌上嚥之

治口瘡無食子散方

無食子

燒灰細研壹兩

右一味每取一錢匕傅舌上日三五次

治口瘡楸木汁方

楸木白汁

伍合

右一味每取一匙頭含嚥

治口瘡蟾酥線方

蟾酥

半片

右一味以半盞水浸化為水更入牛黃末一錢匕攪勻以絲線五十條就藥中浸一宿陰乾每取一條含吐津

治口肥瘡方

竈上飲食

右一味炒令焦研末傅之

治下冷口瘡神聖膏方

吳茱萸

壹兩

右一味擣羅為末用酸醋一大盞調熬成膏後入地龍末半兩攪勻每臨卧時先用葱椒湯洗足拭乾用藥偏塗兩脚底心或以手帛子繫定次日必減未減再塗

治口內生瘡齒斷肉爛升麻飲方

升麻

黃連

羚羊角

玄參

黃芩

去黑心

麥門冬

葛根

大黃

羌活

去蘆頭

防風

甘菊花

各半人參

參分

甘草

炙

知母

洛壹

右一十四味麌搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服食後

治口瘡衆藥不差者蜜陀僧散方

蜜陀僧

黃檗皮

甘草

各壹兩并以蜜蜜丸杏仁

蒲黃

黃藥子

谷半兩

右五味搗研為散時時傅之

治久患口瘡黃連膏方

黃連去須升麻

槐白皮

大青

苦竹葉各一兩

右五味細剉以水二升煎至半升去滓取汁入龍腦蜜攪令勻煎成膏塗瘡

上日三度

治舌上生瘡鉛丹膏方

鉛丹一兩

蜜參合

生地黃汁參杏人去皮尖

研如麯茶拾枝

右四味合和一處調勻銀器內煮用槐枝攬不得住手看色紫即成取少許  
口內含化吐津

治口瘡久不差蟾酥線方

真蟾酥伍兒大蓬砂

龍腦

麝香各一兩

右四味同研極細以溫湯半盞化令勻入緋線秤半錢蘸藥汁曬乾再蘸再  
曬候藥汁盡將線寸截每用一條貼於患瘡處有涎即吐一日三五次易之

取差為度

治大人小兒卒患口瘡鉛霜散方

鉛白霜拘多細少

右取少許塗傳痛處一兩度差

治卒患口瘡升麻湯方

升麻剉

黃藥去麌

皮剉

大青各一兩

右三味麌搗篩每服五錢匕水二盞煎取一盞熱漱冷吐

治口舌生瘡久不差白芷散方

白芷末壹錢

銅綠壹錢

白礦蠶肆

乾烟脂半錢

右四味搗研為末每用少許以雞翎子掃瘡有涎吐之不得嚥津

治虛勞口瘡久不差秦艽散方

秦艽去苗土

茈胡去苗根

兩

右二味擣羅為散每服三錢匕割豬肝三兩片用酒煮之去肝取酒調藥溫

服十服當愈

治心肺壅熱口內生瘡胸膈痰逆玄參湯方

玄參

茅根剉

羌活去蘆

竹茹

木通剉

羚羊角鎔

升麻各半

黃連去須

人參

苦竹葉

半夏湯  
湯洗去滑  
各半分

甘草剉壹分

右一十二味麝擣蕊每服三錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去滓溫服  
食後

治口瘡久患不差銅綠散方

銅綠研壹錢

鉛丹研

白芷研

白芷剉壹分

右三味合研令勻取少許擦舌上即差

治口瘡痛拔苓湯方

赤茯苓去黑人參各一兩

右二味麌搗蕊分作四服每服水二盞煎至一盞去滓溫服日三不過二劑  
治口瘡玄參丸方

玄參

天門冬心

麥門冬

去心研各壹兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大每用一丸綿裹含化嚥津

治口常有瘡疾藥子散方

蒺藜子炒去穢豆

各半兩

右二味搗羅為散如茶點喫

口糜

論曰膀胱移熱於小腸陽腸不便上為口糜夫小腸之脉絡心循咽下膈抵胃陰陽和平水穀入胃小腸受之通調水道下輸膀胱今熱氣厥逆膀胱移熱於小腸胃之水穀不得傳輸於下則令腸陽塞而不便上則令口生瘡而糜爛也大抵心胃壅熱則必熏蒸於上不可槩以傳藥當求其本以治之

治小腸熱脹口糜生瘡此胡澤瀉湯方

茈胡

去苗  
澤瀉

黃芩

去黑  
心皮

枳實

嫩

陳橘皮

浸去  
白皮

旋復花

升麻

芒消

別研  
參兩

生地黃

生根  
莖

右九味除芒消外咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎取一盞去滓下芒消末半錢匕攬勻食後溫服

治口糜生瘡久不差及心脾中熱乍發乍退大青丸方

大青

根  
甘草

枳殼

嫩  
去瓤

苦參

對各  
參分

生乾地黃

培

黃連

根  
升麻

兩  
各  
宣

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後熟水下日二服治口糜生瘡久不差大黃散方