

幼
科
卷三



民國念八年四月十號

編輯幼科雜病心法要訣

痘

病

心

法

要

訣



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE LIBRARY

卷三

編輯幼科雜病心法要訣

發熱門

諸熱總括○小兒發熱有表裏虛實之異治亦有汗下補瀉之殊須觀形察色審證庶不治誤功脉以別之惟在平昔講習猜詳臨證庶不治誤

表熱○小兒外感寒邪脈浮發熱惡風惡寒頭痛身痛無汗此表熱也宜十神湯雙解之若兼內熱者雙解通聖湯兩解之

十神湯 升麻 葛根 麻黃 香附調炒 陳皮 蘇葉 赤芍藥 川芎 香白芷

生甘草 引用生姜水煎服○雙解通聖湯宣傷寒

裏熱○小兒肥甘過度必生內熱以致發熱蒸蒸小便赤濁面赤唇焦舌燥而渴脈實有力者先以調胃承氣湯下之不愈用白虎湯或黃連解毒湯清之

調胃承氣湯 大黃 芒硝 甘草 引用生姜水煎服

白虎湯 生石膏 知母^生 甘草^生 粳米 水煎服

黃連解毒湯 黃芩 黃連 施子 黃柏 水煎服
虛熱○者因小兒病後氣血虛弱榮衛尚未調勻之故其證神倦氣乏宜用補中益

氣湯治之若兼口渴引飲而嘔者宜用竹葉石膏湯主之又有陰盛格陽外浮發熱者其面色雖赤然小便必清白四肢必厥逆宜用白通湯收斂陽氣熱退自愈

竹葉石膏湯 竹葉 石膏^煅 人參 麥冬^{去心} 甘草^生 半夏^{姜製} 粳米 引用生姜水

白蘆湯 乾姜 附子^製 葱 水煎服○補中益氣湯^{萬匱驗泄}

實熱○積熱午潮熱腹脹尿紅大便難煩渴口瘡腮頰亦涼膈大柴效神仙註小兒

有餘積熱以致午後潮熱蒸蒸有汗肚腹脹滿小便亦大便難煩渴啼叫口舌生瘡腮頰紅赤脈洪數有力法宜清熱通利時時熱者涼膈散主之午後潮熱者大柴胡湯主之○涼膈散^{葛根傷寒}○大柴胡湯^{方見傷寒}

積滯門

積滯總括○夫乳與食小兒資以養生者也胃主納受脾主運化乳貴有食時貴有節可免積滯之患若父母過愛乳食無度則宿滯不消而病成矣醫者當別其停傷食之異臨證斟酌而施治焉

乳滯○之兒其候睡卧不寧不時啼叫口中氣熱頻吐乳片肚脹腹熱大便酸臭也但臟腑嬌嫩不可過攻惟宜調和脾胃為上以消乳丸消導之○消乳丸方見消乳吐氣食滯○小兒恣意肥甘生冷不能運化則腸胃積滯矣其證頭溫腹熱大便酸臭氣惡食煩不安眠口乾作渴滯輕者宜木香大安丸消導滯重便秘者宜小承氣湯攻下之○小承氣湯宣食痛

木香大安丸 木香 黃連 陳皮 白朮 枳實炒山楂肉各三錢連翹二錢去心神麴炒麥芽各三錢砂仁 菜菔子各三錢半右為細末神曲糊為丸每服一錢陳倉米湯下

癬疾門

癬疾總括○癬疾一證皆因飲食過節腸胃填滿濁汗外溢復感寒氣凝結而成每

生於於左脇之下始如雞卵堅硬成塊漸如覆盆之形越臍則難治矣其候身體熱喜飲涼水肌膚削瘦面色青黃也治者宜詳察之

癥疾潮熱○疾癥之始作也午後潮熱口渴飲冷壯大青筋漸至硬堅成塊痛內以千金消癥九治之外貼紅花膏內外兼治其癥自消若無熱渴者先以丸治之外亦以紅花膏貼之

千金消癥九 蘆薈 阿魏另為糊炒 青黛 木香 厚朴姜炒 桃榔 陳皮 甘草各一錢 研末 史君

子 壴 胡黃連 山查肉 香附醋炒 三稜醋炒 義朮各二錢 研末 水紅花子 神鞠炒 麥芽各四錢 研末

人參 白朮去皮炒 茯苓各三錢 研末 右為細末將阿魏一錢白水和麪打糊為丸菉豆大米飲

下量兜大小服之

木香九 木香 蓬莪朢 緩砂仁 青皮 砂各二錢 研末 右為細末和勻飛白麪和

糊麻子大每服二三丸傷乳飲下食傷以所傷物熬湯下

紅花膏 没藥五錢 血竭 膜香 阿魏各三錢 研末 當歸 亦芍各一錢 水紅花科一捆煎汁去渣取膏 右為細

未入膏內攏勻以青布攤貼患處

汗證門

汗證總括○汗乃人之津液存於陽者為津存於陰者為液發洩於外者為汗。若無故而出者乃因陰陽偏勝也。如小兒無因而汗自出者謂之自汗。自汗屬陽有虛實之別。虛者汗出翕翕發熱惡寒乃表虛也。汗出蒸蒸發熱不惡乃裏熱也。表虛者當固表裡實者法當攻熱又有睡則汗出覺則汗止謂之盪汗。盪汗主陰虛然當分心虛不固心大傷陰也。心虛當補心心熱當涼血治者宜詳辨之庶無差謬。

自汗○表虛濺濺自汗玉屏風散主之。若惡寒冷陽氣虛也桂枝湯加附子固之。陽明裡實蒸蒸自汗用白虎湯清之便祕者以調胃承氣湯攻之。

玉屏風散 黃耆蜜炙防風白朮去皮水煎服

桂枝加附子湯 白芍 桂枝 甘草炙 附子製 引用姜棗水煎服

白虎湯方見裏熱○調胃承氣湯方見裏熱

盜汗○有二虛實兩分心虛者陰氣不歛也睡則多驚以酸棗仁湯主之傷於陰也身多煩熱以當歸六黃湯主之

酸棗仁湯

當歸 白芍炒 生地 茯苓 酸棗仁炒 知母炒

黃柏炒 五味子

參 黃芪
火水煎服

當歸六黃湯

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃柏 黃連

黃芪
火引

麥水煎服

失血門

失血總括○凡失血之證陽盛乘陰則血為熱迫不能安於脈中犯於氣分妄行不能歸入經脉也若血病傷及於肺者則血滲入腸胃之濁道上行於咽為吐為衄下從二便而出為便為溺也若血病傷及於臟者則溢出於胸中之清道上從喉出而兼咳嗽下從精竅而出為溺血也夫血藏於臟內行於脈中流於軀壳之內不可得而見也非損傷不能為病而損之之因有三一曰熱傷陽絡腑病也熱傷陰絡臟病也

宜以清熱為主一曰努傷宜以破逐為主一曰勞傷宜以理損主為若日久血止而
咳嗽不休者主必死之證故勢多凶也

衄血者○鼻中出血也其候鼻中乾燥身熱不渴苦頭痛是熱傷陽絡也有
失汗衄血者乃熱鬱於榮其身無汗宜以麻黃湯汗之身有汗者宜以桂枝
湯設無表病因內熱而衄者宜以犀角地黃湯清之熱盛者四物三黃湯心湯
俱用髮灰散或黑拖子末吹鼻其衄自止

麻黃湯 麻黃 桂枝 杏仁 炙甘草 引用生姜水煎服○桂枝湯亦可自汗

星角地黃湯 牡丹皮 白芍 星角 生地黃 水煎服 便硬者加大黃

四物三黃湯治心
川芎當歸酒洗生地
赤芍黃芩黃連
川大黃酒洗水煎服

髮灰散 取壯貴人頭髮陰陽瓦煅成灰放在地上去火性研細吹入鼻中血衄止

吐血○小兒吐血不咳嗽者多因內熱致血妄行上逆也宜以犀角地黃湯主之若

因努勞吐血者兼咳嗽先用桃仁承氣湯以破逐之次用加味四物湯和之又有

傷吐血者亦兼咳嗽痰中帶血有熱者雞蘇散主之無熱者救肺散主之

桃仁承氣湯 桃仁古皮
尖研大黃 芒硝 甘草 桂枝 加當歸芍藥蘇木紅花

煎服○犀角地黃湯方見奮門蟹

加味四物湯 當歸 芍藥 川芎 生地黃 茅根 蒲黃 牡丹皮 施子

甘草生 引用藕節酒水煎服

雞蘇散 雞蘇薄荷葉 川貝母志麥門冬杏桔梗 阿膠炒生地黃 甘草生黃

耆炙白茅根 蒲黃炒水煎服

加味救肺散 麥冬去心 人參 黃耆炙鬱金 五味子 當歸酒洗白芍藥酒洗川貝

母去心
研甘草炙馬兜鈴 水煎服

便血○大便下血皆因小兒恣食肥甘致生內熱傷陰絡也若血色黯而濁肛門腫痛先血後糞此為逆血名曰藏毒若血鮮而清腹中不痛先糞後血此為違血名曰

腸風藏毒肛門每多腫痛初起宜用皂刺大黃湯消之大下血後熱盛微痛者以槐

花散和之濕盛不痛者以平胃地榆湯和之腸風亦宜以槐花散主之便血日久脉微氣血弱者升陽和血湯和之繼用入參養榮湯補之

皂刺大黃湯 皂刺 生川大黃各等量 小兒年歲大小虛實酌其多少酒煎服

槐花散 槐花炒側柏葉 枳壳炒 川黃連 荆芥穗炒水煎服 腸毒加蒼朮

棟 腸風加秦艽防風

平胃地榆湯 蒼朮炒陳皮 厚朴姜炒甘草 地榆 引用生姜水煎服

升陽和血湯 黃耆炙當歸酒洗白芍炒牡丹皮 陳皮 肉桂 秦艽 生地黃

熟地黃 生甘草 炙甘草 蒼朮炒升麻 水煎服

人參養榮湯 人參 黃耆炙白芍炒白茯苓 白芍 肉桂 熟地黃 當歸酒洗

甘草火陳皮 引用姜棗水煎服

漏血○為精竅之病乃尿與先血免後分出者也宜用牛膝湯四物治之其證自愈

牛膝四物湯 牛膝 木通 麝金 甘草梢 瞿麥 當歸 川芎 生地 赤

芍藥 水煎服

雜證門

二便秘結○此證多因乳食停滯生熱結於腸胃以致二便秘結其候舌乾亦唇焦也熱積則小便祕濇少腹滿急宜八正散主之若食積大便祕腹脹痛者神芎丸主之○八正散竊不小腿

神芎丸
尖黃 滑石各一兩
水飛 薄荷 川芎各四錢
錢鑄 黃芩 黃連各五錢
錢生 牽牛四錢共細末滴水為

丸每服五服蜜湯送下

氣虛脫肛○一證因瀉漏日久中氣下陷腸胃瘦遂令肛門滑脫不收現證面色青黃指梢冷脈沉細唇色淡白宜溫補為主先以補中益氣湯升提其氣再以真人參養藏湯溫補固滑外以瀉腸散摻之則氣升肛濇而腸自收矣

瀉腸散 蘭子 赤石脂 龍骨各等分右為細末用臘茶調敷和藥摻腸頭上綿帛柔

入○補中益氣湯真火發瀉真人養藏湯真寒瀉

肛腫翻肛○小兒積熱太盛以致肛門作腫大便艱難努力翻出肛脫不還外用蟠龍散消其腫內服皂刺大黃湯其腫一消肛自收矣○皂刺大黃湯方見便血

曹氏蟠龍散

乾地蟠龍

一兩畧
生炒

風化朴硝

蜜
右剉研為細末仍和勻朴硝每

三錢肛門濕潤者乾塗乾燥者用清油調塗先用荆芥生葱煎水候溫洗

拭乾然後敷藥

龜胸○一證多因小兒飲食不節痰熱熾盛復為風邪所傷風熱相搏以致肺經脹滿攻於胸膈高如覆杯現證咳嗽喘急身體羸瘦治宜清肺化痰為主先以寬氣飲開其氣道再以百合丹除其壅滯肺熱清而脹滿自除矣

寬氣飲

杏仁去皮尖炒桑白皮炒橘紅

蘇子炒枳壳炒枇杷葉蜜炙

麥門冬

去心

生甘草

苦葶藶水煎服

百合丹

百合

天門冬

杏仁

去皮尖炒

木通

桑白皮炒甜葶藶

石膏

大黃

共

為細末煉蜜丸如菉豆大量兜服之臨卧滾白水送下



南京中医药大学图书馆版权所有

龜背者○因嬰兒坐早被客風吹入脊膂遂致僵曲折背高如龜往往為終身疾內以松蕊母調治之外用聖惠灸穴法灸肺愈心愈膈俞三穴三五壯或點骨節上亦可得效

松蕊母 松花 神壳炒防風 燭活各一兩 麻黃 前胡 川大黃生 桂心各五錢

煉蜜丸如黍米大每服十九粒飲送下

五軟者○謂頭項軟手軟足軟口軟肌肉軟是也頭軟者項軟無力也手足軟者四肢無力也內軟者皮寬不長肌肉也口軟者唇薄無力也此五者皆因稟受不足氣血不充故故脉不強肉痿弱治宜補氣為主先以補腎地黃丸補其先天精氣再以扶元散補其後天羸弱漸次調理而五軟自強矣

補腎地黃丸熟地黃 山萸肉 懷山藥 茯苓 牡丹皮 潤鴻 牛膝 鹿

草 右末煉蜜丸如梧桐子大每服二錢益湯送下

扶元散 人參 白朮 茯苓 熟地 茯神 黃耆 山藥 炒甘草 當歸

白芍 川芎 石菖蒲 引用姜棗水煎服

五癇者○仰頭取氣難以搖動氣壅痛疼連胸膈間手心足心冰冷而癇皆因陽氣不榮於四末最為難治重者以小續命湯疏其風輕者以烏藥順氣散調其木乘脾食少氣弱者加味六君子湯治之內外交治而證自日瘥矣

小續命湯 人參 麻黃 川芎 黃芩 芍藥 甘草 炙防風 官桂 辛皮 附子 生
漢防已 引用姜棗水煎服

烏藥順氣散 麻黃 白芷 川芎 桔梗 枳壳 炒殼蟄炒烏藥 炮姜 甘草

生 橘紅 引用葱白水煎服

加味六君子湯 人參 白术 茯苓 炙甘草 半夏 陳皮 炮姜 升麻 炙

柴胡 醋炒 肉桂 水煎服

五遲○小兒五遲之證多因父母氣血虛弱先天有虧致兒生下筋骨軟弱行步艱難齒不速長坐不能穩要皆腎氣不足之故先用加味地黃丸滋養其血再以補中

益氣湯調養其氣又足少陰為腎之經其華在髮若少陰之血氣不足即不能上榮

於髮
葛勝母主之又有驚邪乘入心氣至四五歲尚不能言者葛蒲丸主之

加味六味地黃丸

大熟地

山萸肉

山藥

丹皮

茯苓

澤鴟

鹿草

加皮

麝香

共末

煉蜜

丸如梧桐子

大大兜每服二錢

小兜一錢五分

益陽湯

下○補中益氣湯

寬殼瀉

葛勝母

當歸洗焙

生地黃

白芍

葛勝子

胡粉

右同研勻煉蜜為丸如黍米

大每服十九丸煎黑豆湯下

葛蒲丸

人參

石菖蒲

麥冬

遠志

川芎

當歸

乳香

硃砂

右為末

煉白蜜丸如黍米大食後用米湯送下

鶴膝風○小兒鶴膝風多因稟賦不足氣不榮肌肉削瘦遂致骨筋外露筋攣脉縮

股漸細小而膝蓋愈大要皆腎虛不能生精髓生血之故也須先服大防風湯繼以

補腎地黃丸治之庶氣血充而自愈矣

大防風湯

人參

白术
茯苓

甘草
熟地

當歸身

白芍
川芎

黃芪

蜜丸活

防風

附子
杜仲

牛膝

引用姜棗水
○補腎地黃丸見五載

解鬚者○先天有損乃頤大骨縫不合也蓋腎生髓腦為髓海腎氣有虧腦髓亦如花木無根現證面色能白形體瘦弱目多白睛悲愁少笑治宜補養腎氣為主先以補腎地黃丸滋補其陰再以扶元散補養其氣外用封頤散攤貼之則精血充或可轉危為安也○補腎地黃丸○扶元散俱見載

封頤散 柏子仁 防風 天南星 右為末每用一錢以豬胆汁調勻攤在紗綢帛上有頤之大小剪貼一日一換不得令乾時時以湯潤動

頤陷○小兒藏府有熱渴飲水漿致成渴痢久則脾虧虛弱不能上充腦髓故頤成坑名曰頤陷現證面目青黃四肢逆冷六脉沉緩神氣慄淡先以補中益氣湯升提其氣再以固真湯溫補其脾外用烏附膏攤貼於陷處極效

烏附膏 雄黃 川芎 附子 右為末用生葱和根葉細切杵爛入前藥末同煎