

除濕湯

和一七七
身重痛

神木湯

和三九
風濕脉緊

調中益氣湯

補三二
濕陷

濕鬱湯

和二六六
風濕

敗毒散

散三六
風濕

參附滲濕湯

熱一二二三
寒濕痺

胃苓湯

和百
九十

活絡飲

和二七七
風濕痛

毛活勝濕湯

和一七八
身盡痛

白木湯

和二六
風濕脉緩

腎著湯

熱百三十
寒濕腰重

清熱滲濕湯

寒百十一
濕熱

聖散子

散四三
風濕

黃疸

經義

經脈篇曰腎所生病爲黃疸

玉機真藏論曰風者百病之長也今風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱當是之時可汗而發也或痺不仁腫痛當是之時可湯熨及火灸刺而去弗治肝傳之脾病名曰脾風發瘧腹中熱煩心出黃

平人氣象論曰溺黃赤安臥者黃疸○已食如飢者胃疸○目黃者曰黃疸

論疾診尺篇曰身痛而色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也安臥

小便黃赤脉小而澁者不嗜食○賓按此二條凡已食如饑者卽陽黃之證安臥脉小不嗜食者卽陰黃之證也

通評虛實論曰黃疸暴痛癰疾厥狂久逆之所生也

論證 共七條

黃疸一證古人多言爲濕熱及有五疸之分者皆未足以盡之一而不知黃之大要有四曰陽黃曰陰黃曰表邪發黃曰膽黃也知此四者則黃疸之證無餘義矣丹溪曰疸不必分五種同是濕熱如蠶麴相似豈果皆如蠶麴悉可謂之濕熱耶弗足憑也愚列如左

一陽黃證因濕多成熱熱則生黃此卽所謂濕熱證也然其證必有身熱有煩渴或躁擾不寧或消穀善飢或小水熱痛赤澁或大便秘結其脉必洪滑有力此證不拘表裏或風濕外感或酒食內傷皆能致之但察其元氣尚強脾胃無損而濕熱果盛者直宜清火邪利小便濕熱去而黃自退治此者本無難也

一陰黃證則全非濕熱而總由血氣之敗蓋氣不生血所以血敗血不華色所以色敗凡病黃疸而絕無陽證陽脉者便是陰黃陰黃之病何以致然蓋必以七情傷臟或勞倦傷形因

致中氣大傷脾不化血故脾土之色自見於外其爲病也必
喜靜而惡動喜暗而畏明凡神思困倦言語輕微或怔忡眩
暈畏寒少食四肢無力或大便不實小水如膏及脉息無力
等證悉皆陽虛之候此與濕熱發黃者又如水炭使非速救
元氣大補脾腎則終無復元之理且此證最多若或但見色
黃不察脉證遂云黃疸同是濕熱而治以茵陳梔子瀉火利
水等劑則無有不隨藥而斃者

一表邪發黃卽傷寒證也凡傷寒汗不能透而風濕在表者有
黃證或表邪不解自表傳裏而濕熱鬱於陽明者亦有黃證

表邪未解者必發熱身痛脉浮少汗宜從汗散濕熱內鬱者
必煩熱脉緩滑多汗宜從分消清利若陽明實邪內鬱而痞
結脹滿者宜先下之然後清其餘熱則自無不愈

一膽黃證凡大驚大恐及鬪毆傷者皆有之嘗見有虎狼之驚
突然喪膽而病黃者其病則驟有酤吏之遭或禍害之慮恐
怖不已而病黃者其病則徐如南北朝齊永明十一年有太
學生魏準者因惶懼而死舉體皆青時人以爲膽破卽此之
類又嘗見有鬪毆之後日漸病黃者因傷膽而然其證則無
火無濕其入則昏沉困倦其色則正黃如染凡此數證皆因

傷膽蓋膽傷則膽氣敗而膽液泄故爲此證經曰膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽義猶此也且膽附於肝主少陽春生之氣有生則生無生則死故經曰凡十一藏皆取決於膽者正以膽中生氣爲萬化之元也若此諸證皆以膽傷膽傷則生氣敗生氣既敗其能生乎所以凡患此者多致不救然當察其傷之微甚速救其本猶可挽回而鍊石補天之權則操之醫之明者

一黃疸大法古有五疸之辨曰黃汗曰黃疸曰穀疸曰酒疸曰女勞疸總之汗出染衣色如栢汁者曰黃汗身面眼目黃如

全書卷三
論治
金色小便黃而無汗者曰黃疸因飲食傷脾而得者曰穀疸
因酒後傷濕而得者曰酒疸因色慾傷陰而得者曰女勞疸
雖其名目如此然總不出陰陽二證大都陽證多實陰證多
虛虛實弗失得其要矣

一黃疸難治證凡寸口無脈鼻出冷汗腹膨形如烟薰搖頭直
視環口黎黑油汗發黃久之變黑者皆難治

論治 共五條

一陽黃證多以脾濕不流鬱熱所致必須清火邪利小水火清
則溺自清溺清則黃自退輕者宜茵陳飲大分清飲梔子蘗

皮湯之類主之○若閉結熱甚小便不利腹滿者宜茵陳蒿湯
梔子大黃湯之類主之

一陰黃證多由內傷不足不可以黃爲意專用清利但宜調補
心脾腎之虛以培血氣血氣復則黃必盡退如四君子湯五
君子煎壽脾煎溫胃飲之類皆心脾之要藥也○若六味丸
八味丸五福飲理陰煎及左歸右歸六味回陽等飲皆陰中
之陽虛者所宜也○若元氣虛不至甚而兼多寒濕者則以
五苓散四苓散或茵陳五苓散之屬加減用之亦可

一傷寒發黃凡表邪未清而濕熱又盛者其證必表裏兼見治

宜雙解以柴苓湯或茵陳五苓散主之○若內熱甚而表邪
仍在者宜柴苓煎主之○若但有濕熱內實脹閉等證而外
無表邪者宜茵陳蒿湯主之○若因內傷勞倦致染傷寒者
亦多有發黃之證但察其本無濕熱實邪等證卽當以陰黃
之法調補治之或用後韓祗和之法亦可若但知攻邪則未
有不敗故孫真人曰黃疸脉浮者當以汗解之宜桂枝加黃
芪湯此卽補虛散邪之法也外傷寒門別有正條所當並察
一膽黃證皆因傷膽而然膽旣受傷則臟氣之損敗可知使非
修緝培補則必至決裂故凡遇此等證候務宜大用甘溫速

救元氣然必察其所因之本或兼酸以收其散亡或兼澁以固其虛脫或兼重以鎮其失守之神魂或與開道利害以釋其不解之疑畏凡諸用藥大都宜同陰黃證治法當必有得生者若治此證而再加剋伐分利則真如壁卵矣

一治黃之法本宜清濕利小便然亦多有不宜利者說詳濕證門論治條中

述古 共五條

金匱要畧曰跌陽脉緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食卽爲滿尺脉浮爲傷腎跌陽脉緊爲傷脾風寒相搏食穀卽

眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流
膀胱身體盡黃名曰穀疸○額上黑微汗出手足中熱薄暮
卽發膀胱急小便自利名曰女勞疸○腹如水狀不治心中
懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒疸○陽明病脈遲者食難
用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如
故所以然者脈遲故也○夫病酒黃疸必小便不利其候心
中熱足下熱是其證也○酒黃疸者腹滿欲吐鼻燥其脈浮
者先吐之脈沉者先下之○酒疸心中熱欲吐者吐之愈
師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩

熱所得○然黃家所得從濕得之一身盡發熱面黃肝熱熱在裏當下之○脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃○黃疸之病當以十八日爲期治之十日以上瘥反劇爲難治○疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部其人必嘔陽部其人振寒而發熱也

穀疸之爲病寒熱不食食卽頭眩心胸不安久久發黃爲穀疸茵陳蒿湯主之○酒黃疸心中懊懔或熱痛梔子大黃湯主之○諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之宜桂枝加黃耆湯主之○黃疸病茵陳五苓散主之○黃疸腹滿

小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之宜大黃消石湯○黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之○男子黃小便自利當與虛勞小建中湯

韓祇和云病人三五日服下藥太過虛其脾胃亡其津液渴飲水漿脾土爲陰濕所加與邪熱相會發黃此陰黃也當以溫藥治之如兩手脉沉細遲肢體逆冷皮膚有粟起或嘔吐舌上有胎遍身發黃煩躁欲於泥水中臥小便赤少皆陰候也故陰黃多以熱湯溫之或湯漬布搭其胸腹或以湯盛瓢中

坐於臍下熨之其病愈者曾治趙顯宗病傷寒至六七日因服下藥太過致發黃其脉沉細遲無力皮膚涼發躁欲於泥中卧喘嘔小便赤澀先投茵陽橘皮湯喘嘔止次服小茵陳湯半劑脉微出不欲於泥中臥次日又服茵陳附子湯半劑四肢發熱小便二三升當日中大汗而愈似此治愈者不一錄凡傷寒病黃每遇太陽或太陰司天歲若下之太過往往變成陰黃蓋辰戌太陽寒水司天水來犯土丑未太陰濕土司天土氣不足卽脾胃虛弱亦水來侵犯多變此證也

畧例云內傷勞役飲食失節中州變寒之病生黃者非傷寒壞

之而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陳也

劉宗厚曰按一身盡痛而黃者濕勝在表也不痛者病在裏也
乾燥者熱勝也故後證皆有表裡之分東垣云傷寒當汗不
汗卽生黃邪在表者宜急汗之在表之裏宜滲利之在半表
裏宜和解之在裏者宜急下之若已上諸證及畧例云男黃
小便自利當與虛勞小建中湯若黃色不變欲自利腹滿而
喘不可除熱除熱必噦宜小半夏湯皆不必拘於茵陳也

徐東皋曰疸證服解利之藥久而不愈及口淡怔忡耳鳴腳
痿憎寒發熱小便濁皆爲虛甚宜四君子湯吞八味丸不可強

服涼藥通利以致脾氣虛弱腎水枯涸必至危篤

黃疸論列方

四苓散 和一八七

五苓散 和一八二

小建中湯 補二二

五福飲 新補六

茵陳飲 新寒八

大建中湯 補二四

左歸飲 新補二

右歸飲 新補三

茵陳五苓散 和一八五

理中湯 熱一

理陰煎 新熱三

茵陳橘皮湯 熱一三三

溫胃飲 新熱五

壽脾煎 新熱十六