

蘭臺軌範卷四

吳江徐靈胎洄溪著

濕

金匱

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便濕家之為病一身盡疼發熱身色如黃黃也此黃與黃濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則濕或胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口煩燥也濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微欲出汗者風濕俱去也濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈納藥之為金匱未載後廣求其法以補之亦不過牙皂瓜蒂之類

濕方

麻黃加木湯金匱

濕家身煩疼可與麻黃加木湯發其汗為宜慎不可以火攻之

麻黃三兩

去節

桂枝二兩

去皮

甘草一兩

杏仁七十個

去皮尖

白朮四兩

右五味

以水九升

先煎麻黃減二升

去上

沫納諸藥煮取二升半

去滓溫服八合

覆取微似汗此濕家發汗之主方

防己黃耆湯金匱

風濕脈浮身重汗出惡風者此湯主之

防己一兩

甘草半兩

白朮七錢

黃耆一兩一分

去蘆

右剉麻豆大

每抄五錢七

生薑四片

大棗一

枚水盪半煎八分

去滓溫服良久再服

喘者加麻黃半兩

胃中不和者加芍藥三分

氣上衝者

水盪半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者



蘭臺軌範卷四

吳江徐靈胎洄溪著

濕

金匱

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便濕家之為病一身盡疼發熱身色如黃黃也此黃與黃濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則濕或胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口煩燥也濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微欲出汗者風濕俱去也濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈納藥之為金匱本載後廣求其法以補之亦不過牙皂瓜蒂之類

濕方

麻黃加木湯金匱

濕家身煩疼可與麻黃加木湯發其汗為宜慎不可以火攻之

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

炙

杏仁

七十個

白朮

四兩

右五味以水九升先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗此濕家發汗之主方

防己黃耆湯金匱

風濕脈浮身重汗出惡風者此湯主之

防己

一兩

甘草

半兩

白朮

七錢

黃耆

一兩一分

去蘆

右剉麻豆大每抄五錢七生薑四片大棗一枚水盪半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者

水盪半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者



加桂枝三分。下有陳寒者加細辛三分。服後當如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差。

麻黃杏仁薤白甘草湯金 病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也。

麻黃半兩去 甘草一兩 薤白半兩 杏仁十個去 右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服有微汗避風。

桂枝附子湯金 傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澀者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之。

桂枝四兩 芍藥三兩 附子三枚炮去 甘草二兩 大棗十二枚擘 右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服。

白朮附子湯金 附子一枚半 甘草一兩 生薑半兩切 大棗六枚 右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服。

服一服覺身痺半日許再服三服多盡其人如冒狀勿怪即是木附並走皮中逐水氣未得除故耳。甘草附子湯金 風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此湯主之。

甘草二兩 附子二枚炮 白朮二兩 桂枝四兩 右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服。

初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合為妙。此風濕而兼寒者 二妙散漢 治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虛加血藥如痛甚以薑汁熱辣服之。

黃柏炒

蒼朮炒去

右為末生薑研沸湯調服如表實氣實者少酒佐之在表之濕當散之在裏之濕當燥之諸方之義

不外乎此

黑地黃丸

方見通治

喝

金匱

太陽中喝發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細乳遲小便已灑灑然毛僂手足逆冷小有勞身即熱口開而板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋甚此中喝乃中時行之熱氣與卒然中暑病象如霍亂者不同當別之

喝方

白虎人參湯金匱

太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴此湯主之

知母六兩

石膏一斤

甘草二兩

梗米六合

人參三兩

右五味

以水一斗

煮米熟湯成

去滓溫服一

升日三服

熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方為精密况凡屬汗出多之病無不惡寒者以其惡寒汗出而誤認為寒用大順散等熱劑則立危矣

一物瓜蒂散金匱

太陽中喝身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

瓜蒂二十個

右剉以水一升煮取五合去滓頓服之

此方服之當吐

香薷飲金匱

治暑熱乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩燥口渴腹滿吐瀉者

香薷一斤

厚朴炒薑汁

白扁豆炒各半斤

右水煎浸冷服

此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止

十味香薷飲

即前方加人參甘草黃耆木瓜陳皮白木茯苓

黃連香薷飲

即香薷飲加黃連四兩薑汁同炒黃色

枇杷散方

治中暑伏熱煩渴引飲嘔逆惡心頭目眩暈



南京中醫藥大學圖書館藏

枇杷葉 陳皮 丁香 厚朴各五錢 白茅根 麥冬 木瓜 甘草各一兩 香茹七錢 右為末每二

錢薑三片煎湯調服溫服亦可如煩燥并水調下小兒三歲以下服五分量大小加減

蟾酥丸方秘

茅術 雄黃各一錢 辰砂五錢 麝香一錢 丁香 牙皂各三錢 蟾酥五錢

右用火酒化蟾酥打丸如丸

仙人大辰砂為衣放舌底化下重者二三丸

千金丹秘方即人馬平安散

麝香 冰片各二錢 砂五錢 雄黃 硼砂 硝各一錢 金箔一百張或加牛黃

右七味為末或水服二三

或嗅少許於鼻內

又刮痧法用薄錢蘸香油刮胸背及臂股灣令色紫痧起為度或用婦人縛髮油繩蘸油刮亦可

紫金錠 蘇合丸方 藿香正氣散方 生脈飲 六一散以上俱見通治

痧症

素問

瘧論黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其畜作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頸腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲帝曰何氣使然岐伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽升於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頸也巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗孔疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝行於陽夜行於陰此氣得陽



而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍稍益晏其出於風府日下一節二十五日下至胝骨二十六日入於脊內注於伏膂之內其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得出故間日乃作也帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之發也不當風府其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項氣至頭項而病中於背氣至背而病中於腰脊氣至腰脊而病中於手足氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也帝曰善夫風之與瘧也相似同類而風獨常在瘧得有時而休者何也岐伯曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘧帝曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧而論此等極多不獨論瘧為然故學者當以意會也岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日

者邪氣與衛氣客於六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗瘧脈緩大虛使宜用藥不宜用鍼凡治瘧先發如食頃乃可以治過之則失時也諸瘧而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之時瘧疾發在未來簡易可學不必習鍼法皆能之亦治瘧之要訣也

風瘧素生氣通天論魄汗未盡形弱而氣燂穴腠以閉發為風瘧又云夏傷於暑秋為瘧瘧發者

瘧瘧瘧與瘧同

似瘧素生真要大論帝曰火熱復惡寒發熱如有瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會合之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相搏盛衰之節瘧亦同法瘧亦同法則非瘧可知

金匱

師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消燂肌肉壯瘧瘧多寒者名曰牡瘧似當作牡字諸本皆作牡存考

瘧方

鼈甲煎丸金匱病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何師曰此結為癥瘕

名曰瘧母急治之宜此方

鼈甲十一分烏扇三分黃芩三分柴胡六分鼠婦三分乾薑三分大黃三分芍藥五分桂枝

葶藶一分石韋三分厚朴三分牡丹五分瞿麥二分紫葳三分半夏一分人參一分廔蟲五分

葶藶熱

石韋去毛

牡丹去心

紫葳

半夏

人參

廔蟲

廔蟲熱

大學圖書館

阿膠三分 蜂窠四分 赤消十二 蜣螂六分 桃仁二分 右二十三味為末取煅竈下灰一斗清酒一

斛五斗浸灰候酒盡一半著蜣螂於中煮令泛濶如膠漆絞取汁納諸藥煎為丸如梧子大空心服七

白虎加桂枝湯金 濕瘧者其脈如平身無寒但熱骨節痠痛時吐此湯主之

知母六兩 甘草二兩 石膏一斤 粳米二合 桂枝三兩 右剉每五錢水一盞半煮至八分去滓溫服

汗出愈內經以先熱後寒為濕瘧但熱不寒為瘧瘧

蜀漆散金 瘧多寒者名曰牡瘧此湯主之吐宜

蜀漆洗去腥 雲母燒二日夜 龍骨等分 右三味杵為散未發前以漿水服半錢七

發時服一錢七

柴胡去半夏加栝蒌湯金 治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡八兩 人參 黃芩 甘草各三兩 栝蒌根四兩 生薑二兩 大棗十二枚 右七味以水一斗二升煮

取六升去滓再煎取三升溫服一升日二服

柴胡桂薑湯金 治瘧寒多微有熱或但寒不熱

柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑二兩 栝蒌根四兩 黃芩三兩 牡蠣二兩 甘草二兩 右七味以水一斗二

升煮取六升去滓再煎取三升日三服初服微煩復服汗出便愈

蜀漆九金 主瘧瘧連年不差服三七日定差方

蜀漆 知母 白薇 地骨皮 麥門冬各五升 麻各五 恒山一兩 石膏二兩 香豉一合 姜豉 烏

梅肉 龍甲 甘草各一兩 右十三味搗篩為末煉蜜和丸如桐子大空腹飲服十九日再加至二



三十九丸。此方治三日瘧為宜。

陵鯉湯。千金主瘧疾。江南瘴癘方。

陵鯉甲。四十枚。炙。烏賊魚骨。附子。各一。恒山。三兩。

之。勿絕吐之。并塗五心。一日斷食。過時久乃食。用生藥。

瘧癘病醫不能救者方。千金外治截瘧法。

繩置項上。著反向背。上當繩頭處。中脊骨上。灸三十壯。則定候看。復惡寒。急灸三十壯。則定候至。過發。

一炊久候之。雖飢勿與食。盡日此神驗。男左足。女右足。

療瘧常山湯。外臺吐法。

常山。三兩。右一味切。以漿水三升。浸經一宿。煎取一升。欲發前頓服之。後微吐差止。忌生薑生菜。

牡蠣湯。外臺治牡蠣。

牡蠣。四兩。麻黃。四兩。甘草。二兩。蜀漆。二兩。

右四味。以水八升。先煮蜀漆麻黃去上沫。得六升。納諸

藥。煮取二升。溫服一升。若吐則勿更服。

清脾湯。生濟治熱多陽瘧。

青皮。厚朴。柴胡。黃芩。半夏。甘草。茯苓。白朮。草果。煨。

右九味。加薑三片。水

煎服。

常山飲。方局治瘧瘧。

常山。大酒炒。知母。

貝母。

草果。

檳榔。各一。烏梅。三個。

右六味。加薑棗煎。瘧未發時。

面東溫服。

烏梅引子 療溫瘧勞瘧

烏梅 七個 桃柳心 各七葉 白豆豉 一合 甘草 四分 柴胡 四分 知母 四分 大黃 三分 右各

細剉以童子小便兩茶碗宿浸明旦早煎三二沸去滓頓服差未差更作服三服永差忌海藻菘菜

集驗瘧必從四肢始療方 先其時一日頃用細左索繩繫束其手足十指過發時乃解之

四獸湯 治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏 人參 茯苓 白朮 橘紅 草果 生薑 烏梅

甘草 各等 右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四錢溫服

小柴胡湯 見傷寒 治瘧之法不外諸方惟三日瘧則煎劑不能取效宜病日用煎方以驅邪餘兩日用溫

補以扶元氣又加避風靜養則庶幾矣

痢

素問

通評虛實論帝曰腸澼使血何如歧伯曰身熱則死寒則生帝曰腸澼下白沫何如歧伯曰脈沉則生脈浮則死帝曰腸澼下膿何如歧伯曰脈懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身不熱脈不懸絕何如歧伯曰滑大者曰生懸澼者曰死以臟期之氣厥論腎移熱於脾傳為虛腸澼死不可治大奇論腎脈小搏沈為腸澼下血血溫身熱者死心肝澼亦下血二臟同病者可治其脈小沈澼為腸澼其身熱者死太陰陽明論犯賊風虛邪陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟入六腑則身熱不時臥上為喘呼入五臟則填滿閉塞下為飧泄久為腸澼 此俗所謂腸紅病也

金匱



六腑氣絕於外者。手足寒。上氣脚縮。五臟氣絕於內者。痢不禁。下甚者。手足不仁。下痢脈沈弦者。下重脈大者。為未止。脈微弱數者。為欲自止。雖發熱不死。下利手足厥冷。無脈者。灸之不溫。若脈不還。及微喘者。死。少陰負跌陽者。為順也。下痢有微熱而渴。脈弱者。令自愈。下痢渴者。自愈。以陽下痢。脈數有微熱。汗出。令自愈。設脈緊為未解。下痢脈數而渴者。令自愈。設不差。必清膿血。以有熱故也。下痢清穀。當利其小便。下痢清穀。不可攻其表。汗出必脹滿。下痢脈沈而遲。其人面少赤。身有微熱。下痢清穀者。必鬱冒汗出而解。病人必微厥。所以然者。其面帶陽下虛故也。下痢後脈絕。手足厥冷。時時脈還。手足溫者。生。不還者。死。下痢腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。暑以上諸證。皆屬陰寒之痢。非治法大相懸殊。

病源

痢而赤白者。是熱乘於血。血滲於腸內。則赤也。冷氣入腸。搏腸間津液凝滯。則白也。冷熱相交。故赤白相雜。重者。狀如膿涕。而血雜之。輕者。白膿。上有赤脈。薄血。狀如魚脂。腦世謂魚腦痢也。血痢者。熱毒折於血。入大腸故也。休息痢者。胃脫有停飲。因痢積久。或冷氣。或熱氣。乘之。氣動於飲。則飲動而腸虛受之。故為痢也。痢如膏。由臟腑虛。冷氣入於大腸。成痢。冷氣積腸。又虛滑脂凝如膏也。蟲蛀痢。毒氣侵於臟腑。如病蠱蛙之家。痢血雜膿。痰黑。有片如雞肝。與血俱下。是也。雜痢。謂痢色無定。或水穀。或膿血。或青或黃。或赤或白。變雜無常。或雜色相兼。而痢也。按熱則黃赤。熱甚則變膿血也。冷則白。冷甚則青黑。皆由飲食不節。冷熱不調。胃氣虛。故變易。

痢方

桃花湯

金

下痢使膿血者。此湯主之。

赤石脂

一斤

一半

劉乾薑

一兩

粳米

一升

右三味

以水七升

煮米令熟

去滓

溫服七合

納赤石脂

一斤

右三味

以水七升

煮米令熟

去滓

溫服七合

納赤石脂

一斤

右三味

以水七升

煮米令熟

去滓

溫服七合

納赤石脂

一斤

右三味

以水七升

煮米令熟

去滓

溫服七合

納赤石脂

一斤

右三味

以水七升

煮米令熟

去滓

溫服七合

末方寸匕。日三服。若一服愈。餘勿服。此治下焦

白頭翁湯金 熱痢下重者。此湯主之。滑脫之痢

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮各三

紫參湯金 下痢肺痛。此湯主之。

紫參 半斤 甘草 三兩

訶梨勒散金 治氣痢。

訶梨勒十枚 右一味為散。粥飲和頓服。

甘草瀉心湯傷寒 傷寒中風。醫反下之。其人下痢。日數行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞅而滿。乾嘔。心煩。

不得安。此湯主之。

甘草四兩 黃芩 乾薑各三 半夏半升 黃連一兩 大棗十二

再煎。取三升。溫服一升。日三服。此治上焦

黃芩湯傷寒 太陽與少陽合病。自下痢者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯。

醫復吐下之。寒格更逆吐下。若食入口即吐。乾薑黃連黃芩人參湯主之。

黃芩 三兩 甘草 芍藥各二 大棗十二

服。此熱痢之主方

黃芩加半夏生薑湯傷寒 即前方加半夏半升 生薑三兩 煎服法同。

乾薑黃連黃芩人參湯傷寒

乾薑 黃連 黃芩 人參各三

右四味以水六升。煮取二升。分溫再服。瀉心湯以下四



主而因證加減此痢疾之正方也

赤石脂禹餘糧湯

傷寒

傷寒服湯藥下痢不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之痢不止醫治

中湯與之痢益甚理中者理中焦此痢在下焦此湯主之

赤石脂

碎

禹餘糧

碎各一斤

以上二味以水六升煮取二升去滓三服

下焦乃大腸之底也

雄黃丸

夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄瀉連月夢壁間有韻語方二紙讀之數遍其詞曰毒暑在脾濕氣連脾不泄則痢不痢則瘧獨煉雄黃蒸餅和為甘草作湯服之安樂別作治瘧醫家大錯如方製藥服之遂愈

瘧醫家大錯如方製藥服之遂愈

柴胡加芒硝湯

治傷寒胸滿而嘔日晡所發潮熱已而微痢先以小柴胡解外後以此主之

柴胡湯方

加芒硝

二兩

右先煎柴胡湯去滓納芒硝分溫再服不解更作

瓜蒌散

治五色痢久不愈者

瓜蒌

一個以炭火煨存性蓋地上出火毒

右研細溫酒服盡

瘧熱毒痢血片臍下絞刺痛方

升麻

地榆

黃連

各六分

犀角

四分

生地

八分

梔子

薤白

香豉

各二

右

九味以水六升煮取一升五合分溫三服日再

主赤白痢方

黃連

二兩

阿膠

四片

右二味以酒二升合黃連煎十五沸去滓然後納阿膠令烊溫服三升

療五疳蒸下痢方

苦參

青箱

甘草

炙各三兩

右三味以水四升煮取二升半分三灌即愈

凡蒸但服地汁即差



治蟲

薤白湯治人傷寒下痢如爛肉汁赤白帶下伏氣腹痛諸熱毒並皆治之

豉半斤薤白一把七枝大右剉如麻豆大以水二升半先煮薤子十沸下薤白煎至一升

下豉煎取一升二合去滓每服一湯盞

訶梨勒丸治腸胃積寒久痢純白或有青黑日夜無度

肉豆蔻去皮木香乾薑二兩各十縮砂仁訶梨勒皮川烏頭泡去白礬各十龍骨各十

赤石脂各十右為末用粟米飯為丸如梧子大每服二十九至三十九溫粟米飲下食前服甚

可倍加丸數此溫瀉之劑

葛根湯 葛根黃芩黃連湯 當歸四逆湯 大承氣湯 小承氣湯 四逆散

四逆湯 白通加猪膽汁湯 白通湯 四逆加人參湯 通脈四逆湯 猪膚湯

陽毒升麻湯以上十三方俱見傷寒門生薑瀉心湯見嘔吐門烏梅丸方見蟲門威喜丸方見通治此方和劉名感應丸

癰狂癰

靈素

靈癰狂篇狂自生先自悲也喜忘若怒善恐者得之憂飢狂始發少卧不飢自高賢也自辯智也自尊貴也善言罵日夜不休狂言驚善笑好歌樂忘行不休者得之大恐狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也狂者多食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜

骨癰 靈癰狂篇骨癰疾者顛齒諸膈分肉皆滿而骨居汗出煩惋嘔多沃沫氣下泄不治筋癰疾 靈癰狂篇筋癰疾者身倦掣急嘔多沃沫氣下泄不治



脈癰疾 靈癰狂篇。脈癰疾者。暴仆。四肢之脈皆脹而縱。脈滿盡刺之出血。嘔多沫。氣下泄。不治。
素生氣通天論。陰不勝其陽。則脈流薄疾。并乃狂。宣明五氣論。五邪所亂。邪入於陽。則狂。調經論。血
并於陰。氣并於陽。故為驚狂。至真要大論。諸躁狂越。皆屬於火。通評虛實論。帝曰。癰疾何如。岐伯曰。
脈搏大滑久。自已脈小。堅急。死不治。帝曰。癰疾之脈。虛實何如。岐伯曰。虛則可治。實則死。陽明脈解篇。
岐伯曰。四肢者。諸陽之本。陽盛則四支實。實則能登高也。帝曰。其棄衣而走者。何也。岐伯曰。熱盛於身。故
棄衣欲走也。帝曰。其妄言罵詈。不避親疎而歌者。何也。岐伯曰。陽盛則使人妄言罵詈。不避親疎而不欲
食。不欲食。故妄走也。

陽厥怒狂 素病能論。帝曰。有病怒狂者。此病安生。岐伯曰。陽氣者。因暴折而難決。故善怒也。病名曰陽
厥。帝曰。治之奈何。岐伯曰。奪其食。即已。使之服。以生鐵洛為飲。夫生鐵洛。飲者。下氣疾也。

胎病 素奇病論。帝曰。人生而有病癰疾者。病名曰何。安所得之。岐伯曰。病名為胎病。此得之在母腹中
時。其母有所大驚。氣上而不下。積氣并居。故令子發為癰疾也。

難經

癰疾始發。意不樂。僵仆直視。其脈三部陰陽俱盛是也。重陽者狂。重陰者癰。

病源

風癰 風癰者。由氣血虛邪入於陰經故也。又人在胎。其母卒大驚。積氣并居。令子發癰。其發則仆地吐

涎沫。無所覺是也。此俗名
羊頭癰

五癰 五癰者。一曰陽癰。發如死人。遺尿。食頃乃解。二曰陰癰。初生小時。臍瘡未愈。數洗浴。因此得之。三

曰風癰。發時眼目相引。牽縱反強。羊鳴。食頃方解。四曰濕癰。眉頭痛。身重。坐熱。沫頭濕。結腦。肺未止得之。

五曰馬癲發作時時反目口噤手足相引身體皆然

鬼魅 凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寤喜驚或與鬼神交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食此魅之所持也 十歲以上為癲十歲以下為癩大體不外三種風驚食是也

千金

驚癇 癇分心肝脾肺腎腸胃之病及馬牛羊猪犬雞之別其象各有所似

癲狂方

生鐵洛為飲開素

生鐵洛即爐冶間鉅落之鐵屑用水研浸可以為飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開結平水火之邪

故可以下氣疾除狂怒也凡藥中用鐵精鐵華粉鐵砂鐵銹水之類皆同此意此治怒狂之方以鎮肝為主

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯傷寒論 治傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者

即桂枝湯去芍藥加蜀漆三兩洗牡蠣五兩龍骨四兩 右七味以水一斗煮取二升先煮蜀漆納

諸藥煮取三升去渣溫服一升

柴胡加龍骨牡蠣湯傷寒論 治傷寒下之驚煩小便不利譫語身重不能轉側此湯主之

柴胡 龍骨 人參 茯苓 鉛丹 黃芩 桂枝略半 半夏 二合 大黃 二兩

牡蠣生一兩 生薑半兩 大棗 六枚 右十二味以水八升煮取四升納大黃更煮去滓溫服一升

治癲狂百病千金翼

大麻子四升上 以水六升煮令芽生去滓取二升空腹頓服或多言語勿怪但使人摩手足續法



養若子散外治五癩

猪卵一具陰乾 養若子 三斤 牛黃 八分 鯉魚膽 五分 桂心 一兩

右五味以清酒一升清養若子

令乾盡酒止搗合下篩酒服五分日再當醉不知稍增

抱膽丸方類 治一切癩癩風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈不通驚邪

蘊結

水銀 二兩 硃砂 二兩細研 黑鉛 一兩 乳香 一兩 右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂乳香乘

熱用柳木搥研勻丸雞豆大每服一丸并花水吞下病者得卧切莫驚動覺來即安再服一丸除根

琥珀壽星丸方局 治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄言妄見

天南星 一斤 掘坑深二尺用炭火五升於坑內燒紅取出炭掃淨用好酒一斤琥珀 四兩 硃砂 二兩

一兩 右和猪心血三個生薑汁打麪糊攪令稠粘將心血和入藥末丸如桐子大每服五十九煎

人參湯下日三

控涎丹方類 治諸癩久不愈頑涎聚散無時變生諸證

川烏 用生半夏湯洗 白僵蠶 炒各半兩 生鐵粉 三錢 全蠍 廿遂 各二錢 半 右為細末生薑自

然汁為丸如菜豆大硃砂為衣每服十五丸食後生薑湯下忌食甘草

獨效苦丁香散 治忽患心疾癩狂不止得之驚憂痰氣上犯心包當治其源

以苦丁香即瓜蒂半兩為末每服一錢并花水調滿盞投之得大吐熟睡勿令人驚起

甘遂散方類 治癩狂及婦人風血邪

甘遂末一錢用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作二片入藥在內合之綿縛外用皮紙